



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Ar 1350



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



EEK GENT













**HIPPOCRATIS**  
**C O I**  
**APHORISMI**  
**NOTATIONIBUS VARIORUM**  
**ILLUSTRATI.**

---

**DIGESSIT ET INDICES NECESSARIOS**

**ADDIDIT**

**JO. CHR. RIEGER,**  
**RIESENBURGO-PRUSSUS.**

**V O L U M E N I I.**



**HAGÆ COMITUM,**  
**Apud PETRUM VAN CLEEF,**  
**M. DCC. LXVII.**



**HIPPOCRATIS**  
**APHORISMORUM**  
**SECTIO QUINTA.**





# HIPPOCRATIS

## APHORISMORUM

### SECTIO QUINTA.

#### APHOR. I.

Σ Πασμὸς ἐξ ἐλλεβορέα, θανάσιμος.

Convulsio ex veratro, letale.

Extat hæc sententia in *Coac. sect. 4. n. 24.*  
nec non in *lib. de verat. us.* & apud Celsum  
*l. 2. c. 6. p. 55.*

Elleborum (intellige album) sanis esse periculofum, eo quod convulsiones inducat, dictum est 4 *aph.* 16. Nunc convulsio ab elleboro letalis pronuntiatur. Attamen evenire quandoque casus, ubi convulsiones ab hoc pharmaco non sint letales, legere est in *Eph. N. C. D. 3. a. 1. obs. 65.* & *Ass. Hafn. vol. 5. obs. 55.* De natura convulsionum dictum est ad 2 *aph.* 26.



## APHOR. 2.

Επὶ τέρμασι σπασμὸς ἐπιγινώσκεται, θανάσιμον.

Convulsio vulneri superveniens, letale.

Legitur totidem verbis hic aphorismus in *Coac. sect. 3. n. 81. & 382.*

Duplici ex causa vulneribus (comprehendendo sub iis etiam ulcera) convulsio succedere potest; vel ab oborta inflammatione in nervosas partes incidentes: vel cum nullus tumor circa ulcus apparet, aut, qui fuit, evanuit; nam quibus tumores in ulceribus apparent raro convelluntur, &c. juxta 5 aph. 65. Quamquam autem raro tunc convellantur, quodcumque tamen etiam cum tumore oboritur convulsio, letalis erit; ob nervos affectas. *Valles.* Non semper tamen vulneratis obvenientes convulsiones letales sunt; sed qui ex vulnere moriuntur, cum convulsione mori solent: ita ut sæpe convulsio non tam causa, quam potius signum appropinquantis existat mortis. Vid. *Cardan. p. 479. Listerus* intelligit aphorismum de vulneribus per tela venenata factis. Ab inanitione seu hæmorrhagia magna vulneribus supervenire convulsionem docet aphorismus sequens.

## ΑΡΗΟΡ. 3.

Αἱμαλῶ πολλὰ ρύεντῶ, σπασμὸς ἢ λυγμὸς  
ἰπγινόμενῶ, κακόν.

**E**x copioso sanguinis fluxu convulsio,  
aut singultus superveniens, malum.

**I**n *Coac. sect. 3. n. 57.* hic aphorismus ita scribitur: *In copiosa sanguinis fluxione, aut singultus, aut convulsio, malum demunciant.*

A sanguinis jactura, undecunque facta, vasa inanita contrahunt se vi sibi innata exercendo motum systolicum, qui non contralibratur a diastole, propter deficientem sanguinem dilatantem vasa. Vid. *Bagliv. p. 290. & 301.* A sublato igitur solida inter atque fluida æquilibrio natus spasmus malum: quia indicat humores deficere etiam in minimis, unde retracti nervi sunt. Singultus est convulsionis species in officio superiori ventriculi; & concussiones singultuosæ post magnas hæmorrhagias ipsum vitæ finem, tanquam ultimi naturæ conatus antecedere solent. *Hoffm. Med. rat. T. 4. P. 3. p. 428.*



## APHOR. 4.

**Ε**πὶ ὑπερκαθάρσει σπασμὸς, ἢ λυγμὸς ἐπι-  
γιγόμενος, κακόν.

**Ex** profusa purgatione convulsio, aut  
singultus succedens, malum.

**R**eperitur hæc sententia in *Coac. sect. 4. n. 22. & lib. de Verat. us.* Celsus l. 2. c. 8. p. 76. *mortis periculum esse ait, si medicamentis purgatum & adhuc inanem, nervorum distentio oppressit.*

Quoties ex multa purgatione convulsio aut singultus, semper notatur causa quædam nervos & nervorum principium afficiens. Malum dicitur, quod de elleboro funestum dieebatur *apb. 1. hujus sectionis.* Vomitoria ac purgantia drastica, maxime elleborata, rodendo, stimulando & inflammando ventriculum ac intestina, ad singultuosum disponunt morbum. *Hoffm. Med. rat. T. 4. P. 3. p. 425.* Purgantia quoque mitiora & indemnita largiori dosi, vel in tenerioribus fortius operantia, spasmos citare assolent. *Wedel.* In profusa purgatione seu hypercatharsi evacuantur, cum excrementis, etiam boni humores, & quia in defectu humorum destruitur æquilibrium, convulsio generari potest; quæ dicitur *malum*, non letale, quoniam ille defectus sæpe suppletur, *Galen.*

APHOR.

## APHOR. 5.

**Η**ν μεθύων ἑξαίφνης ἄφωνός τις γίνηται, σπαρταδὲς ἀπθνήσκει, ἢν μὴ πυρεπὸς ἐπιλάβῃ, ἢ ἐς τιτὸ ὥρην ἰλθὼν, καθ' ἡν αἱ κραυπαλαὶ λύονται, φθέγγεται.

**S**i ebrium quempiam vox deficiat de repente, convulsus moritur, nisi eum febrisprehendat, aut quā horacrapulae solvi solent, ad vocem redeat.

**C**elsus l. 2. c. 6. p. 55. hunc aphorismum ita expressit: *Non servari potest qui ebrius obtulit. Is enim fere nervorum distensione consumitur, nisi aut febris accessit, aut eo tempore, quo ebrietas solvi debet, loqui cœpit.*

Aphoniam ab ebrietate facit spastica phlegmonodes diathesis, quam infert cum impetu impulsus in arteriolas cerebri sanguis, unde nervorum ad linguam euntium origo comprimitur. Mors tum a convulsione, nisi eam solverit accedens febris: nam hæc superveniens solvit convulsionem juxta 4 aph. 57. *Hecquet.* In summa ebrietate est apoplexia, nempe somnus profundus cum stertore, a sanguine nimio ad corticem cerebri delato, a quo cerebrum subiectum premitur. Visa autem est mulier quædam, ex vini potu apoplectica facta, quæ superveniente febre die sequenti a febris invasione mortua est. Hinc veritas præsentis aphorismi suspecta redditur; nisi ejus explicatio petatur ex lib. 2.

de morb. n. 22. qui locus sic habet: *Si quis ex temulentia voce deficiat, si quidem jam confestim eum febris corripiat, convalescit, sin minus, intra tertium diem moritur.* Intendit enim, ut statim, ac voce privatur, febris eum corripiat, quod ut significaret h. l. Hippocrates non contentus dixisse *αὐτίκα*, i. e. *statim* seu *confestim*, vocem ulterius addidit *παράχρημα*, quæ & ipsa temporis celeritatem significat, h. e. statim, nulla interposita mora. Quum igitur aphonix ex ebrietate statim febris supervenit, æger liberatur, quum vero postea, moritur. Quæ quidem interpretatio ex lib. Coac. sect. 3. n. 322. confirmari ulterius potest, quo in loco hæc leguntur: *Siderationes* (apoplecticæ affectiones) *quæ repente fiunt, si insuper febris exsolutionis in modum contingat, quæ diutius trahat, perniciem minantur:* nam ut apoplexiæ ex ebrietate inter apoplectica numerantur, & derepente invadunt. Quotiescunque igitur apoplexiæ statim febris supervenit, solvitur; nequaquam vero ubi posterius, & jam confirmato morbo: cujus quidem diversitatis hanc causam afferrem; quia febris statim superveniens, est de genere ephemerarum, quæ ab agitatione spirituum provenit, quos quidem a principio invasionis apoplexiæ vehementer commoveri, est rationabile, idque ex ipsomet Hippocrate colligimus, qui lib. de vict. acut. n. 38. de apoplexia sub nomine aphonix tractans hæc habet: *His sane prius adhibitis fomentis statim per initia venam secare convenit, cum adhuc sublatis sunt qui affligunt, tum spiritus, tum humores.* Cum igitur a principio spiritus vehementer agitentur, febrem tunc supervenientem ephemeram esse rationabile est, a cuius calore causa apoplexiæ cito dissipari potest.

potest. Si vero temporis progressu, & spiritibus quiescentibus febris accedat, id genere putridam eam esse necesse est, quæ tantum abest, ut humores seu vapores crassos dissipare possit, ut potius eos adaugeat & deteriores reddat. Differunt etiam inter se hujusmodi febres calore, quæ enim statim invadit, semper vehementem præ se fert calorem, quales præ se ferunt ephemerae fere omnes, quæ vero temporis progressu supervenit, ut plurimum lenta est, quales sunt febres omnes putridæ. *Martian. p. 456.* In ebrietate a copia vini præsertim generosi assumta corpore minus perspirabili contingere potest, plus justo caput repleri sanguine copioso, qui arteriarum plexus choroidei nimium distendendo spirituum meatus intercipit. Accedens autem motus sanguinis in febre celerior, obstructa in cerebro vasa aperit, nec non materiam stagnantem in ejus poris, sive aquosa sive viscida sit, potenter discutit. *Hoffm. de sal. febr. §. 32.*

Hæc observatio actionis naturæ egregiam regulam curationis suggerit: monemur enim in hoc casu, nos debere calefacere istud corpus per actu calida & aromatica calefacientia, minime spirituosâ, vel vinosâ, sed quæ calefaciunt sine inebriandi virtute: Quam diu igitur durat aphonia sine febre in ebrio, versamur in ancipiti, num manebit talis homo superstes, num vero extinguetur superveniente convulsione: scimus enim in tali corpore adesse spirituosum calefaciens in magna copia, quod sua virtute, modo valeant vires vitæ, faciet stimulo majorem calorem seu febrem, veram eam febrem non invenio; ergo mihi indicium est, vires vitæ obrutas esse multitudine vini.

Si



Si ergo expectamus per duodecim horas vel viginti quatuor, quo tempore crapula solvi solet, & tamen vires vitæ non facere majorem motum, & permanere aphoniam, periculum est, ne ex tam diu persistente causa tandem obruatur ebrius. Sed si tunc demum ebrius loqui incipiat, ipsa loquela, etiamsi nihil faciat ad subigendum vinosum, periculum detrahet, non ut causa, sed ut signum; quoniam loquela rediens notat, opprimentem causam esse minutam, & inde valentibus sensim magis corporis viribus totum vinosum subigetur.

*Gorter.*

Exemplum de quodam, qui ex ebrietate aphonus convulsus mortuus est, extat in *Ronsseii Epist. num. 12.*

#### APHOR. 6.

Ὅσοι ὑπὸ πᾶν ἀλίσκονται, ἐν ποσῶν ἡμέρῃν ἀπέλλονται· ἢ δὲ ταύτας διαφύγωιν, ὕγιες γίνονται.

Qui nervorum distentione corripuntur, intra quatuor dies pereunt; quos si effugerint, sani fiunt.

Legitur hic aphorismus in *lib. de Judicat. n. 8.* & Celsus *l. 4. c. 3. p. 193.* ait *sæpe intra quartum diem tollere* &c. ergo non semper.

Quid τῆτοις? Hippocrates exponit 3 *de morb. n. 13.* Cum invadunt corporis distentiones tetani appellati, maxillæ velut ligna con-

configuntur, os aperire nequeunt, oculi illachrymantur ac pervertuntur, dorsum rigidum est, crura neque manus similiter adducere possunt, facies rubescit & vehementer dolet, cumque morti est proximus, potionem, sorbitionem & pituitam per nares rejicit. His mox subjicitur prognosis hæc: *Tertio, aut quinto, aut septimo, aut decimo quarta die perit, quos si effugerit, convalescit.* Cui lectioni potius, quam aphorismo assentiri me cogit, tum antiqua libri auctoritas, tum ingenitas auctoris, quem absque certa experientia hæc dixisse, non est rationabile; unde fateri cogimur, præsentem aphorismum, quemadmodum superiorem, defectuosum esse, ejus defectu, qui has sententias in unum redegit. Vel fortasse ipsemet, ut præfatos omnes dies brevitate sermonis comprehenderet, in *quatuordecim* diebus dicere voluit, sed calami vitio in *quatuor* scripsit. *Martian. p. 456. Conf. Ham Rat. med. P. 6. p. 148.*



**APHOR.**

## APHOR. 7.

**Τ**ὰ ἐπιληπτικὰ ὁκόσοις πρὸ τῆς ἡλικίας γίνε-  
ται, μετὰ τὴν ἰσχυρὰ ὁκόσοις δὲ πέντε  
καὶ εἴκοσι ἐτῶν γίνεται, ταῖς τοιαύταις καὶ πολλὰς ἑνὸς  
πρόβλεπται.

**C**omitiales quibus ante pubertatis an-  
nos contingunt, mutationem ha-  
bent: at quibus quintum & vigesimum  
annum agentibus fiunt, eos fere ad  
mortem usque comitantur.

**P**ars posterior hujus aphorismi desumpta esse  
videtur ex lib. 2. Prædict. n. 16. quo in  
loco hæc leguntur: *Ex morbo sacro ægerrime  
emergunt, quibuscum una a puero increfcit morbus,  
& in virilem ætatem simul adolescit, deinde quibus  
ætate florente ortus est, nempe post annum quintum  
& vigesimum, ad quadragesimum quintum usque.*  
Celsus l. 2. c. 8. p. 68. priorem aphorismi par-  
tem sic expressit: *morbis comitialis ante pubertatem  
ortus, non ægre finitur*: posteriorem autem alio  
loco reddidit, unde verba ejus retulimus in  
notatis ad 2 aph. 45. ubi etiam præsentis apho-  
rismi habetur expositio. Quod dixit Hippo-  
crates, pueros ætatis mutatione conva-  
lescere, adultos autem interire, ostendit id qui-  
dem, ideo epilepsiæ esse illos maxime obno-  
xios, quoniam eorum fibræ nervæ molles,  
atque laxæ, resolutionem maxime subire pos-  
sunt;

sunt; convalescere vero illos cum pubertatis terminum attingunt, quoniam ætatis mutatione, & corporis incremento, robur, & virtutem elasticam etiam atque etiam suscipiunt. *Brin. de spir. an. p. 328.* Licet autem post 25 annum incurabilis dicatur epilepsia ab Hippocrate, hoc tamen non est perpetuæ veritatis. Multos enim ætate provectos, ab hoc morbo liberatos fuisse, plurimis observationibus relatum est, quamvis tamen hoc raro contingat; sicque aphorismum utplurimum, & fere semper verum esse, statuendum est. *Riv. p. 177.* Epileptici ad ætatem senilem vergentes, diæta & medicamentis commodis usi, rariores persentiunt, citra occasionem manifestam, insultus. *Wedel.*

## APHOR. 8.

Ὅσοι πλευριτικῶν γινόμενοι ἐκ ἀνακαταίρωνται ἐν πτωσιν καὶ δεκά ἡμέρησι, τῆσιν ἐς ἐμπύημα μεδίσεται.

Qui morbo laterali laborant, nisi intra dies quatuordecim repurgentur superne, iis in suppurationem convertitur.

Pleuritis vera seu exquisita cum ex acutorum sit classe morborum, intra quatuordecim dies judicari debet. Vid. 2 aph. 23. Perfecta ejus crisis & solutio fieri solet per sputa. Si ergo deficit natura hac via, intra dictum tempus expectanda est crisis imperfecta per suppurationem in pectore, quæ empyema vocatur.

catur. Hoc est quod innuit præsens aphorismus. Docuit hoc Hippocrates plus simplici vice. Judicium subit hic morbus cum brevissime quidem septimo die, cum longissime autem decimo quarto. Quo quidem si pus ex latere repurgatum & per sputum rejectum fuerit, sanus evadit. Si vero minime exspuatur, purulentus fit, & morbus longius protrahitur. *lib. de affect. n. 8.* Cumque ulcus factum fuerit, ex se pus effundit, & de vicinis locis calore pituitam ad se adducit, quæ ubi computruit, pus exspuitur. *lib. I. de morb. n. 11.* Quibus in morbo laterali lingua circa initia biliosa est, hi intra septimum judicantur, quibus vero tertio aut quarto die, circa nonum. Quod si bulla aliquantulum livescens in lingua appareat initio, qualis excitatur ferro candente in oleum intincto, difficilior fit solutio, & judicatio quidem ad decimum quartum diem deducitur. Sanguinem autem utplurimum exspuunt. Sputum vero in morbo laterali ubi maturescere & exspui tertio die cœperit, celeriores judicationes facit, quod si posterius, tardiores. At vero biliosi simul & sanguinei morbi laterales, fere nono die aut undecimo judicantur, ac maxime sanescunt &c. *Coac. sect. 3. n. 129--132. 137.*

Si Pleuritidis inflammatoriæ signa permaneant ad quatuordecim dies, certi sumus pus esse confectum. Si vero interea temporis commutata materia inflammatoria in materiem purulentam non repurgatur, necesse est, ut maneat in corpore, quoniam materia purulenta nunquam invisibiliter exit. An vero in hoc loco sola repurgatio superne, i. e. per sputum, intelligatur, ut multi contendunt, non ita plane constat,

constat, quoniam pleuritici non raro liberantur per urinam sedimentosam. Neque Hippocratis sententia probari potest, hic intelligi purgationem per sputum; quoniam ἀνακαθάρσις generaliter notat *expurgo*, & *perpurgo*, sed interdum sumitur pro *purgo sursum*. Sed quando ex constantia inflammationis apparet, inflammationis mutationem fuisse factam in purulentiam, & non deteximus, intra quatuordecim dies, vel in urina vel in sputo, materiem purulentam fuisse evacuatam, certi esse possumus, hoc in corpore collectum esse pus, seu empyema. Et quoniam post inflammationem pleuræ pus istud confectum frequentissime deponitur in cavum pectoris, non erit sine ratione ex tali perdurante pleuritide prælagire empyema pectoris, quamvis quoque alia inde potuisset fieri suppuratio. *Gorter*. Confectarium hujus aphorismi est infra *aph. 15*.

## APHOR. 9.

Φθίσις γίνεται μάλιστα ηλικίῃσι τῇσιν ἀπὸ ὀκτωκαίδεκα ἐτῶν μέχρι πάντε καὶ τριήκοντι.

Tabes præcipue contingit ætatibus, quæ sunt ab anno decimo octavo ad trigesimum quintum.

Extat hæc sententia in *Coac. sect. 3. n. 260.* & apud *Celsum l. 3. c. 22. p. 169.* In 3 *aph. 29.* monemur phthises seu tabes maxime fieri Juvenibus: sunt quippe hi præ cæteris obnoxii

Vol. II.

B

pleu-

pleuritidi, unde facta suppuratione (5 aph. 15.)  
provenit phthisis pulmonalis.

APHOR. IO.

Ὅσοισι κυνάγχῃ διαφύγῃσιν, εἰς τὸν πνεύ-  
μονα τρέπεται, ἐν ἑπτὰ ἡμέρησιν ἀποθνή-  
σκουσιν· ἢν δὲ πύκτως διαφύγῃσιν, ἔμπυσι γί-  
γνονται.

Qui anginam effugiunt, iis in pulmo-  
nem vertitur, & intra dies septem  
intereunt; quos si evaserint, sup-  
purati fiunt.

Legitur hic aphorismus in *Coac. sect. 3. n. 105 sq.* *Quibus angina ad pulmones divertit, partim quidem intra septem dies pereunt, partim vero liberati, pus intro colligunt, nisi pituitosa sursum educantur.* De angina gravissima & celerrime interimente, quæ neque in faucibus, neque in cervice quicquam conspicuum facit, plurimum vero dolorem exhibet, & difficultatem spirandi, quæ erecta cervice obitur, inducit; in *Prognost. n. 23.* hæc habentur: *Quod si ad pulmonem se vertat, mentem excitat, & ex his nonnulli suppurati plerumque evadunt.* *Celsus l. 2. c. 7. p. 64.* aphorismum præsentem ita reddidit: *Si angina subito finita est, in pulmonem id malum transit; idque sæpe intra septimum diem occidit: quod nisi incidat, sequitur, ut aliqua parte suppuret.*

Angina præter rationem evanescens, & translata in pulmones, creat peripneumoniam, h. e. inflammatione in musculis laryngis inter-  
nis



nis cessante, si inflammatio in pulmonibus exoritur, intra septem dies expectanda est mors; est enim morbus peracutus: & si hanc evaserint ægri, suppurantur. Anginæ occultæ, scribit *Baglivus* p. 145. si superveniat dolor lateris, cessante magna ex parte circa collum, & fauces dolore, & difficultate tum spirandi, tum deglutendi; anginam conversam esse in peripneumoniam significat. Perniciosa est hæc mutatio, nam ægri vel cito moriuntur, vel suppurantur. H. J. Conf. *Boerb. aph.* 801. & 824. De hac anginæ transmutatione ita legimus apud *Hippocr. lib. 2. de morb. n. 27*: Si faucibus & tumoribus sedatis, ad pulmonem morbus versus fuerit, confestim febris & lateris dolor insuper corripit, & ubi hoc contingit, plerumque moritur. Quod si dies quinque effugerit, purulentus evadit, nisi ipsum confestim tussis corripuerit, quæ si corripuerit, exscreato & repurgato sputo convalescit. Quæ quidem sententiæ in eo tantummodo differunt, quia in aphorismo terminus assignatur septem dierum, lib. autem cit. quinque tantummodo adscripsit; quæ loca invicem conciliabuntur, si dicamus, in aphorismo septem dies enumerari, a die invasionis anginæ, librum autem de morbis quinque assignasse a die transmutationis anginæ in peripneumoniam, quasi angina, ut morbus acutissimus intra primum quaternarium necessario transmutetur. Cur autem tam cito ad suppurationem convertatur hæc peripneumonia, cui terminus quatuordecim dierum in pleuritide assignatur, non ex natura læsæ partis id evenire affirmarem (quod pluri mi faciunt) quia in peripneumonia etiam ipsa a principio invadente, expurgationis terminus vigesima prima dies præscriptus est, ut ex

*lib. 3. de morb. n. 16.* manifeste constat. Quare potius crediderim id evenire propter humoris peccantis dispositionem; qui enim pleuritidem, aut peripneumoniam, a principio producit, longe benignior est eo, qui peripneumoniam ex transmutatione parit, hic enim ante quam ad pulmonem perveniat putridus est, quia ab inflammata parte decessit, quare novam alterationem, & putredinem in ipsis pulmonibus adeptus, ad suppurationem adeo disponitur, ut in quinque diebus suppuretur, quod in aliis humoribus ante diem vigesimam evenire non solet. *Martian. p. 457.*

Duæ sunt species Anginæ faucibus infestæ, una quæ præcipue corripit laryngem, quam vocant Cynanchen, altera quæ afficit pharyngem, quæ vocatur Synanche: si vero etiam signa inflammationis appareant externe in collo, vocatur vel Paracynanche vel Parasyynanche, prout simul larynx, vel pharynx sit affecta, seu prout respiratio vel deglutitio sit impedita. In textu est *κυράγχη*. Ergo intelligit auctor eam anginæ speciem, quæ laryngi est infesta & suffocatam respirationem inducit; & quoniam illa species non præbet signa externa, scimus internam laryngis membranam affectam esse. Illa membrana jam inflammatione tumens raro ad septimum diem extenditur, quin ita faciat angustum transitum, ut æger suffocatus pereat. Quia vero inflammatio ad septimum usque diem increfcere solet, & dein commutari in suppurationem, inde plerumque inflammatio internæ membranæ laryngis suffocationem induxit, ante quam ad suppurationem deducta sit. Si autem levior fuit inflammatio & minor tumor, quam qui potuit inducere  
suffo-

suffocationem, illa post istud tempus formabit pus, quod sua gravitate deorsum descendens implet Tracheam arteriam & Bronchia, ubi stagnando collectum generat pulmonis suppurationem. Sed si inchoata angina talis sensim etiam pergit continuatam membranam Tracheæ & Bronchiorum inflammare, inducit Peripneumoniam, quæ interimit. *Suppurati*, *ἰμπερι*, sunt homines, qui vel in pulmonibus vel in cavo pectoris colligunt pus. Tales suppurationes præfagiuntur ex Angina prægressa, quæ abiit sine ratione, i. e. sine critica evacuatione: nam quæ angina emittit sputa copiosa cocta, non transmutatur in peripneumoniam, sed quæ evanescit sine evacuatione hac, & tamen ægri manserunt ultra septem dies superstites cum signis, materiem translatam esse ad pulmones, succedente peripneumonia id declarante. Ita habemus egregiam prognosin instantis suppurationis seu empyematis, ne decipiamur judicantes, ægrum esse sanatum, quia effugit anginam. Præstantius autem foret hoc instans malum evitare per optimam medendi methodum. Si vocamur in tali periculosa angina, omni ope tentanda est inflammationis resolutio per repetitam venæ sectionem, si unicæ non auscultat, alvus ducenda antiphlogisticis, collum fovendum cataplasmate, fauces colluendæ diluentibus cum adjecto nitro; & vapores aquosi sæpe hauriendi, qui usque in pulmones penetrant. Sed si his omnibus ante septimum diem non auscultat malum, reliquum tempus morbi ut peripneumonia suppuratoria vel empyema pertractandum, ut pus confectum per expectorationem ejiciatur. *Gorter.*

## APHOR. 11.

**Τ**οῖσιν ὑπὸ τῶν φθισίων ἐνεχλαμένεισιν, ἢ  
τὸ πύσμα ἔπερ ἀν ἀποθήσασι βαρὺ ἰζη  
ἐπὶ τῆς ἀνθρακας ἐπιχέμενον, καὶ αἱ τρίχες  
ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ῥέωσι, θανατῶδες.

**I**n tabe vexatis, si sputum quod tussi  
rejiciunt, carbonibus infusum gravem  
odorem emittat, & capilli e capite de-  
fluant, letale est.

## APHOR. 12.

**Ο**κόποισιν ἀν φθισιῶσιν αἱ τρίχες ἀπὸ τῆς  
κεφαλῆς ῥέωσιν, ἔπει, διαρροίης ἐπιγενομέ-  
νης, ἀποθνήσκουσιν.

**I**n tabidis si capilli e capite defluant,  
ii, superveniente alvi profluvio, mo-  
riuntur.

**H**os duos aphorismos in lib. 2. de morb. n. 46.  
ita expolitos legimus : Si quidem jam ca-  
pilli ex capite huic defluant, caputque velut ex morbo  
nudetur, & super prunas exspuenti sputum graviter  
oleat, hunc intra breve tempus periturum asserito,  
& ex alvi profluvio periturum. Ubi enim jam pus  
circa cor computruit, id prunis impositum nidorem  
exhalat,

*exhalat, & una incallescens cerebrum salsuginem emittit, quæ alvum ciet, cujus rei indicium est, quod capilli ex capite defluunt.* Ex quibus constat, ea, quæ in secundo aphorismo dicuntur, non ita esse accipienda, ut inferatur, posse defluvium capillorum fieri, cui diarrhœa non succedat: ut verba ipsa aphorismi sonant, sed ut quid necessarium sequi. Quare clarius fortasse dixisset aphorismorum compilator hunc in modum: *Quibus tabe laborantibus capilli de capite defluunt, hi per supervenientem alvi fluorem moriuntur;* aut quemadmodum in *Coac. sect. 3. n. 255. Tabidi, si capilli e capite defluunt, alvi profluvio moriuntur.* Atque hoc modo non solam mortem prædicere docemur, sed ejus modum, quod Medico non parum gloriæ parit. *Martian. p. 457. Celsus l. 3. c. 22. p. 168. longe periculosissimam dicit phthisin, si, quod excreatum est, in ignem impositum, mali odoris sit: & l. 2. c. 8. p. 71 sq. periculum subesse ait, ubi capilli fluunt; atque in sputis odor fœdus est; maximeque, ubi post hæc orta dejectio est, protinus moritur.* Periculum exinde est, quia fœtor corruptionem in pulmonibus indicat, & si capillorum defluvium accedat, significatur materiam purulentam in sanguinem raptam esse & usque ad superficiem corporis deductam, ubi acrimonia sua destruit radices pilorum. Ultima phthisicorum scena, si purulenti, corrupti, humores cum sanguine circulantés delati tandem fuerint ad glandulas & emissaria intestinorum, & ad extremum inferior alvus turbatur. *Hippocr. lib. 1. de morb. 2. 10. Exemplum legis in Eph. N. C. D. 1. a. 6. obs. 103.*

Spua duobus ex locis præcipue proveniunt. Primo ex tota membrana pituitaria & fauci-

bus; hæc excreatu solent reddi; tali enim actione sputum seu mucus tenax adhærens his partibus avellitur & ita rejicitur. Vel veniunt sputa ex larynge, trachea arteria & pulmonibus; hæc ejiciuntur iterata tussi, qua hæ partes agitantur & aër cum impetu emittitur, qui simul educit sputum lateribus harum partium adhærens. Quoniam auctor addit in primo aphorismo, *quod tussi rejiciunt*, hoc in loco intelligi debet sputum, quod ex pulmonibus venit. De hoc sputo dicit, *si gravem odorem emittat carbonibus infusum*. Ergo non est opus, ut sputa sint foetentia, nisi injecta carbonibus candentibus: auctoris enim nostri mens est, elicere indicia ex sputo non foetente, quod prunis injectum foetorem spirat. Simplex hoc experimentum magni est usus, si modo sciamus, quinam humores nostri inodores prunis injecti foetorem spirant, & qui inodores manent. Invenimus humores ex pituitaria membrana & trachea secretos, in ignem projectos nullum spirare foetorem; sed si sanguis, humor nutritius, & pus infunditur prunis, tunc semper exhalat foetor, etiam si aliter sint humores inodores. Ergo ex hoc experimento constat, vel humorem bonum circulatorium, vel pus tussiendo ejici. Quod experimentum non multum distat ab illo, quod cum sputo in aquam dejecto instituitur: nam excrementitii humores aqua sunt leviores, ac inde supernatant; humores autem circulatorii & pus aqua sunt graviores ac fundum petunt. Ex observatione secundi aphorismi satis constat, quam perverse multi dant medicamenta purgantia phthisicis, quum ipsa natura doceat, alvi evacuationem, ut signum & causam nocere; experti enim sunt Practici,

a purgante dato suppressi sputum, & si alvum referaveris, non esse in Medici potestate eam iterum suppressere posse. *Gorter.*

## APHOR. 13.

Ὅστις αἷμα ἀφρῶδες ἀναπύσσει, τρεῖς οἰσιν ἐν τῷ πνεύμονος ἢ πιαύτῃ ἀναγωγὴ γίνεται.

Qui spumantem sanguinem sputo rejiciunt, iis ex pulmone talis rejectio fit.

In *Coac. sect. 3. n. 250.* legitur: *Qui spumantem sanguinem evomunt, partibus infra septum transversum dolorem nequaquam sentientibus, iis ex pulmone vomitio fit.* Celsus l. 2. c. 7. p. 61. ita reddidit: *Qui spumantem sanguinem exscreant, bis in pulmone vitium est.*

Signum hic docetur, quo dignoscitur sanguinis ex pulmonibus rejectio sive hæmoptoe a sputo & vomitu cruento. Spumofus est sanguis, quia habet aërem inspiratum mixtum. Ejus tamen excretio non semper a pulmone primario affecto provenit. Nam identidem viscera abdominis sanguinea, ut hepar, lien, si insolitæ magnitudinis sunt sanguine & humore infarcta & obstructa, dum æquabilem sanguinis circulum, obice quasi posito, impediunt, ad immodicas & subinde exitiales sanguinis tam per vomitum & secessum, quam

B 5

per



per vasculosam pulmonis substantiam profusiones, disponunt. Etenim intercepto alicubi sanguinis libero per vasa transitu, vi legum hydraulicarum, impetus ejus sic increfcit, ut, ubi minorem resistantiam invenit, copiose confluat, vasa diducat tandemque perrumpat. Vid. *Hoffm. Med. rar. T. 4. P. 2. p. 34 & 55.* Ex hepate malum esse observavit Hippocrates *Coac. sect. 3. n. 216 & 273.* Qui *spumantem sanguinem spuitione rejiciunt, cum præcordiorum dextrorum dolore, iis ex jecinore prodit, & plerumque pereunt.* Ita, ut aphorismo præsentī doceamur tantummodo cognoscere in universum, per quam regionem sanguis excernatur, non quæ pars afficiatur, quando sanguinis spumosi sit excretio, nec quod in sanguinis spumosi rejectione pulmones semper affecti sint. *Martian. p. 257.* At vero, qui omni vitio carent sub diaphragmate, nec sunt colore flavo, subviridi aut fusco fœdati, habentque hypochondria bene morata, beneque constituta in omni beneficio æqualitatis; in substantia quidem, mollia, solida, & succi plena; in quantitate, *λατὰ, i. e. in mediocritate posita contractionis & tensionis;* in qualitate vero, æqualiter suaviterque calida; denique a norma & præscriptione naturæ nusquam egressa; sine ulla umbilici palpitationes aut micantis arteriæ coeliacæ perceptione: tunc sanguinis exspuitio venit a pulmone. Quoniam nihil opinionem facit sanguinis anadromen facientis; non suppressa juvenum, familiaris olim, hæmorrhagia; non hæmorrhoides hominum hæmorrhœicorum; non menstrua menstrualium. Deinde copia effluentis, tum effluendi modus, qui tanquam vomendo fit, ac

ac sine dolore: hæc omnia sunt sanguinis a pulmone manantis *τεμνύρια*. Pleno ore profundunt sanguinem: quale est illud Virgilianum 2 *Georg.* 461.

- - - *foribus domus alta superbis  
Mane salutantum totis vomit ædibus undam.*

Et *Æneid.* l. 9. *ψ.* 349. *Purpuream vomit ille animam: ... accepto vulnere in thorace. Spectat aphorismus ad phthisin, cujus origo est illa pulmonum hæmoptysis, vel hæmorrhagia. Duret. in Coac. p. 291 sq.*

## APHOR. 14.

Τὸ ἐν φθίσει τοῦ ἐχομένου διάρροια ἐπιγενομένη, θανάτωδες.

**P**hthisi succedens alvi profluvium, letale.

**I**n *Coac. sect. 3. n. 256.* extat: *Tabidis si succedant alvi profluvia, moriuntur.* Vid. etiam *ibid. n. 244. & lib. 1. de morb. n. 11. & 14.*

Insinuat hic aphorismus, quod diarrhoea tabidis tunc solum letalis censenda sit, cum iisdem jam consumptis supervenit, juxta præced. *aph. 12.* principio enim morbi non letaliter aliquando supervenire potest. *Martian. p. 458.* Imo & ubi a vomica rupta abscessus apertus oritur & magna puris ejicitur copia atque sic restitutionis in integrum affulget spes, mitioribus laxantibus primas vias ab humorum vitioforum colluvie repurgare confert. Vid. *Hoffm. Med. rat.*

*rat. T. 4. P. 4. p. 311. & 319.* Purgantia autem paulo validiora, ut aloëtica, scammoniatā, elleborata, multo magis emetica, tum vires infringendo, tum temperatum humidum educendo, mirum in modum nocent: quare ubi humores a pectore derivandi leniterque per alvum evacuandi indicatio est, hoc sine mannata, tamarindinata & quæ ex rhabarbaro, agarico & sennæ foliis consunt laxantia, omnium sunt commodissima; & si talia nimiae humorum copiae imminuendæ parvâ dosi data non sufficiunt, aut si humores nimis crassi & visciidi, qui minima vascula obstruunt, resolvendi & educendi sunt, pillulæ de succino Cratonis, aut quæ gummi ammoniaco, croco, mercurio dulci, extracto rhabarbari, aloës &c. conficiuntur, aptissime possunt substitui. *ibid. p. 327.* Si vero purgantis remediî usu phthisis ad intestina convertatur sub specie torminum ventris, & diarrhœæ; fere non erit amplius in potestate Medici talem sistere diarrhœam; nam ad oscillationem illam omnia colliquando ruunt liquida, hinc mors. *Bagliv. p. 370.* Auctore *Celso l. 3. c. 22. p. 171.* alvus cita utique vitanda est. Prognosis certe salutaris aperitur, si alvus compacta deponit, apud *Hoffm. l. c. p. 309.* Hujusmodi ægris si alvus perturbetur, malum est, juxta *Aret. de caus. diut. l. 1. c. 8.*



APHOR.

## APHOR. 15.

**Ο**κόσοι ἐν πλευρίδι ἔμπυοι γίνονται, ἢ ἀνακαθαρθῶσιν ἐν πεσάραιοντα ἡμέρῃσιν, ἀφ' ἧς ἀν' ἡ ρήξις γένηται, παύονται· ἢν δὲ μὴ, εἰς φθίσιν μεδίσονται.

**Q**ui ex morbo laterali suppurati fiunt, si intra dies quadraginta, ex quo ruptio facta est, superne repurgentur, liberantur: alioqui in tabem transeunt.

**L**eginus in *Coac. sect. 3. n. 142*: Qui ex morbo laterali suppurantur, in quadraginta diebus post ruptionem pus spatione rejiciunt; & *ibid. n. 210*: Quibus tubercula in pulmone oriuntur, ii pus intra dies quadraginta, ex quo fit ruptio, exspuunt, quos si superent, ut plurimum tabidi fiunt. Celsus ita reddidit: *Laterum dolores, suppuratione facta, deinde intra quadragessimam diem purgata, finiuntur. Tabes subit, si in lateris dolore orta suppuratio intra quadraginta dies purgari non potuit. lib. 2. c. 8. p. 66. & cap. 7. p. 62.*

Est aphorismus præsens consuetarium præcedentis *aph. 8.* docens, quod si spatio quadraginta dierum non facta fuerit repurgatio, h. e. si intra dictum temporis spatium puris screatus non cessat, fiat phthisis, a pure retento, quo pulmo infectus exulceratur. Qui pus intro collecturi sunt, iis primum quidem falsuginosum sputum exspuitur, deinde dulcius. *Hippocr. Coac.*

*Coac. sect. 3. n. 209.* At purulentos omnes his signis dignoscere oportet. Primum quidem si febris non dimittit, verum interdiu levior quidem, noctu vero major detinet, & sudores multi oboriuntur, tussisque & tussendi cupiditas ipsis inest, nihil tamen effatu dignum expuunt, oculique cavi redduntur, malæ ruborem contrahunt, & ungues quidem in manibus adunci fiunt, digiti vero maximeque summi incalescunt, & in pedibus tumores fiunt, cibos minime appetunt, & pustulæ toto corpore oriuntur. At vero suppurationes magna ex parte rumpuntur, partim quidem vigesimo die, partim etiam trigesimo, quædam quoque quadragesimo, aliquæ etiam ad sexagesimum diem deveniunt. Suppurationis autem initium fore ratione comprehendere oportet, ab eo die quo primum æger febricitavit, aut etiam primum rigor prehendit, & si, pro dolore, sibi pondus inesse in eo loco, qui dolore affligebatur, dixerit. Ista namque circa suppurationum initia fieri solent. Ex hoc igitur tempore suppurationum ruptionem fore intra prædicta tempora expectandum est. At ex his, quæ citius aut tardius rumpuntur, sic deprehendere licet. Si quidem dolor inter initia oritur, & spirandi difficultas, ac tussis sputatioque perseverant & ad vigesimum diem extenduntur, intra hoc tempus, aut adhuc prius ruptionem expectato. Quod si mitior dolor fuerit, iisque cætera omnia pro hujus ratione respondeant, tardius ruptionem sperato. At ante puris eruptionem dolorem oboriri, & spirandi difficultatem, & sputi excretionem necesse est. Superfunt autem ex morbo hi potissimum, quos febris eodem post ruptionem die

dīe dimisit, quique cibos celeriter expetiverint, & siti liberantur, venterque tum exigua, tum coacta dejicit, & si pus album & lævo ejusdemque coloris fuerit, & a pituita liberum, citraque dolorem aut tussim vehementem educatur. Sic quidem optime & celerissime liberantur, sin minus, qui ad ista proxime accedent. *Hippocr. Prænot. n. 15. 16. 17. Conf. Dures. in Coac. p. 240. In Eph. N. C. D. s. a. 3. o. 98.* observatio est de pleuritico purulenta exspuente ultra terminum in præsentē aphorismo determinatum, qui convaluit usu lactis caprilli cum conserva rosarum per aliquot septimanas continuato.

## APHOR. 16.

**Τ**ὸ θερμὸν βλάπτει ταῦτα τοῖσι πλεονάκεις  
χρεσμένεσι, σαρκῶν ἐκθήλυνσιν, νεύρων  
ἀκράτειαν, γνώμης νάρκωσιν, αἱμορραγίας, λει-  
πυσμίας· ταῦτα οἷσι θάνατον.

**C**alidum eo frequentius utentibus has  
adfert noxas, carniū effoemina-  
tionem, nervorum impotentiam, men-  
tis torporem, sanguinis profluvia, ani-  
mi defectiones, ad quæ mors sequitur.

**P**ræsens aphorismus una cum proxime se-  
quentibus absque dubio ex *lib. de humid. usu*  
desumptus est, ubi n. 3. totidem legitur verbis.  
Cum autem ejus libri intentio sit de usu liqui-  
dorum tractare, quæ exterius admoventur,  
patet,

patet, quæ de aquæ calidæ & frigidæ facultatibus hoc in loco traduntur, perperam extendi ad ea, quæ interiorius assumuntur. *Martian. p. 458. Celsus ita reddidit l. 1. c. 9. p. 40: Calor si nimius est, corpus effæminat, nervos emollit; & l. 2. c. 1. p. 44. Calor omnis mentem bebetat, & ut anima deficiat, ut sanguis prorumpat, efficit.*

Aqua calida laxat contextum fibrosum, atque frequenter usurpata producit *carnium effæminationem*, h. e. mollitiam & laxitatem; motum muscularem torpescentem & *nervorum impotentiam*, atque hinc pendentem *mentis torporem*; facilem vasorum extensionem, rupturam, unde *sanguinis profluvia*, & hinc *animi defectiones* seu deliquia, ac denique *mortem* a defectu virium, fatifcenteque motu solidorum.

#### APHOR. 17.

Τὸ δὲ ψυχρὸν σπασμὸς, πένις, μελασμός, καὶ ῥίγη πυρετώδεια.

**F**rigidum vero convulsiones, nervorum distentiones, denigrationes, & rigores febriles.

**E**xstat hic aphorismus totidem verbis in *lib. de hum. us. n. 3.* ubi de aquæ frigidæ immoderatus corpori exteriori admotæ noxis agitur. In *lib. de fractur. n. 37.* ubi Hippocrates cavendum esse docet, ne ossa nuda frigidis per exordia perfundantur, propter metum rigorum febrilium, mox pro ratione addit: *frigida enim semper convulsionem accersunt*; & in *lib. de artic. n. 74.* similiter, postquam cavisset, ne  
tibiæ

tibiræ ossibus luxatis applicentur splenia vino madentia admodum frigida, subdit: *frigus namque in hujusmodi affectibus convulsionem accersit.* Hinc etiam Celsus l. 2. c. 1. p. 45. non privatim de aqua frigida, sed de omni frigore in genere doctrinam Hippocraticam exponit: *Frigus modo nervorum distentionem, modo rigorem infert; illud σπασμὸς, hoc τένανος Græce nominatur: nigrorem in ulceribus & horrorem in febris excitat.*

Præcipuus atque primus frigoris effectus est, solidorum quorumcunque contractio, fluidorum densatio. Applicatum ergo corpori humano, constringendo vasa ad cutim locata, eorum actionem in humores auget, ut celerius pellantur contenti liquores, & sanguis majori cum impetu ab exterioribus ad interiora corporis deferatur: unde major nascitur corpori calor (id quod etiam docemur in *lib. de humid. us. n. 6: corpus post frigida usum contractum magis recalescit.*) Si autem eousque quædam constringatur vasa minima, ut non transmittere queant humores, quos, ubi aperta erant, continere semper & aliò, lege circulationis, pellere solebant, liquidorum copia manente eadem, meatuum sive viarum numero imminuto, celerius sanguis movebitur reliquus per vasa patula. Ergo & sic a frigore calor. In obturatis jam canalibus stagnans humor densatus, & pressus a sanguine appellente ad partem, non vero ulterius penetrare valente, vasa sua extendit & attollit: interim sanguine impetum faciente ad partem obstructam, oritur inflammatio, quæ sæpenumero abit in gangrænam. Conf. *Rivin. de frig. damn.* A virtute itaque frigoris humores corporis nostri densante;

Vol. II.

C

fi-



fibrasque & vasa constringente, atque hinc impedito per vasa minima exteriora libero sanguinis & humorum circuitu, graves & periculosos, in partibus præsertim debilioribus infarctus, vasorum repletiones & morbiferas stases & stagnationes oriri clarum est. Vid. *Hoffm. Med. rat. T. 1. p. 324. T. 2. p. 436.* Et *convulsiones* quidem (*σπασμοί*), Celsi *nervorum distentiones*) seu invitæ, violentæ, & alterne repetentes, musculorum contractiones, a liquido nervoso fortiter & diu in muscolum influente, fiunt vel idiopathicæ ab ipsis spinalis medullæ membranis primario irritatis, convulsis, & in hanc convulsionum societatem alias sibi connexas partes abripientibus; vel sympathicæ, cum partes quædam a frigore constrictæ, irritatæ, distentionem cum medulla spinali communicant, ex qua ad alias iterum desertur regiones. vid, *Hoffm. l. c. T. 4. P. 3. p. 61.* *Nervorum* autem illa *distentio* (*ῥίγανος*, *rigor* Celsi), in qua vel universum corpus, vel singulare aliquod membrum omnino rigidum existit, ut in neutram partem flecti queat, quum sit convulsio musculorum flexorum & extensorum simultanea, ponit majorem partium nervosarum a frigore irritationem & stricturam. *Denigrationes* partium manifestant factam gangrænam, infausto inflammationis exitu, vascula rigida rupta, liquores stagnantes putrescentes, ichorem sub epidermide effusum. *Rigor* (*horror* apud Celsum) generaliter notat frigoris sensum illum *ubi totum corpus intremis*, ceu exponit Celsus l. 3. c. 3. p. 116. qualismodi in febrium intermittentium accessu percipitur. Inde apposite in textu nostro *rigores febiles*; quia, ut in febribus rigorem excipit calor, ita

ita etiam ab frigore, quod exterius admove-  
tur, post rigorem corpus incalescit. Sicuti  
vero febre utitur natura tanquam salutaris in-  
strumento, per auctiorem nempe progressivum  
humorum motum, quo expugnet ipsam suam  
causam, corrigendo nimirum, resolvendo,  
excernendo materiam morificam (*Hoffm. l.*  
*c. T. 4. P. 1. p. 8.*); ita rigores sunt semper  
signa coactæ retentionis ejus, quod natura ex-  
pellere & secerni avet. vid. *Linn. de febr. in-*  
*term.* Non autem aphorismus præsens privatim  
de rigoribus intelligendus est, qui in febribus  
contingunt, de quibus tractat Hippocrates *1 de*  
*morb. n. 22.* & Celsus intelligit; sed de illis,  
qui etiam in secunda valetudine percipiuntur a  
perspiratione impedita, poris per frigus adstri-  
ctis: nam ibi non legitur *ῥίγας πυρετώδεις*, *rigo-*  
*res febriles*, sed *ῥίγας ἐν τῇσι νόσοις* *rigor in hisce*  
*morbis*. Quid? quod Celsus ipse, ubi *l. 1.*  
*c. 9. p. 39.* ex frigore horrores tremoresque na-  
sci ait, hæc verba non profert ad notandos  
effectus frigoris in morbis, febribus, verum  
in quovis statu corporis humani; quamvis for-  
te ante oculos habuerit locum cit. *Hippocr. 1.*  
*de morb. n. 22.* in quo etiam distinguitur horror  
a tremore, imo horror a rigore: nam ibi *τὸ*  
*ῥίγας rigor* dicitur, quando refrigerato sanguine  
reliquum totum corpus refrigeratur, qui rigor  
ubi vehemens fuerit est *τρεμὸς ὁ τρεμὸς*; horror  
autem, *ἡ ὀπίκη*, significat quod est debilissimum.  
Quid autem significat Tremor? Hujus nomi-  
ne intelligunt Medici alternam eorundem mu-  
sculorum contranitentium contractionem a de-  
bilitate proveniente, & luctari, ajunt, pon-  
dus partis cum facultate, quæ ut debilis modo  
superat, modo superatur; res autem ita se ha-  
bet.

bet. Quoniam muscoli alterne contrahuntur, & cum sustinendum est pondus per temporis spatium longius, quam unica naturalis contractio fert, oportet, ut multæ, sed frequentissimæ contractiones repetantur, vel ut continue contrahatur musculus, per quantum temporis spatium requiritur, h. e. ut continue per illud spatium temporis spiritus deriventur in musculos; igitur qui paucis spiritibus donantur non solum apta ad frequentissimas, & multas contractiones, vel una producta per longum tempus quantitate spirituum destituentur, verum fieri poterit, prout magis, ac magis deficiunt spiritus, ut muscoli contrahantur rarius, quam in naturali statu, unde elevabitur, ac demittetur alterne pondus rarius, frequentius, prout major, aut minor copia spirituum viget, seu in iisdem dabitur tremor crebrior, rarior. Hinc in senibus, in imbecilibus, in sui ipsius diffidentibus, qui nempe dubitant, num iis viribus polleant, quæ sufficiant oneri, contingit tremor; per ejusmodi enim suspensionem jam excitatur tremoris species, imo vero ipsa suspicio vigens nihil aliud est, quam ipsa tremoris species jam excitata: hinc etiam validi in tremorem venimus, cum calicem vino nimis plenum tenere, & admoveere ori cogimur; statim enim dubitamus, num tanti sumus ad traducendum calicem absque eo, quod vinum defluat, cum opus sit contractione maxime æquabili, atque continua, ejusmodi autem dubium nihil aliud est, quam species tremoris, qua actu vigente fiat tremor oportet. *Bellin. de urin. &c. p. 562.*

APHOR.

## APHOR. 18.

**Τ**ὸ ψυχρὸν πλέμιον ὁσίοισιν, ἰδῷσι, νεύροις,  
ἐγκεφάλῳ, νωτιαίῳ μυελῷ· τὸ δὲ θερμὸν  
ὠψέλιμον.

**F**rigidum ossibus adversum, dentibus,  
nervis, cerebro, dorsali medullæ:  
calidum vero utile.

**S**edes hujus aphorismi est in *lib. de humid. uf.*  
*n. 4.* Cerebrum quæque ex eo oriuntur, frigida  
quidem offenduntur, calida vero delectantur, etiam si  
naturaliter frigidius & solidius. Eam ob causam ossi-  
bus, dentibus, frigida adversa est, calida vero gra-  
ta, quoniam convulsiones, distensiones, rigores fe-  
briles, quos frigida creat, calida sedat. Celsus in  
hunc modum profert *l. 1. c. 9. p. 39*: *Frigus*  
*inimicum est ossibus, dentibus, nervis, vulvæ, ce-*  
*rebro.*

Ossa, dentes, nervi, partes sunt densæ  
structuræ, donatæ proin vasculis stricte compres-  
sis, quorum cum arctissimi diametri sint, a  
frigore applicito facillime læduntur, hoc enim  
densando & arctando lymphæ motum aut tar-  
dat aut sistit; unde facta stasi convulsiones &c.  
juxta *aph. 17.* Cerebro & spinali medullæ ini-  
micum quoque frigus constringendo tenuissima  
vasa; unde eadem mala. Calidum vero con-  
trà amicum est dictis partibus, quia laxando  
vascula densata liberum conciliat humoribus  
motum. *Hecquet.* Uti vero omne frigus parti-  
bus

bus nervosis inimicum est; ita maxime ventriculus & intestina, inter nervosas præcipuæ partes, perniciosam a frigido potu proxime & primario vim experiuntur, dum non modo a frigore sanguinis & lymphæ nervorum per has partes liber transitus impeditur, sed & tonus & motus earum peristalticus ob rigiditatem, quam fibris infert, labefactatur, unde inflammatio, cardialgia, colica, iliaca passio, proveniunt. vid. *Hoffm. Med. rat. T. 2. p. 314.* Nulli autem ætati ut omne frigus, ita maxime frigida potio tam insensa est, quam senili. Nam senes jam per se ex omnium Medicorum consensione calidi, ut loquuntur, nativi defectu laborant, & valde languidum ad concoctionem habent ventriculum, idque eam ob causam, quia arctioribus meatibus redditus sanguis & fluidum nerveum uti in omnes partes, ita maxime in ventriculum & intestina parviori copia influunt. Quare multo facilius cursus sanguinis a frigido in his partibus sisti potest, adeo, ut sphacelus mox eas partes corripiat. Quin etiam a sola refrigeratione harum partium propter fructus horæos refrigerantes, æstivo tempore magna in copia ingestos, aliquot decrepitæ ætatis viros mortuos animadverti. Quidam in stranguriam inde incidunt molestissimam, quæ ægerrime sanationem recipit. Alii dolorem colicum, rursus alii affectus soporosos inde sibi contraxerunt. Atque hoc saluberrimum præceptum circa noxam potionis frigidæ non modo senes, sed & alii infirmioris naturæ homines & valetudinarii, & qui ex præcedente morbo, vel immodicis evacuationibus vires & vigorem amiserunt, omni cura observare debent, siquidem nihil tam subitam  
in

in perturbanda motuum vitalium œconomia mutationem, præter excessivum frigus, sive cum potu, siue extrinsecus corpori admissum, inferre potest; sique Medici morborum tam chronicorum, quam acutorum primordia paulo curatius investigare vellent, certissime futurum esset, ut nihil magis, quam frigidum potum sanitatem offendere deprehenderent. *Ibid.* p. 319. Cave tamen existimes, aphorismum hunc simpliciter & absolute sumtum verum esse. Nam nonnisi immoderatum frigidæ usum noxium corpori censendum esse, indicavimus ex Hippocrate ad proxime præcedentem *aph.* 7, & ad *aph.* 16. vidimus etiam calorem nimium lætere. *Iis enim quæ lædunt aut juvant, & si sunt ejusmodi, eousque uti convenit, quoad juvare vel lædere videantur. Calida ne ulterius procedat, ut uras. Verum in his ejus qui affundit cutis judex esto ac similiter in frigida. Harum autem utraque noxam aufert; ac moderatus quidem usus juvat.* lib. humid. *us.* n. 1. 2. 3.

## APHOR. 19.

Οἷοντα κατέψυκται, ἐκθερμαίνεν δὲ, πλὴν  
ἐκόσαι αἰμορραγίαι, ἢ μέλαινα.

**P**erfrigerata excalefacere oportet, præter ea, quæ sanguinem effundunt, aut brevi effundent.

**I**n lib. de humid. *us.* n. 1. legitur: *Frigida calefacere, velut pix, ulceribus, præterquam ex quibus sanguis effluit, aut effluxurus videtur.* Apud Celsus l. 1. t. 9. p. 39: *Calor adjuvat omnia, quæ frigis infestat.*

C 4

Nimi-

Nimirum juxta *Hippocr. lib. de flat. n. 2.* contrariorum contraria sunt remedia. Calor perfrigerata juvat, quia laxat constricta & obstructa aperit, ut liber sit humoribus in parte motus. Hinc etiam est, quod dicatur in *de humid. us. n. 11. calidam plurimum conferre iis, quæ a frigore aut moriuntur, aut ulcerantur.* Sed vero experientia repugnat, docens potius immergendam esse partem congelatam in aquam frigidam, aut fricandam nive. Quin fatetur ipse *Cous l. c. n. 2.* pedes quibusdam perfrigeratos decidisse ex calidæ affusione. Quomodo igitur hæc inter se cohærent? Solvit dubium Aristoteles *1. Probl. 55. 56.* quando affirmat, calidâ æque ac frigidâ curari ejusmodi ægros, sed frigidam esse præmittendam. Talis curatio septentrionalium plagarum incolis usitatissima est. Partes enim congelatas, ante quam ad ignem vel vaporarium accedunt, nive probe perfricant, aut immergunt in aquam frigidam aut nivem. In altero aphorismi membro docemur, quod calefacere non convenit, ubi nempe metuitur, vel adest, sanguinis fluxus, quia laxando tonum partis sanguis eo versus magis invitatur, & a facili vasorum extensione rupturæ contingunt, juxta notata ad præcedentem hujus sect. *aph. 16.* contrà autem sanguini profluenti aut paulo post fluxuro adhibenda frigida est, ex sequente mox *aph. 23.* Utinam memoriter tenerent dicta, qui tabescentes ex hæmoptysi, confestim solio calidæ immergendos curant, hinc recrudescit morbus, & pristinæ duplicantur difficultates. Interim & hoc notandum, non interdici ab auctore calidæ usum, ubi futura est sanguinis eruptio naturalis, sed quæ præter naturam. Sic ubi tardigradus attenditur mensium reditus, nullum

nullum præstantius auxilium, quam infessio in calida, præfertim si fuerit medicata. *Nard. Noët. gen. p. 25 sq.*

## APHOR. 20.

Ἐλκεσι τὸ μὲν ψυχρὸν δακνῶδες, δέρμα περι-  
σκληρύνει, ὀδύνῳ ἀνεκπύητον ποιεῖ, μι-  
λασμοὺς, ῥίγηα πυρετῶδεα, σπασμούς, καὶ π-  
πάνως.

Ulceribus quidem frigidum mordax est, cutem obdurat, dolorem insuppurabilem facit, denigrationes, rigores febriles, convulsiones, nervorum distentiones.

Paulo plenius in *lib. de humid. us. n. 11*: Ulceribus frigida quidem mordax, cutem obdurat, tumorum dolentium suppurationem impedit, livorem & nigredinem inducit, rigores febriles, convulsiones item ac distentiones. Brevibus Celsus *l. 1. c. 9. p. 39.* expedit: *Frigus summam cutem facit pallidam, aridam, duram, nigram. Ex hoc horrores, tremoresque nascuntur.*

Mordax ulceribus intelligitur esse frigidum, quia patula vascula constringendo, repellit humorem lymphaticum eructandum, a quo stagnante, pressisque lateralibus, dolor, & impedita suppuratio: quæ sunt spasticæ fibrarum rigiditatis incommoda. *Hecquet.* Reliqua sunt clara ex dictis ad sect. huj. *aph. 17.*



## APHOR. 21.

**Ε**στι δὲ ἔκπρὸς ἐπὶ πάντας ἀνευ ἑλκίους, νέφ' εὐπάρ-  
κην, θέρμιος μέσση, ψυχρὰ πολλὰ κατὰ χυ-  
σις ἐκπανάκλησιν θέρμης ποίεεται· θέρμη δὲ ταύτης  
ρύεται.

**Q**uandoque tamen in nervorum dis-  
tentione absque ulcere, in juvene  
corporis habitu carnosio, ætate  
media, frigida copiosa perfusio caloris  
revocationem efficit: calor autem hæc  
solvit.

**I**isdem verbis hic aphorismus legitur in *lib.*  
*de humid. us. n. 11.* Apud Celsum *l. 1. c. 9.*  
*p. 30.* tantum hæc habentur: *frigus prodest juve-*  
*nibus, & omnibus plenis.*

Connecti potest hic cum præced. aphorismis  
17. 18. & 20. ubi partibus nervosis nocere  
dicta est frigida, spasmosque inducere; ita ut  
nunc ostendatur, illis non contrariam esse ob-  
servationem; frigidam aquam in distentione  
nervorum aliquando profuisse: eo quod juvet  
ex accidenti, ut ajunt, revocando calorem ad  
interiora.

*Tetanus* significat hic rigorem fibrarum, ceu  
illarum tonicum spasmus, quem juvenibus,  
imo juvenculis, bene carnosiss, parit sanguinis  
plethora aut succorum luxuries. Hujus gene-  
ris spasmis laborans mulier illa sana & obesa,  
quæ multoties exanimata h. e. syncopen passa  
est,

est, ut expirasse videretur, quæ ab aquæ frigidæ amphoris circiter triginta corpori affusis servata est. Vid. *Hippocr. 5 Epidem. n. 18.* Simile quid exhibet subitanea tendinum & membranarum pedis violentius & ultra modum facta extensio, quam cito sanat illico facta in frigidam pedis immersio: *caloris enim revocationem facit frigida multæ affusio*: i. e. restituit constringendo, densando, elaterem partium a nimia distentione labefactatum, ut suscitata oscillandi virtute succorum stases discutiendo solvantur, atque circulationi reddantur. Præstat salutarem effectum affusio aquæ frigidæ tantum in *juvenibus, bene sanis*; nam hi, gaudentes robore solidorum, resistere possunt impetui, quem applicita frigida, ab exterioribus ad interiora corporis pellendo humores, exserit: nam in frigidis, senibus, laxis, mollibus, infantilibus corporibus, tale præsidium spasmos creabit, juxta 5 *aph. 17.* *Æstate media* remedium dictum procedere dicit aphorismus; eo quod tunc vascula ad cutem disseminata, laxata a calore, constrictione per frigus facta, remeare faciunt humores ad interiora, ut eò pulsi motu suo stasibus solvendis impendantur. Inde additur: *calor autem hæc solvit*: h. e. quia calor excitatur in corpore per frigidæ affusionem, resolutio spasmi attribuenda venit calori. Prospiciendum vero, ne in corpore sit aliquod ulcus, propter 5 *aph. 20 & 25.* *Hecquet.* Equidem Hippocrates 3. *de morb. n. 14.* in tetani & opisthotoni curatione præcipit aquæ frigidæ plurimæ superfusionem indistincte omnibus, non annotata ulla jam dictarum cautionum seu conditionum: Quare etiam admonet Paulus l. 3. c. 20. frigidæ superfusionem in hisce morbis

bis maxime temerariam esse, eoque posteris vituperatam & a se ipso damnatam, devitatamque. Nihilominus tamen fatetur optimum hisce affectibus esse præsidium febrem, quæ per initia non fuerit, supervenientem: id quod Hippocrates observavit 4 aph. 57. item 5 aph. 70. In l. 1. de morb. n. 6. *Mulier ex partu convulsione infestata, si febris succedat, bono est: Si distensio (τίτασις) aut convulsio detineat, febrem supervenire bonum: & Medicis imitandum proposuit 2 Epidem. n. 10. ubi, Puerperas, ait, si convulsio prehenderit, febrem excitare convenit; suadet autem manifesto in præsentem aphorismo febris talis excitationem. Nempe aqua frigida quando superfunditur corpori juvenili in media ætate, poris & fibris constrictis rigor ac horror fit, & repellitur sanguis ad interiora, sicque sollicitans cordis musculos excitat motus vehementiores, qui valde proficui sunt ad tollendas chronicorum morborum causas: semper enim & necessario, ut loquitur Hippocrates 1 de morb. n. 22. post rigorem major aut minor febris supervenit. Longe vero tutius est, medicamentis validioribus, quæ motum injungunt sanguini & humoribus, causas morborum chronicorum remove. Et hinc luculentissime patet ratio, quare decens usus decoctorum liguorum, Thermarum, Acidularum, Salivantium, Sudoriferorum, Diaphoreticorum, in chronicis & radicatis passionibus expurgandis, tanta vi tantaque efficacia polleat. Hoffm. de sal. febr. §. 37. Conf. Haen Rat. med. P. 6. p. 151.*

APHOR.

## APHOR. 22.

**Τ**ὸ θερμὸν ἐκφυηκόν, ἔκ ἐπὶ παντὶ ἔλκει, μέγιστον σημεῖον ἐς ἀσφαλείην· δέρμα μαλάσκει, ἰσχυαίνει, ἀνώδυνον, ῥιγέων, σπασμῶν, πτόνων παρηγορῶν· τὴν δὲ ἐν τῇ κεφαλῇ καρηθαρσίην λύει. πλεῖστον δὲ διαφέρει ὅστων κατὰ γ-μασι, μάλιστα δὲ πῖζιν ἐψιλωμένοισι, τρεῖς δὲ μάλιστα πῖζιν ἐν κεφαλῇ ἔλκεα ἔχουσι· καὶ ὁκό-σαι ὑπὸ ψύξι· θνήσκει, ἢ ἐλκεῖται, καὶ ἔρρη-σιν ἐσθιομένοισιν, ἔδρη, αἰδοίη, ὑσέρη, κύστι· τρεῖς τοῖσι τὸ θερμὸν φίλον καὶ κρῖνον· τὸ δὲ ψυχρὸν πολέμιον, καὶ κλεῖνον.

**C**alidum suppurationem movens, non in omni ulcere, maximum securi-  
tatis indicium exhibet: cutem emollit,  
extenuat, dolorem tollit, rigores, con-  
vulsiones, nervorum distentiones miti-  
gat; capitis gravitatem solvit. Ossium  
vero fracturis plurimum confert, sed  
præcipue his, quæ carne nudata sunt;  
iisque maxime, qui in capite ulcera ha-  
bent; his etiam quæ a frigore emo-  
riuntur, aut exulcerantur, & herpeti-  
bus exedentibus, fedi, pudendo, utero,  
vesicæ, iis omnibus calidum gratum &  
judicationem faciens; frigidum vero  
inimicum, & interimens.

Totus

**T**otus hic aphorismus scriptus est in *lib. de humid. us. §. 11.* his verbis: *Calida, etsi non in omni ulcere suppurationem promovet, maximo tamen est securitatis indicio, cutem emollit, attenuat, dolorem tollit, rigores, convulsiones, distentiones mitigat, ipsa quoque capitis gravitatem solvit. Plurimum autem ossium fracturis confert, præcipue vero denudatis, ex hisque maxime capitis vulneribus, & iis quæ a frigore moriuntur, aut ulcerantur. Ulcerationibus itidem tum voluntariis, tum involuntariis; & quibus cutis abrasa est, herpetibus exedentibus, denigratis, sive in gingivis, sive in aure, sive in ano, sive in utero. His omnibus calida grata est, & ad judicationem confert, frigida vero adversa est, & interimens.*

Calidæ aquæ vires ad usum medicum externum hic laudantur, contrariæ illis quæ de aqua frigida enarratæ sunt in præced. *aph. 17. 18. 20.* *Suppuratoria* est ob calorem & humiditatem, quibus binis qualitatibus promoventur suppurationes. hinc *in ulcere non omni* prodest, sed in eo, quod suppurationis capax est; tunc ergo *magnum signum securitatis erit*: nam ulcera in tantum sanabilia sunt, in quantum ad felicem possunt duci suppurationem. Quoniam *emollit, extenuat, laxat crispaturam fibrarum, ita sine humorum solvit, prodest ad dolores mitigandos, sedat rigores, spasmos, distentiones, capitis gravitatem solvit. Ossium fracturis, maxime denudatis, plurimum confert*, eo quod phlogoses præcavet, & præsentis tollit; maxime vero si simul *in capite ulcera fuerint. Hecquet.* At vero ulcera calidâ delectari, quod tegi sint solita, omnium opinione constat, ut notat Hippocrates *de humid. us. n. 5.* In iis, quæ a frigore emoriuntur, aut exulcerantur, aquam calidam  
perni-

perniciosum esse remedium, demonstrat experientia, & ipse Hippocrates l. c. n. 2. observavit, quibusdam pedes perfrigeratos decidisse ex calidæ affusione. Quare non ita intelligendus est aphorismus, ut statim a summo frigore ad extremum calorem transeas. Est autem modus primum talis. Ubi pedes vel alia pars obrigit gelu, ponendus est laborans non multum prope ignem magnum, tamen ut aër incalescat: membra autem gelu durata in aqua e puteo statim hausta, atque ita emollienda: post vero ponenda sunt in tepida, ubi aliquid sensus receperint: demum linteis tepidis ac mollibus sunt involvenda multiplici circumvolutione: ac ubi refrigerantur permutanda, sensim vero calidiora admovenda. Causa horum est, quod dicitur ab Hippocrate *ibid. n. 6.* quod *post calidæ usum corpus perfrigeratum magis frigescit, & post frigidæ usum contractum magis recalescit.* Itaque dum tenuis est adeo calor in congelatis, per calidam evanescit, per ignem vero etiam adurit: ob id calida ab initio non convenit, ignis autem nunquam nisi post restitutionem. *Cardan.* Curatio septentrionalium plagarum incolis usitatissima est. Partes congelatas ante, quam ad ignem vel vaporarium accedunt, nive probe perfricant, aut immergunt in aquam frigidam aut nivem. Laudantur etiam vulgo adversus perniones rapa congelata, poma putrida, puls avenacea. Instar omnium esse potest pediluvium ex decocto agrimonie, hyssopi atque majoranæ, si nondum exulcerati sint, pro scopo discutiendi: si exulcerati jam fuerint, ex ochra thermarum; quod utrumque multiplici experimento confirmatum est. *Ricin. de frig. damn.* Mulierculis Danicis usitata est

est puls ex avena contrita pro cataplasmate calide applicata, terebinthina, fæx cerevisiæ melioris, & tostus raphanus. In ulceratis tamen cautius procedendum. *Barthol. de nive, p. 179.* Si cui a magno gelu læso *phlyctæna*, i. e. pustulæ lividæ, pallidæ, aut, quod pessimum, nigræ exortæ sint, ne aspernetur malum, sed mature se curandum committat Medico aut Chirurgo experientia confirmato: neque citissimam ab eo expostulet sanationem. Certum enim est, subesse multum jam corruptæ substantiæ, quæ debet a sano separari & discedere, ad quod tempore omnino opus est. Quod si aliquis non possit Medici opera uti, illi suaferim rapam radula comminuere, & vel butyro vel oleo percoquere, colatum cum mucilagine semin. Cydoniorum agitare & inducere: aut, si rapa non adsit, oleum semin. raparum vel lini simili ratione temperatum imponere. Si jam separatio incipit & succedit, loco mucilaginis vitellus ovi addatur: tandem ad exsiccantia & consolidantia progredi oportet, quo scopo bene facit emplastrum aliquod saturninum, ut de spermate ranarum, camphoratum, Norimbergense &c. Si profundior corruptio sit, non tamen ossa tangat, Unguentum fuscum Fel. Wurtzil, vel Ægyptiacum requiruntur. *Hoffm. morb. peregr. cap. 1. §. 9.* Si pedes, vel extremæ aliæ partes, vi frigoris *emortuæ* sunt, nullum nisi in ferro auxilium. Pedes lignei substituantur, & nasus per Chirurgiam curtorum restituatur. *Barthol. l. c.* Uti vero in pernionibus curandis proceditur, partem nempe fovendo, non per calorem, sed fricando plurima nive, vel immergendo in aquam frigidam aut nivem; ita etiam negotium aggredi

aggredi convenit, si quis ex toto congelatus fuerit: sic ut hominem, si opus, etiam totum in gelidam demergere aquam conducat. hoc enim facto, undique erumpit gelu, ut corpus glacie quasi armatum conspiciatur. Postea propinanda sunt spirituosæ, aromaticæ, calefacientia. Quid, si rigidus ex aquis protrahatur? alia ineunda via erat. Pannis obvolutus ad lenem ignem sensim sensimque refocilletur. Vid. *Eph. N. C. D. I. a. 6. o. 20.* Nullibi autem omittenda sunt sudorifera, ut sanguis congrumatus resolvatur. Nec abs re fuerit secare venam, ut liberior sanguini concilietur motus concessio ampliore spatio. At specialissima, seu morbos a frigore productos, descendere supervacaneum est, quia illi tractandi sunt ex suo genio. Sicuti vero rarissimum est, a frigore produci stupiditatem, ita nec vulgare videtur remedii genus, quod in tribus puellis eodem modo infatuatis, & per 14 dies ad cuncta negotia ineptis expertum suggerit Bartholinus in *H. A. Cent. 6. hist. 88.* pellem scilicet vervecinam calentem recens ab animali detractam, qua capita frigore stupida fovebantur, donec ad se redirent miseræ. *Rivin. l. c.*

*Herpetibus exedentibus*, i. e. ulceribus in latum & profundum serpentibus, *fedi, pudendo, utero, vesicæ, calida grata est*, vel quia nervosæ sunt partes, vel quia assuetæ calido loco degere. Nam corpus quidem tegi solitum, quicquid minime est assuetum & longissime a familiari calore abest, alieno vero frigori est proximum, aversatur, ideoque calida delectatur & ferre potest. *lib. de humid. us. n. 3.* Propterea adjicitur *n. 5. 6.* delectari calida etiam venas, thoracem, ipsumque ventriculum, imum ventrem, partes extremas etiam,  
*¶ XII. D &*



& vesicam, & uterum, & alias partes genitales. *Judicationem* vero facit, h. e. solvit morbos, seu ad eorum curationem confert, dum emollita, laxata, cute, corruptus, acris, viscidus, & hinc ulcerans, humor extrorsum ducitur, & sordes abluuntur: modo observetur, ut prius tota sanguinis & humorum massa viscida, acris, corrupta, debitis internis corrigentibus ac depurantibus ad blandiorem temperiem fuerit redacta, & simul sub usu externo aquæ calidæ, interna, præsertim diaphoretica, eo fine continentur, ut quæ forte intus remanserint impuritates expellantur. Vid. *Hoffm. Med. rat. T. 4. P. 5. p. 221. Frigidum inimicum & interimens est*, ceu notatum ad præced. aph. 17. 18. 20.



**APHOR.**

## ΑΡΗΟΚ. 23.

**Ε**ν τριέοις δὲ δὲ τῇ ψυχρῇ χρέεσθαι, ὁκόθεν αἰμορραγίαι ἢ μέλαι, μὴ ἐκ' αὐτῆς, ἀλλὰ περὶ αὐτῆς ὁκόθεν ἐπὶ ῥεῖ· καὶ ὁκόσαι φλεγμοναί, ἢ ἐπιφλογίσματα ἐς τὸ ἐρυθρὸν, καὶ ὕφαιμον ῥέποντες νεαρῷ αἵματι, ἐπὶ ταῦτα· ἐπεὶ πάρε παλαιὰ μελαί· καὶ ἐρυσίπτεας τὸ μὴ ἐλκόμενον ὠφελεί· ἐπεὶ τότε ἐλκόμενον βλάπτει.

**A**t frigido in his utendum unde sanguis profluit, aut paulo post fluxurus est, non supra ipsas partes, sed circe eas unde profluit: & si quæ inflammationes, aut incendia quædam ad rubrum, & subcruentum ex recenti sanguine vergunt, super ipsa: inveterata namque denigrat. Erysipelas etiam non ulceratum juvat; siquidem exulceratum lædit.

**P**rima hujus aphorismi particula, in lib. de humid. us. n. 11. præcedenti aphorismo subjungitur ita: frigida adversa est & interimens, præterquam in quibus sanguinis profluvium motuimus: & paulo ante ibid. hæc leguntur: Frigida (scilicet prodest) dolore carentibus, valde rubicundis, humorum collationes in venis facere solitis, quallia sunt acerosa circa iboracem & festucis similia (χορδαδιὰ), aliaque dura. Censur. J. R.

c. 9. p. 39. ad hunc textum forte respexit, quando hæc scripsit: Aqua frigida prodest *rubicundis nimis hominibus, si dolore vacant.*

Declaratur hic frigidæ usus externus adversus hæmorrhagias præsentēs aut futuras; nam calidam tunc obesse, monuit præcedens *aph.* 19. Exerit nimirum frigida vim intercipientem, dum contactu suo solida constringendo vasorum diametros minuit, sicque appellenti sanguini resistit, ejusque cursum aliò determinat. Ea propter *non super ipsa parte* frigidam admoveere oportet, sed *circa hæc*, i. e. circa adjacentia loca, ut nempe cohibitus sanguis ante quam ad hæmorrhagiæ locum appulerit, retineatur in via, occurrentesque sibi & patulos subeundo laterales hinc illinc arteriarum ramulos alioversum feratur; v. g. contra hæmorrhagiam narium applicatio fit ad frontem, contra hæmorrhagiam uteri ad lumbos. Michelottus sanguinis ingens ex utero profluvium communibus medicamentis, & ne perfrigida quidem aqua, quicquam proficientibus, promptissime in matrona media æstate suppressit; perurente glacie genibus, & cruribus superimposita, cruralibus, & quod consequitur iliacis, aliisque in uterum desinentibus arteriis, ac venis maximopere coarctatis, repressoque propterea, ac veluti a consuetis viis intercluso sanguine. Vid. *Eph. N C Vol. 3. p. 207.* In inflammationibus incipientibus quibuscunque & erysipelatibus (*novo sanguine*) *super ipsa loca* affecta si admoveatur, agit repercutiendo, dum constringendo vasa auget vim eorum oscillatoriam, qua repellitur stagnare incipiens sanguis. In *veterascentibus* autem inflammationibus nocet, *nigrefaciendo* h. e. sphaceli causas cumulando, quia

quia stasin jam factam auget, constrictis per frigus vasis. Quare uti *erysipelas* fieri incipiens, non *ulceratum* juvat; sic *exulceratum* lædit, ob dicta 5 aph. 20. Patescit sic Veterum ratio tractandi *erysipelas* per repellentia, seu, ut vocat Celsus lib. 5. c. 26. §. 33. reprimentia & refrigerantia. Sed merito in *erysipelate* rejicitur hodie hæc methodus, & ei substituitur regimen temperatum diapnoicum, cum quoad totum corpus, tum maxime quoad partem affectam; tutissimumque esse judicatur nihil applicare, nisi forsan species paregoricas, ex floribus chamomillæ, sambuci, meliloti, radice liquiritiæ, farina fabarum, in forma sacculi, vel pulveris: in ulcerato vero *erysipelate* trans-eundum est ad ea, quæ suppurationem promouent, ita tamen, ut simul corruptioni putredinosæ occurratur. Vid. Hoffm. Med. rat. T. 4. P. 1. p. 311. Conf. notata ad 6 aph. 25.

## APHOR. 24.

Τὰ ψυχρὰ, ὡς χιὼν, κρύσταλλον, τῷ στήθει  
πόλεμια, βήχεων κινητικὰ, αἰμορροϊκὰ,  
κατάρροϊκά.

Frigida, veluti nix, glacies, pectori sunt adversa, tussiles movent, sanguinis eruptiones, & destillationes efficiunt.

Sedes hujus aphorismi est in lib. 6. Epidem. sect. 3. n. 22. Valde frigidum, velut nix & glacies, venas rumpere & tussiles excitare solet. Humorum vero collectiones facit, &c.

ΕΠΙΔΗΜ.

D 3

Ge-

Gelidarum rerum ad pectus applicatio, reprimendo transpirationem insensibilem, humorum stasin facit ad pulmones, unde distentis nimium vasis *tusses*, ruptis *hæmoptyses* fiunt; vel *catarrhi*, ab aucto fluidorum retropulsorum momento. Verum potest etiam aphorismus præfens exponi de noxa a frigido haustu. Etenim, quia frigidum fluido & calefacto sanguini immissum illum densat atque in spissitudinem cogit, facile patet, in visceribus, quæ tantum non penitus vasculosa sunt, ut lien, hepar, pulmo, a sanguine tardius progrediente stagnationes, infarctus & oppilationes fieri, unde graves & diuturnæ passionis incunabula sua trahunt. Nihil sane in praxi frequentius occurrit, quam quod a tempore messis ægrotent homines, dum phthisi, tabe, vel hydropo laborant. Causam & originem horum malorum si paulo exactius inquiramus, unice eam rejicere solent in copiosum frigidæ haustum, quam se tunc temporis siti vehementi pressos affatim accepisse dicunt. Qui morbi plerumque & foveantur & vires accipiunt a polyposi concretionibus, hinc inde in vasis viscerum majoribus post sectionem repertis. *Hoffm. Med. rat. T. 2. p. 315.* Illud nosse oportet, quod ex labore sudanti frigidæ potio perniciosissima est: atque etiam cum sudor remisit, itinere fatigatis inutilis. *Cels. l. 1. c. 3. p. 26. Conf. aph. 18. hujus sectionis.*

APHOR.

## APHOR. 25.

**Τ**ὰ δὲ ἐν ἄρθροισιν οἰδήματα καὶ ἀλγήματα  
 ἀπὸ ἑλκεῶν, καὶ ποδαγρικά, καὶ σπασ-  
 ματα, τριτίων τὰ πλεῖστα τὸ ψυχρὸν πολλὸν κα-  
 ταχεόμενον ῥήϊζει πὶ καὶ ἰσχυαίνει, καὶ ἐδύνει  
 λύει· νάρκη γὰρ μετρίῃ ἐδύνης λυτική.

**A**rticulorum tumores, & dolores abs-  
 que ulcere, & podagricas affectio-  
 nes, & convulsa, hæc magna ex parte  
 frigida large affusa levat & minuit, do-  
 loremque solvit. Moderatus namque  
 torpor dolorem solvendi facultatem ha-  
 bet.

**H**ic aphorismus desumptus est ex lib. de hu-  
 mid. us. n. 10. ubi hæc leguntur: *Quibus-  
 dam autem utraque (aqua & calida & frigida)  
 prodest, velut sunt articulorum tumores, & pedum  
 sine ulcere dolores, & convulsa (σπασματα) plera-  
 que. Hoc constat, frigidam copiosam sudoribus affu-  
 sam, extenuare, & dolorem stupefacere. Modera-  
 tus autem stupor dolorem tollit. Apud Celsum l. 1.  
 c. 9. p. 39. brevibus ita: Aqua frigida infusa ar-  
 ticulis, doloribusque, qui sunt sine ulceribus, prodest,*

Non inde sequitur rheumaticum dolorem  
 esse resolutionem, sed potius irritationem, &  
 convulsionem. Nam in morbis ubi impetus  
 humorum a contractione, necesse est, ex re-  
 sistentibus irritatis solidis consequi inter fibra-

rum spatia infarctum aliquem; quoniam, superata vi elastica, ipsa etiam oscillatio sublata est, contentique humores dolorem, tensionem, motusque difficultatem pariunt. Ubi primum igitur frigida perfunditur, nova, vi frigoris, inducitur contractio, qua solida contenta expellunt fluida, sanguinisque impetus & calor compescitur, eo ex spatiolis istis remoto, &, quod præcipuum est, vis restituitur fibris elastica. Hinc notanter apposuit Hippocrates, ubi *tumores, dolores absque ulcere*: primum enim supponit, quod dictum, nempe infarctum aliquem. Ubi vero ulcus adfuerit, patet absente causa indicante remedium adversus infarctum, hoc quoque non posse habere locum, quoniam humores ante infarcti aperta via sibi pararunt exitum. Hinc etiam Celsus l. 4. c. 24. in dolore articulorum vehementi cum tumore frigidam & refrigerantia externa commendat (observato, ne ea quotidie, neque diu adhibeantur, ne nervi indurescant), ubi vero tumor nullus est, calidis fomentis opus esse declarat. *Brin. de spir. an. p. 350.* Nonnisi de levando summo dolore intelligendum esse etiam aphorismum præsentem, verisimile est, ad hebetandum nempe sensum, sive ad inducendum *torporem* seu stuporem, ut in fine habetur. Verum & illud hic notari debet, quod stupor dolorem non modo sedat, stupore perdurante, sed etiam eodem sedato, imo aliquando dolor ex toto tollitur, argumentum evidens, hunc non quia indolentiam facit, doloris sensum auferre, sed ab eo fluxionem sisti, & humoris activitatem, & acrimoniam compesci. Quare hoc præsidii genus non est aspernandum, quando non sub universaliori

saliori præcepto tantum ab Hippocrate celebratur, sed etiam peculiariter utitur *lib. de affect. n. 31 & 32.* in curatione podagræ, & arthritidis, nam cæteris auxiliis jam propositis, subjunxit tandem: *ad dolentes vero locos frigefactoria appone*, quibus verbis medicamenta actu frigida intelligenda esse, nullus eorum, qui in Hippocratis doctrina sit versatus, negabit, calida enim, aut frigida simpliciter prolata, actu talia intelligit, nisi *ad potentiam* addatur, ex quo adnotandum est, etiamsi & calida, & frigida podagricos dolores sedare possint, frigida tamen ab Hippocrate præferri, nam calida laxando partem rariorem faciunt, & ad fluxiones in posterum recipiendas paratior, frigida e contra eam roborant, & adstringunt, ut fluxioni viæ minus pateant. Quapropter hæc regula circa localia observanda est in podagricis doloribus, aliisque qui a fluxionibus, cum partis recipientis imbecillitate per intervalla invadere solent, frigida actu præferenda esse, in aliis vero calida, & ubi dolores intimiores occupant partes. *Martian. p. 458.* Cavendum tamen esse in frigidæ usu, ne modum excedamus, prudens monuit *Cous lib. de humid. us. n. 11.* *In frigidæ tamen usu potius quam calidæ, quatenus ea utaris attendendum*: imo id ipsum in præsentī aphorismo indicare videtur per *moderatum stuporem*; nam nimium frigus noxium declaratum est 5 *apb. 17. 18.* Quin *Martianus p. 218.* *Plurima, ait, frigida affusa non omnibus adhibenda est, sed juvenibus, ac mediocriter carnosiss, in quibus calidum innatum partis non ita facile extinguitur, dolorisque vehementia viget.*

Cæsar Octavianus Augustus, doloribus articularum ad desperationem reductus, contra-



riam & ancipitem rationem medendi necessario subiit, quia calida fomenta non proderant, frigidis curari coactus, auctore Antonio Musa Medico. *Sueton. in vita Octav. cap. 81.* Et recentiori ævo exempla podagricorum observata sunt, quibus immersio pedum in aquam frigidam, vel unda gelida affusa, vel admota nix, profuit. vid. *Eph. N. C. D. 2. a. 9. p. 342. a. 10. o. 94.* Sed non pauciores prostant observationes, quæ docent male cessisse aquam frigidam articulis admotam. vid. *Laur. Exerc. p. 185 sqo.* Quid? quod *Dio Cassius l. 53. p. 517.* postquam narrasset de Musæ fortunis & honoribus ob jamjam memoratam curam insigniter auctis, demum ita infit: *Verum enim vera ut palam convinceretur hic Musa opus fortunæ fatique sibi arrogasse, evenit paulo post, ut Marcellus agrotans, eademque ratione a Musa eodem curatus, mortem obiret.* Metus certe est, ex frigida nimio usu, ne podagrici pereant; vel ex febre excitata, aut humoris crudi translatione in viscus aliquod nobile, qualis est pulmo, ventriculus, cerebrum. Non igitur fiat experimentum sine cautelis in *5. apb. 21.* expressis. *Lister. Conf. Valisneri T. 2. p. 494.* Quam autem intuta, imo insigniter damnosa, sit methodus qua applicatis refrigerantibus materia podagrica repellitur & introvertitur, legere est in *Boerb. apb. 1273.* Dum Hippocrates adversus articulorum tumores, doloresque, & illorum *πᾶσιμα*, seu illos a vehementi intentione, sine vulnere, laxatos, frigidam large effusam laudat, in animo habuisse videtur illam rationem, quæ embrocha sive embrocatio audit, cujusque usus est ad curandos infirmos articulos, & per *πᾶσιμα* intelligere, non ut vulgo reddunt, spasmos,

spasmus, vel distentiones, sed imbecillitates, distractis majori vi nervis, ligamentisque, relictas. Nam Galenus *de meth. med.* l. 4. c. 1. τὸ σπᾶσμα refert ad unitatis solutionem, seu divortium continui, & l. 3. c. 1. dicit τὸ σπᾶσμα fieri sine vulnere. Etiam Gorraeus *Defin.* p. 424. notat discrimen esse inter τὸν σπᾶσμον & τὸ σπᾶσμα. Vid. *Platner. Opusc.* T. 2. p. 228. Larga affusione frigidæ podagram curari monet Van der Heyden, siquidem certum sit longa pedis in eam immersione, illum detumesce- re, rubedinem & dolorem exuere; verum cum facile, propter sanguinis inquinati refluxum, reviviscat quodammodo dolor, operæ pretium existimat, iterandam illam immersionem, quin- que aut sex diebus continuis. Addit, quosdam podagricos, ut recidivæ vel non, vel parum tantummodo sint obnoxii, eadem immersione singulis diebus, orationis dominicæ recitatio- nis spatio uti; sed quandoquidem acrimonia humoris non suffocetur semper ad votum, ne- que ipse humor evacuetur, auctor est ut illa ulterius suffocetur assumptione introrsum frigi- dæ, & ipse humor pro re nata vel venæ se- ctione, vel dejectorio appropriato evacuetur. v. *Heyden synopsis. discurs.* p. 45 sq. Gorterius dissuadet penitus applicationem frigidæ ad le- niendos dolores, utpote a qua minuatur quidem dolor, ast non sine magno periculo, a repulsu ad nobiliora viscera, vel immobilitatis articuli. Vid. etiam *Trall. de Opio sect.* 2. p. 339.

APHOR.

## APHOR. 26.

Τὸ ὕδωρ τὸ ταχέως θερμαίνόμενον, καὶ ταχέως  
ψυχόμενον, καὶ φέτατον.

Aqua quæ cito calefcit, & cito refrigeratur, levissima.

Desumpta est sententia ex lib. 2. *Epidem. sect.*  
2. n. 29. ubi ita legitur: *Aqua quo citius  
calefcit & frigescit, eo semper levior est.*

Pondus aquæ est ut ejus puritas; ita ut quo levior est, eo censeatur purior. Præsens aphorismus nos docet, quo signo cognoscatur levitas aquæ comparativa, nimirum quod citius incallescens, & citius iterum frigescens, levior sit altera, quæ tardius. Nec sine ratione. Calor enim nil nisi motus ætheris velocissimus est; hinc quo copiosorem in complexu suo alunt spirituofam illam tenuissimam ætheream materiam aquæ, eo citius incallescunt, sive in motum talem abripiuntur. Accelerata autem refrigeratio fervidæ aquæ, pariter levitatis indicium est; eo quod frigidus ær raræ & porosioris texturæ corpora facilius intrare, & calidum in iis motum sistere potest, quam in compactis, quæ minus patent allabenti perfri-  
geratæ auræ, ideoque diutius calorem servant.  
*Hoffm. Opusc. T. 2. p. 15.* Exploratio hæc optime duplicis thermometri ope instituitur. Duo thermometra eidem tabulæ in gradus divisæ illigantur, eaque sic explorantur. Aëri frigido

gido ante exponuntur, ut liquor descendat, tum gradus ipse descensus in tabula notatur; deinde utriusque globi aquæ fervidæ imponuntur, & quousque liquor ascenderit, itidem notatur, & spatium ascensus in partes æquales dispertitur. Jam ut diversæ aquæ examinentur, duobus vasis vitreis æqualis amplitudinis & densitatis eadem aquarum quantitas affunditur, ambo vasi amplo aquæ calidæ pleno imponuntur, atque his duo thermometra simul immerguntur. Ita in aqua fontana v. g. liquor thermometri altius ascendit, quam in aqua puteali, quod illa citius incalescat, hæc tardius, atque adeo illa sit subtilior, hæc crassior. *Hamel. Hist. p. 217.* Aqua levis, inquit *Celsus l. 2. c. 18. p. 100.* pondere apparet; & ex his, quæ pondere pares sunt, eo melior quæque est, quo celerius & calefit & frigescit. Quidam, scribit *Plinius l. 31. c. 3.* statera judicant de salubritate, frustrante diligentia, quando perarum est, ut levior sit aliqua. Certior subtilitas, inter pares meliorem esse, quæ calefiat refrigereturque celerius.



APHOR.

## APHOR. 27.

Οὐδὲν δὲ μὲν ὁρέζεις νύκτωρ, πῶς πάντων  
διψῶσιν, ἢν ἐμπρομηθῶσιν, ἀγασθόν.

Quibus bibendi de nocte appetentia  
est, iis admodum sitientibus, si  
obdormierint, bonum.

Paulo aliter aphorismus hic scribitur in *lib. 6. Epidem. sect. 4. n. 42*: *Letem inter vigilandum sitim somnus sedat, eam vero quæ ex somno orta est, vigilia interdum.*

Docetur somni virtus ad sitim tollendam, seu remedium sitis nocturnæ, somnus. Sitis contingit a defectu humidi in faucibus & œsophago, propter spasmodicam glandularum in faucibus & œsophago constrictionem, qua impeditur humoris in has partes influxus. Per somnum fibræ corporis relaxantur, strictura in glandulis tollitur, & copiosior humectatio fit in faucibus ac œsophago. Vid. *Hoffm. Med. rat. T. I. p. 181*. Sitim autem ex somno ortam, vigilia interdum sedat, quatenus sitim sentiunt qui aperto ore dormiunt & hinc fauces habent exsiccatas, vigilantes vero ore clauso aërem externum, siccitatis & hinc derivatæ sitis causam, arcent.

Hodie observamus homines cruditate humorum laborantes ex defectu virium, quæ materia cruda aliquo modo vergit in corruptelam, noctu sitire, quando nempe id corruptum ad

os delatum sensum sitis infert, quæ tamen sitis non est placanda largiore potu, ut fieri debet si quis sitiatur ex humidi defectu. Si quis concipit præcedentem morbum, in quo vix videntur ægrotare, intellectu facilis est hujus aphorismi sensus. Nam qui noctu valde sitiunt ex hac causa, signum est, tunc maxime prædominare corruptum crudum ex defectu vi-rium natum. Quod si tunc illi multum bibunt noctu, magis onerabunt corpus inutili copia aquæ, & ita morbi causam potius augment opprimendo vires. Si autem superdormierint, bonum est, quia tunc non oneratur corpus multitudine ingesti, & vires recuperantur per somnum. Interim continuata coctione in somno subigitur & emendatur id crudum, disponiturque ad insensibilem perspirationem, quæ dein diffilatur. Hæc ergo observatio utilissima est valetudinariis noctu multum sitiensibus, ut se, quantum ferre possint, abstineant a potatione nocturna. *Gertar.*



**APHOR.**

APHOR. 28.

**Γ**υναικῶν ἀρωγὴν ἢ ἐν ἀρώμασι πυρίη. πολλὰ γὰρ δὲ καὶ ἐς ἄλλα χρησίμη ἂν ᾤ, εἰ μὴ καρδιακὴς ἐνέπιν.

**A**romatum suffitus muliebria educit, sæpius autem & ad alia plerumque utilis esset, nisi capitis gravitates inferret.

**P**er *suffumigia* hic notantur exhalationes odoratum afficientes, ignis aut igniti corporis interventu excitatæ. Quæ ex aromatibus seu odoramentis adornata, in loca uterina derivantur, mensibus ciendis idoneæ habentur suo tempore adhibita; quia stimulando effectum producant aperitivum. Sunt vero foeminae, quibus cerebrum facile turbatur ab aromatibus. Quare ne caput petat fumus caveri debet, primo, ut cingantur foeminae, deinde, ut fumus per cannulam ascendant in cervicem uteri; ita enim suffumigium non facile petit caput. Verum non tantummodo ad provocandum in mulieribus menstruum fluxum conducunt aromatum suffitus, sed etiam ad plura alia eorum usus identidem indicatur, omitti tamen debet, quia capitis gravitatem inducit: quod vult præsens aphorismus. Etenim in genere, quibus caput infirmum est, ut ex quolibet odore expansivo in dolorem incidant, iis minus recte suffimenta adferuntur. Sed porro etiam gravidis

vidis sunt caute admovenda. Senibus, quorum exsucca & arida sunt corpora, ut & macilentis biliosis, & febre quacunq̃ ardente biliosa laborantibus, ac dolore capitis ardente, pulsante, vexatis neutiquam conveniunt. Neque suffiendi sunt catarrho acri irritativo vexati, vel & asthmate sicco laborantes, & dyspnœa ex pectoris mala conformatione, item pleuritici, peripneumonici, & hæmoptysi, vel alia quacunq̃ hæmorrhagia interna laborantes. Vid. *J. Henr. Schulze Diff. de Suffimentis. Halæ 1741. 4°.*

Quoniam ille suffitus vel potest esse siccus vel humidus, cum judicio hoc vel istud est eligendum: nam si pudenda in mulieribus a contentis simul calecant & sicca sint, eligendus est suffitus humidus; & tunc melius erit vaporem mollem & humidum applicare, quam aromaticum. Si vero pudenda sint frigidiora & humida, quod sæpe fit in mensibus suppressis, magis conducit suffitum siccum & aromaticum applicare. *Gorter.*





APHOR. 29.

**Τ**ὰς κύσας φαρμακείναι, ἣν ὀργᾶ, πτερὰ-  
μύωα, καὶ ἄλλαι ἐπὶ τὰ μύων ἥσσαν δὲ  
ταύτας πρὸς δὲ νήπια, καὶ πρὸς βύβρα, ἐνλαβεί-  
σθαι χρή.

**U**terum gerentibus purgantia medica-  
menta exhibenda sunt, si humor  
impetu feratur ad excretionem, quarto  
mense, & ad septimum usque; sed his  
minus. In majoribus autem, & gran-  
dioribus foetibus subtimide se gerere  
oportet.

**E**st hic superfluous aphorismus, nam jam ex-  
stat 4 aph. 1.

APHOR. 30.

**Γ**υναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχθρὴ ὑπὸ πνοῆς τῶν ὀξέων  
νεφελμάτων ληφθῆναι, θανάσιμον.

**M**ulierem utero gerentem morbo  
quopiam acuto corripit, letale.

**S**edes hujus aphorismi videtur esse in l. 1. de  
morb. n. 3. ubi morbi ex necessitate cum  
adsunt mortem adferentes dicuntur, si mulierem  
utero gerentem pulmonis inflammatio, aut febris ar-  
dens,

*dens, aut morbus lateralis aut phrenitis prehendit, aut si erysipelas in utero oriatur.* Celsus l. 2. c. 6. p. 55. ita expressit: *Mulier quoque gravida acuto morbo facile consumitur.*

Pro absolute vero haberi nequit aphorismus, quoniam utero gerentes a morbis acutis quotidie evadere observantur. Vid. *Laur. Exerc.* p. 111 sq. *Forest. Obs. med.* l. 2. obs. 28. *schol.* § l. 15. obs. 22. Apud ipsum etiam Hippocratem l. *Epidem. sect.* 3. *ægot.* 13. extat historia de muliere, quæ, trimestri foetu gravida, febre vehementi correpta, decimo quarto die superveniente vomitu bitioso & sudore, convalluit. Et in 2 aph. 19. docemur morborum acutorum non in totum esse certas prænunciationes, neque salutis, neque mortis. Quare pro aphorismi tutela, ad intelligentiam vocis *letale*, adnotare oportet: aliud esse dicere, morbum aliquem in suo genere letalem esse: aliud, dicere hunc morbum letalem; quia signa letalia supervenire. Nam in hoc secundo casu, quia symptomata supervenientia letalia statum indicant ægrotantis, non ratione morbi essentia tantummodo, sed etiam vehementia, & moris ejusdem, nec non virium ipsiusmet ægrotantis ad morbum ipsum (ab his enim, & aliis quamplurimis signa letalia dependent), ideo cum res eo deveniat, ut signa letalia superveniant, vix fieri potest, tot malis simul concurrentibus, ut æger evadat. At cum morbus ex sua natura letalis est in communi, quotiescunque signa letalia non concomitantur, plurimi servari possunt; cujus rationem assignabat *Hippocr.* l. 2. *Prædict.* n. 19. ubi hæc leguntur: *Vulnera magis letalia sunt, quæ in venas crassas, in collo, ac inguinibus infliguntur, deinde quæ in cerebrum, & in hepar,*  
E 2 postea

postea quæ in intestinum, & vesicam. Sunt autem hæc perniciofa valde, non tamen ita ut nemo ex his evadat, velut putatur. Nam, & loci, qui hæc nomina habent, multum inter se differunt, & iidem modi. Multum etiam differt corporis ipsius hominis structura, aliquando enim neque febricitat, neque inflammatur sauciatus, aliquando etiam citra causam febricitat, & aliqua corporis pars omnino inflammatur. Ex quibus apparet, ex vulneribus, ex sui natura letalissimis, homines evadere, si, ut inferius lib. cit. subjungit, neque febris superveniat, neque sanguinis fluxus ad vulnus fiat, neque inflammatio, neque dolor; e contra vero nulla spes salutis remanet, ubi letalia signa superveniunt, non præfatis letalibus vulneribus modo, sed etiam iis, quæ securissima videbantur. Pari ratione igitur si contingat, utero gerentem morbo acuto laborare, quæ ex sui natura fortis, & robusta, & morbum bene ferat, nec symptomata letalia superveniant, non est a ratione alienum, morbum illum etiam ex sui natura letalem superare. *Martian. p. 459.* Annotavit Hippocrates lib. 1. *Epid. sect. 2. n. 141.* grassantibus populariter febribus ardentibus, prægnantes omnes, in quas morbus forte incidit, abortum fecisse; ibi autem non legimus, ipsas ægrotantes obiisse. Non ergo acutos morbos magis letales statuemus foeminis uterum gerentibus, quam aliis hominibus. Sed id, credo, firmum manet, magis illos periculosos esse gravidis, quia remedia acutis adversantia, dejectoria & magnæ venæ sectiones noxam inferunt foetui. Periculosiores etiam censendæ sunt, ægritudines gravidarum acutæ sub aëre calidiore quam temperatiore, v. g. in Græcia, quam in regionibus magis ad septentrionem

trionem positis : quemadmodum differunt quoque, pro natura locorum, genera medicinæ, & aliud opus est Romæ, aliud in Ægypto, aliud in Gallia; ceu scribit *Celsus* l. i. *præf.* p. 8.

## APHOR. 31.

Γυνὴ ἐν γαστρὶ ἔχουσα φλεβοπηθῆσα ἐκλι-  
τρώσκει, καὶ μᾶλλον, εἰ μᾶλλον εἴη τὸ ἔμ-  
βρυον.

**M**ulieri uterum gerenti vena secta  
obortionem facit, idque potissi-  
mum, si foetus grandior fuerit.

**N**ovimus hodie gravidis e secta in brachio  
vena mitti sanguinem sine noxa, omnibus  
fere mensibus, imo ultimo gestationis & in-  
stante partus tempore; tum ut copia nimia,  
foetum suffocatura, minuat, tum ut partus  
facilitetur, nimiaeque hæmorrhagiæ in partu  
præcaveantur: & compertum est, gravidas,  
quæ olim facile abortiebant, misso sanguine  
ante, quam suspectum tempus advenisset, foe-  
tum ad frugem perduxisse. Taceo quotidianam  
testari experientiam, quod morbis correptæ,  
quæ ad curationem sui exigunt sanguinis missio-  
nem, hanc tolerant citra abortus periculum.  
*Vid. Laur. Exerc. p. 47 seq.* Ut adeo non mo-  
do tutum sit, sed etiam utile ac necessarium,  
in gravidis venæ sectionem instituere. „ Sola,  
„ qua magnum Hippocratem colo, reveren-  
E 3 „ tia

„ tia (verba sunt Boylei in *de util. phil. nat.*  
 „ *p. 105 /q.*) mihi impedimento est, ne ullam  
 „ rigidissimarum Draconis legum, (quæ ob  
 „ nimiam severitatem sanguine aliàs dicuntur  
 „ scriptæ) plures homines enecasse asseram,  
 „ quam hunc aphorismum: eum enim secuti  
 „ Medici plures, multitudinem fœminarum la-  
 „ borantium insignem sub ipsa manu mori con-  
 „ cesserunt, quas phlebotomia provida probabi-  
 „ liter conservare valuisset, cùm (ut ut ejus apho-  
 „ rismi clausula contrarium asserat) experien-  
 „ tia eam non secure tantum, sed & utiliter  
 „ adhiberi posse, etiam ubi embryo satis jam  
 „ fuerit adultus, sæpissime testetur. Sed æsti-  
 „ matio, quam hujus nominis viro Hippocra-  
 „ ti debeo, me in eo acquiescere jubet, quod,  
 „ cùm mihi Medicos plures Dictatoris sui sen-  
 „ tentiam in aphorismo hoc non affecutos for-  
 „ te ultro concedatur, hoc errore multas pe-  
 „ riisse uxores, annotaverim, quæ dispendium  
 „ vitæ commoda sanguinis jactura probabiliter  
 „ præcavere potuissent”. Celsus jam anim-  
 „ advertit, inanem fuisse Antiquorum metum;  
 „ interesse enim, non quid in corpore intus ge-  
 „ ratur, sed quæ vires sint: mulierem autem  
 „ gravidam, valentem, tuto curari sanguinis  
 „ missione. Vid. *Cels. l. 2. c. 10. p. 77.* Fortasse  
 „ intelligi debet præsens aphorismus de illa,  
 „ Hippocratis tempore consueta, larga & co-  
 „ piofa sanguinis missione, quando ad integras  
 „ libras simul & semel ex secta vena profunde-  
 „ batur sanguis, ad animi nempe deliquium *Car-*  
*dan. p. 531. Hecquet. Forest. Obs. Med. l. 2. obs.*  
*28. schol. & l. 15. obs. 22.* Enimvero largio-  
 „ res sanguinis missiones periculo haud vacant,  
 „ quatenus necessarium alimentum fœtui subtra-  
 hunt

hunt cum sanguine matris; nam orificia tunc vasorum, placentam cum utero nectentium, conniventia fiunt, exarescentia, & separantur a placenta, unde abortus: abortum crebriori venæ sectione promoveri, legere est in *Riedlin. Lin.* 1696. p. 174. qui eo facilius continget, quo grandior fuerit foetus, quia hic minus perfert exinanitiones magnas, utpote pluri indigens alimento. *Listerus* putat, pro salvanda Hippocratis auctoritate, textui inseri posse voculam *pedis*, ut dicatur mulier *secta vena pedis* abortire. Sed videtur haud satis bonum hæc intercalatio suffugium, etsi communiter in gravidarum solum brachiis incidi jubeant Medici venas; nam sat multa prostant exempla in pedibus illarum administratæ venæ sectionis, non secuto abortu. Vid. *Law. l. c. p. 100 sq.* Conf. *Epb. N. C. D. 1. a. 9. obs. 48. a. 6. obs. 204.*

## APHOR. 32.

Γυναικὶ αἷμα ἐμείσθῃ, τῶν καταμεισίων ραγίσ-  
των, λύσις γίνεται.

**M**ulieri sanguinem vomitione rejicienti, menstruis erumpentibus, solutio contingit.

**D**esumptus est hic aphorismus ex *lib. 1. de morb. n. 6.* & extat apud *Celsum l. 2. c. 8. p. 69.* Absolute verus est aphorismus, si vomitus fuerit natus ab obstructis menstruis, sanguine regurgitante & in ventriculum effuso:

E 4

nam

nam sæpe, ut ait Celsus l. 4. c. 4. §. 5. p. 202. *fœminæ, quibus sanguis per menstrua non respondet, hunc exspuunt.* Revulsione ergo facta a superioribus ad inferiora, redeunte evacuatione per uterum, cessante causa (obstructione) quæ fecerat vomitum cruentum, cessat effectus. Potissimum vero cruento vomitui observantur obnoxia fœmellæ, quæ alvi sunt adstrictioris, pubertatis tempore, quo menses primo imminet, nec non quando postea suppressi sunt, aut parcius succedunt. Tum enim, quando gravi ira, vel terrore commoventur, & inferiorum partium accedit refrigeratio, vel etiam Medicus pathemata a regurgitante ab utero ad stomachum sanguine orta per emesin excitatam perperam tollere contendit, perquam facile sanguinis eructatio procuratur. *Hoffm. Med. rat. T. 4. P. 2. p. 68.* Apparet ex hoc aphorismo, quam parum expediat, & res non periculi expers sit, circa consuetum mensium tempus vomitorium, præsertim validius, exhibere; visus exinde obvenisse vomitus cruentus letalis. Apparet quoque porro, in mensium suppressione cautissime, vel prorsus non, præscribenda esse emetica, præsertim valentiora, quod facile ad hanc nobilissimam partem sanguinis impetum trahunt. *Hoffm. de transmut. morb. §. 7.* In hujus generis vomitu convenire emmenagoga remedia ea, quæ sanguinis derivationem ad uterina faciunt loca, docent historiæ annotatæ in *Eph. N. C. D. 1. a. 1. o. 95. D. 2. a. 2. o. 101.*

APHOR.

## APHOR. 33.

Γυναικὶ τῶν καταμηνίων ἐκλαπίντων, αἷμα  
ἐκ τῶν ῥινῶν ῥυλῶαι, ἀγαθόν.

**M**ulieri, menstruis deficientibus, sanguis ex naribus profluens, bonum.

**B**onum hic dicitur hæmorrhagia, quia est vicaria evacuatio alterius, quæ fieri deberet per uterum, præservans a malis, quæ ex suppressione mensium impendent: id quod *Celsus* l. 2. c. 8. p. 69. expressit in hisce: *Quæ menstruis non purgatur, si sanguinem ex naribus fudit, omni periculo vacat.* Non adeo insolens est, ut, restitante in fœminis præsertim junioribus, gravidis quoque, mensium fluxu, facta palindrome, narium stillicidium excipiat sanguinolentum. Cujus rei nulla alia subest causa, quam quod spasmis, quibus omnes hæmorrhagiæ stipari solent, æquilibrium motus sanguinis progressivi tollatur, isque ad loca excretioni dicata cum impetu agatur, ibi vero exitu præclusus, ruat ubi congruum invenit locum ibidemque egrediendi sibi paret viam. *Hoffm. Med. rat. T. 4. P. 2. p. 12.*

Concipiendum est, Hippocratem in hoc aphorismo intellexisse subsistentes menses ex ætate, qua fluere deberent. Nam quibus menses deficiunt ex causa morbosa, modo simul adsit sanguinis abundantia, his levamen quidem præfens adfert sanguis e naribus fluens, quia tollit illam abundantiam; sed eo obstinatorem

E 5

sup-



suppressionem faciet, ut, quæ foeminæ sæpe patiuntur hæmorrhagiam narium, vel quæ curant sibi pertundi venam ut minuant symptomata ex sanguinis suppressione nata, in posterum vix unquam ad ordinatum menstruorum fluxum redeant: quare hæ ad evitandam præsentem molestiam se in majus malum præcipitant. Si subsistant mulieri menses ex graviditate vel lactatione, hæmorrhagia narium semper damnum adfert, quia hoc casu non eget alia succenturiata sanguinis evacuatione. Increcente denique ætate deficientibus mensibus, quando nullis auxiliis sunt promovendi, quum post istud tempus ætatis si menses pergunt fluere, non amplius vocatur menstruatio, sed hæmorrhagia uteri, inter morbos recensenda, tunc eadem evacuatio, quæ ante istud tempus salubris erat, post hanc ætatem, habetur inter morbos. *Gorter.*

## APHOR. 34.

Γυναῖκί ἐν γαστρί ἐχούσῃ ἢ ἡ κοιλίῃ πολλά ῥυή, κίνδυνος ἐκτρέψαι.

**M**ulieri utero gerenti si alvus multum profluat, abortionis periculum est.

**D**esumpta esse videtur hæc sententia ex lib. 1. de morb. mul. n. 37. In Coac. sect. 3. n. 416. scribitur in h. m. Uterum gerentibus alvi subvultus, malum. Et apud Celsum l. 2. c. 7. p. 61: Mulieri

*Mulieri gravidæ sine modo fusa alvus elidere partum potest.*

Plurimæ utero gerentes quotidianis vomitibus adeo sollicitantur, ut cibum assumptum raro contineant, unde corpus sufficienti alimento privari necesse est, & nihilominus abortum inde sequutum esse, nondum observatum est. At vero diarrhoea abortum sæpe facit, etiamsi corpus nutrimento privetur minus, quando cibus in his longiori tempore retinetur, quam in illis; quod quidem evidens argumentum est, diarrhoeam non ea ratione abortum facere, quia alimentum foetui subtrahat, sed potius quia, dum humores ad inferiora moventur, foetus & ipse deorsum trahitur, unde ligamenti eum continentibus violentia infertur, ob quam rumpuntur, & sic abortus sequitur. Eadem ratione pharmaca deorsum purgantia abortum faciunt, non quæ per vomitum purgant. *Martian. p. 459.* Ab assumpta uncia mannae in jure carniū soluta, abortus observatus legitur in *Eph. N. C. D. 1. a. 6. o. 241.* Nimia dejectiones alvinæ spasmum intestinorum communiter junctum habent: propter viciniam ergo uteri, hic in consensum tractus elidet foetum. Quare evitanda sunt gravidis fortiora purgantia, scammoniata, colocynthiaca, jalapina, aloëtica, quæ spasmum intestinorum & totius nervosi systematis non raro inducunt. *Hoffm. Med. rat. T. 4. P. 3. p. 631.* Præterea vero, nullæ nimia evacuationes gravidis bonæ sunt; quia debilitant vires matris, & subtrahunt foetui alimenta, unde ille eliditur. Nam si orificia vasorum uterinorum ob deficientem sanguinis adfluxum exarescunt; foetus nutrimento destitutus perit & corrumpitur,

tur, qui hoc in casu sæpenumero absque spasmodis & doloribus ejicitur. Hinc dispositæ in morbis gravioribus, febribus acutis malignis, nimis diarrhœis, maxime dysentericis, & quidem frequenter circa declinationem abortiunt. *Hoffm. l. c. p. 629.* Curationem mali cognoscere aues? lege *Forest. Obs. Med. l. 28. obs. 67.* Cæterum, Hippocraticam regulam non perpetuæ adeo esse veritatis, ut non reperiantur gravidæ, quæ diarrhœam vehementem, periodicam, vel alias diuturnam, imo & dysenteriam, citra noxam experiantur, videre est in *Eph. N. C. D. 1. a. 3. o. 17. D. 2. a. 5. o. 149.* Quid? quod apud Hippocratem *lib. 2. Prædict. n. 30.* ubi de dysenteria tractatur, legimus, prægnantes plerumque ad partum superesse, & ex partu, foetumque conservare, etiamsi per multos menses sanguis & strigmenta per alvum secedant, nisi si dolore affligantur, aut aliquod ex malis signis accesserit.

## APHOR. 35.

Γυναῖκί ὑπὸ ὑστερικῶν ἐνοχλαμένη, ἢ δυστοκίᾳ, πλεονὸς ἐπιγενόμενα, ἀγαθόν.

Mulieri uteri strangulatu vexatæ, aut difficultate partus laboranti, sternutatio superveniens, bonum.

Cellus *l. 2. c. 8. p. 69.* hanc sententiam ita expressit: *Quæ locis laborat, aut difficulter partum edit, sternutamento levatur.*

Ster-

Sternutationem pellendæ hystericæ passioni, facilitandoque partui conducere hic docemur: imo sternutatoria ad secundinas excludendas facere tradit 5 aph. 49. Sternutationes partium nervearum concussus sunt, & spasmodorum modi, tanti, observante Hippocrate *Prognost.* n. 13. *Coac. sect. 3.* n. 174 sq. ad medicinam momenti, ut licet in omnibus circa pulmonem morbis, & antecessisse, & succedere sternutationes malum sit, in aliis tamen morbis letalissimis profint. Passio hystERICA & difficilis partus spasmodici sunt affectus, quos levat discutiendo nervorum vehemens oscillatio, quæ sit inter sternutandum: ita ut hîc spasmus spasmodum solvat. Conf. *Forest. Obs. Med. l. 28. obs. 27.* Præterea ad partum difficilem promovendum confert sternutatio eo, quod diaphragmatis & musculorum abdominis excitet vim. Hinc ex consilio Hippocratis *lib. 1. de morb. mul. n. 93.* si fœtus exitu affectato non facile discedant, cum sint secundum naturam, iis sic habentibus sternutatorium aliquod adhiberi debet: naribus autem apprehensis, & ore compresso sternutandum, quo quam maxime fieri poterit, efficax sternutatio reddatur. Hisce addi debet: modo non a partium inflammatione, sed a spastica constrictione veniat partus difficultas: prior enim ratio sternutationem vetabit, suadebit posterior; unde concludas licitam in tantum esse sternutationem, in quantum spasmî resistantiam spastica partium explosione domari convenit. *Hecquet.* Conf. 6 aph. 13. Imo, ad vires deficientes in parturiente excitandas sternutatoriorum usus locum habet, juxta *Boerb. aph. 1312.* Vid. etiam *Eph. N. C. D. 2. a. 5. app. p. 45.* Anne ex præsentè aphorismo intelligimus, cur vicissim sternutatio

damnosa

damnosa sit statim a coitu, foeminis concipere cupientibus? Prius valida concussione genitale semen excutit, quam se penetralibus matricis insinuet, uti ait *Forestus Obs. Med. l. 10. obs. 127.* Hac de causa apud *Plin. l. 7. c. 6.* sternuisse a coitu, abortivum.

*Uteri strangulatus* seu passio hysterica vulgo dicta, species est convulsionis, quæ tandem frequentissime suffocationem inducit; quando in utroque sexu in ventre inferiore sentitur involuntaria commotio convulsiva, quæ sensim sursum vergit, in multis ac si globus ascenderet, & dein ad fauces veniens ita constringit fauces, ut impediatur deglutitio & suffocetur respiratio; in graviore malo fauces in quendam tumorem elevantur, & inde compressis venis jugularibus tota sæpe facies livet. In leviori malo mens manet constans, & membra non moventur convulsive. Verum in graviore malo, ipsa actio mentis extinguitur, atque vel cadunt simul in animi deliquium, vel convelluntur membra uti in epilepsia; interdum vero mens manet constans, dum tamen membra variis modis convulsione agitantur. Accedentia illa igitur symptomata duntaxat magnitudinem passionis hystericæ denunciant. Ex his phænomenis nullo modo patet uterum esse affectum, & hoc etiam cadaverum inspectio confirmat, quoniam in hystericis passionibus suffocatis & mortuis uterus fuit inventus insons, & æque sanus quam aliis sanissimis foeminis: sed phænomena docent convulsionem incipere in mesenterio & intestinis, propagari per ventriculum & oesophagum ad pharyngem, cujus musculi una cum musculis laryngis tetanica constrictione contrahuntur. Quod si illa convulsio

valffio tandem communicatur meningibus, ex-  
 tinguitur mentis actio; ita comprimitur cere-  
 bellum ut non emittat spiritus ad actionem cor-  
 dis & respirationis; vel si motus ille magis est  
 inordinatus, membra externa convulsione epi-  
 leptica exagitat. In tali nunc suffocatione hy-  
 sterica nunquam in tota mea praxi potui obser-  
 vare sternutationem profuisse, neque video quid  
 boni adferret. Propterea malo credere in hoc  
 loco intelligendas esse secundinas retentas. Si  
 igitur contingat, ut secundinæ maneat in  
 utero post partum, adstruit auctor bonum esse  
 si superveniat sternutatio. Hæ secundinæ vel  
 sunt partes firmæ, uti placenta, membranæ &  
 funiculus umbilicalis, quæ partes proprie di-  
 cuntur secundinæ; vel sunt humores, nempe  
 sanguis qui fluit ex lateribus uteri & ex abrupta  
 placenta, qui sanguis lochiorum nomine venit.  
 Forſan Hippocrates ad partes non solum fir-  
 mas, sed & ad sanguinem retentum significan-  
 dum, dixit *ὀρεσπικόν*; in quo casu salutare est si  
 superveniat sternutatio: nam si cuncta hæc post  
 partum retinentur, signum est orificium uteri  
 esse clausum, quod ut aperiatur, sternutatio  
 violenter contrahens ventris musculos multum  
 valere potest, quoniam talis puerpera ex vo-  
 luntate non valet tantam ventris constrictionem  
 facere, ut sit in sternutamento, quæ aperiret  
 orificium uteri clausum. Qui existimaret in  
 omni partu difficiliore conducere sternutamen-  
 tum, & inde vellet adhibere sternutatoria ad  
 facilitandum partum, multa damna inferret suæ  
 præpostera medela; nam si ob situm alienum  
 fœtus difficile parit mater, a concussione ster-  
 nutationis majus induceretur impedimentum,  
 truderetur enim fœtus in tantas angustias, ex  
 quibus

quibus postea nulla manuum ope extricari posset. Sed si foetus legitimo modo fuerit locatus, & propterea foemina non parit, quod conamina parturiendi non sufficiant ad dilatandum uteri orificium & elidendum foetum, sternutatio superveniens, majori conamine contrahens abdominis musculos, valuit in quibusdam parturientibus extrudere foetum. Tali etiam in casu conducirer sternutatorium admove-  
*Gorter.* Conducetne adhibere sternutatorium ad expellendas secundas, ore uteri existente aperto! Vid. *infra aph. 49.*

*APHOR. 36.*

Γυναῖκί τὰ κατμήνια ἄχρσα, καὶ μὴ κατὰ τὰ αὐτὰ αἰεὶ γιγνόμενα, καθάρισθαι δεῖσαι σημαίνει.

**M**ulieri menses decolores, neque semper eadem periodo procedentes, purgationem indicant esse necessariam.

**V**itiosus est menstruorum color minus ruber, albus, pallidus, saniosus, subalbidus. Hæc sententia est tantum de pallidis, mucosis, pituitosis, inordinatis ac irregularibus, h. e. non iusta periodo fluentibus, sed vel tardius, vel celerius. Color sanguinis ruber pendet a vigente libera circulatione ejusdem: a quo defiscit, si vasis existentibus nimium laxis, debilibus, chylus non satis subigi potest, generatur pallidus, mucosus, pituitosus. Verum  
etiam

etiam ortæ passim humorum stases atque spasmodicæ contractiones libero sanguinis circuitui obstant, & dum comprimuntur vel obstruuntur vasa, in ramos laterales patulos delatus latex serofus, loco rubri sanguinis, sistit menses decolores. Priori in casu cathartica inprimis conferunt, quia stimulo suo invitant laxata vasa ad contractionem, ut tono restituto humores vegetæ liberæque reddant circulationi. In altero casu convenire possunt quoque vincendo spasticas diatheses, atque sic aperiendo obstructa loca: modo non inflammatio aliqua præsens contra indicet. „ Si uteri pituita redundantes „ fuerint, flatus intus oritur, & menses albi „ pituitosi prodeunt . . . Ubi vero superior „ ventriculus tibi perpurgatus videbitur, me- „ dicamentum deorsum purgans proprinato. „ *Hippocr. de nat. mul. n. 10.* ” Enimvero cacochymia communis causa est mensium quoad tempus tardantium vel anticipantium, & quoad colorem, consistentiam, *ἐνφασίαν*, & conjuncta symptomata alia a statu naturali abeuntium: cacochymia autem commune est indicans purgantium, adeoque etiam ad uterum redundans maxime pituitosa & acida. *Wedel.* Purgans requiritur ad eliminandam cacochymiam. Non tamen præciperem aliquoties ducere alvum, majorem enim induceret debilitatem; sed postquam corpus a cacochymia est liberatum, satius erit corporis vires firmare roborantibus, ne nova generetur cacochymia, quæ mensium ordinem turbat, & pallidiorem producit sanguinem. *Gorter.*



## APHOR. 37.

Γυναὶκὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσθῃ, ἣν οἱ μαστοὶ ἐξαίφνης  
ἰσχυροὶ γίνονται, ἐκλήτρῳσκει.

**M**ulieri utero gerenti, si mammæ de-  
reperente gracilescant, abortionis  
periculum est.

**D**esumptus videtur hic aphorismus ex l. 1. de  
*morb. mul. n. 44.* ubi hæc leguntur: *Qui-  
bus uterum gerentibus ad septimum aut octavum men-  
sem, mammarum ventrisque plenitudo derepente sub-  
sidet, mammaeque extenuantur, & lac non apparet,  
puerum aut periisse, aut vivere & debilem esse asse-  
rendum.* Apud Celsum l. 2. c. 8. p. 76: *Mulierē  
gravidæ si subito mammæ emacuerunt, abortus peri-  
culum est.*

Valis mammariis cum uterinis mutua est con-  
sensus, ita ut, cum foetus moveri incipit, tur-  
gescant mammæ: si itaque hæ gracilescant,  
signum est laborare foetum inopia alimenti.  
*Holler.* Inedia autem nonnunquam foetus peri-  
mitur, vel ad excretionem excitatur. *Forest.*  
*Obs. Med. l. 28. obs. 66. schol. p. 460.* Si mam-  
mæ, quæ alioquin a motu foetus ad extremum  
usque gestationis tempus, a lactis copia, soli-  
dæ esse debent, non sensim & pedetentim,  
sed subito extenuentur, indicium maximam  
oportere subesse causam & vehementem mu-  
tationem in sanguinis & spirituum motu præ-  
cessisse, dum vel ipse in aliis partibus stagnat,  
in-

inflammationem parit, vel ob defectum spirituum & virium, chylus non generatur, vel ad mammas vehitur. Vid. *Fr. Hoffmanni Diff. de morbis foetuum in utero. Halæ 1702. 4º. §. 25.* Si mammae in gravidis subito gracilescent, hujus detumescentiæ causa in ipsis mammis non est quærenda, sed in eo organo debilitato, quod antea valens per consensum turgere faciebat mammas. Ergo signum est, uteri actionem esse debilitatam. Quæ talis si fiat, vel quod foetus in utero moriatur, vel quod placenta ab utero fuerit debilitata, necesse erit, ut post paucos dies ejiciatur foetus; qualem abortum nullis auxiliis prævenire possumus. *Gortier. De consensu mammarum cum utero, vid. Not. ad 5 aph. 39.*

## APHOR. 38.

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσθῃ, ἣν ὁ ἑπὶ τοῦ μαζοῦ ἰσχνὸς γίνηται διδυμα ἐχέσθῃ, θάπερον ἐκπιτρώσκει· καὶ ἣν μὲν ὁ δεξιὸς ἰσχνὸς γίνηται, τὸ ἄρσεν, ἣν δὲ ὁ ἀριστερὸς, τὸ θῆλυ.

**M**ulieri utero gemellos gerenti, si altera mamma gracilis evadat, alterutrum abortu edit: & si quidem dextra mamma gracilescat, marem, si vero sinistra, foeminam.

**N**ititur sententia hæc ratione futili, quod mas in dextra, foemina vero in sinistra uteri parte gignatur: quod effatum est 5 aph. 48.

## APHOR. 39.

**Η** γυνὴ μὴ κύεσα, μηδὲ πεπνυῖα, γάλα ἔχει, πύτη τὰ καταμύδια ἐκλέλοιπε.

**S**i mulier, quæ neque gravida est, neque peperit, lac habeat, ei menstrua defecerunt.

**E**xstat iisdem pene verbis sententia hæc apud *Cels. l. 2. c. 8. p. 76.*

Lac in virginum mammis a menstruorum est defectu: quando enim hæc deficiunt aut supprimuntur a spastica diatesi, arteriarum uteri diametros stringendo, compressa vasa lymphatica lympham suam amandant ad vasa mammaria. *Hecquet.* Mammarum cum utero commercium, humorum alterne ad hæc partes delatorum beneficio, communiter stabiliri solet in vasorum epigastricorum & hypogastricorum cum mammariis connexione seu communicatione (vid. *Boerb. F. M. §. 666. 687.*) Ast sine fundamento. Qua enim ratione ad mammas perveniet ab epigastricis arteriis advectus sanguis? Si per arterias mammarias deferendus, quot motus humorum perturbationes, quot mala, obstructions, inflammationes exinde enascentur? sibi enim oppositæ sunt humoris in utraque arteria motus directiones, quare, si æqualis fuerit utriusque fluminis vis, omnis sistetur motus progressivus, si vero unius vis alterius robur superaverit, contra omnes naturæ

naturæ leges regurgitabit in debilius humor; sicque sanguis potius ad inferiora deveheretur, cum minor mammariæ a corde distantia quam epigastricæ, majorem in illa vim impulsus inuat. Neque propius ad veritatem accedunt, qui idem negotium venis eadem ratione conjunctis absolvi credunt, quos pariter confutat contraria humorum motûs directio. Inprimis vero a sua sententia avocare auctores debuisset accuratior originis epigastricæ arteriæ consideratio. Ea enim ab iliaca externa duntaxat dimittitur, cum uterina vasa ab interna iliaca, quæ etiam hypogastrica audit, deriventur, sicque longius a se invicem distent, quam ut epigastricæ flumen inde adeo augeri queat, ut, majori impetu ad umbilicum circiter delatum, oppositæ arteriæ fluminis resistentiâ superatâ ad mammillas adscendat. Alia igitur redundantie sanguinis ad mammas tempore graviditatis & lactationis causa statuenda erit. Scilicet dum uterus a foetu majora in dies incrementa capiente distenditur, omnemque fere pelvis cavitatem occupat, imo insigniter quoque superiora versus expanditur, vasa majora iliaca, nec non ipsam aortæ truncum comprimit, sicque eorum dilatationi ex parte resistit, ut sanguis minus commode ad artus inferiores possit derivari, & majori quantitate ad superiores redundet. Quo ipso cor ad frequentiore[m] fortio[re]mque systolen exstimulatum, tanto majori impetu in vasa superiora protrudet cruorem, eorundemque latera insigniter distendet; cumque mammæ præ cæteris partibus textura molliori laxiorique gaudeant, vasaque minime compressa intra pinguedinem facile cedentem delitescant, in illis potissimum effectus redun-

dantis fortiusque propulsi sanguinis manifestus erit, ut nimirum vasa distenta tum copiosiore tum crassiore sanguinem recipere cogantur, eumque in continua secretoria vasa, tenuem antea lympham vehentia, provolvant, unde ultimis gestationis mensibus liquorem gelatinosum, & proxime ad lactis indolem accedentem, in uberibus colligi videmus. Qui fons nec post partum exarescit, quandoquidem uterus antea mire expansus, multoque cruore turgidus, tunc sensim iterum contractus, humorum influxui fortius resistit; quo ipso, & cessante simul amari liquoris admodum nutritii secretionem, sanguis ab utero exclusus in omnes corporis partes, maxime tamen ob allegatas causas in mammillas vim exercet, sicque in dies magis promovet lactis secretionem: ad quam diutissime continuandam plurimum confert grata tenelli succio, dum, humore jam collecto evacuato, a tergo venienti novum conceditur spatium, sicque vasa semper necessariam, ad pinguem ejusmodi humorem admittendum, retinent laxitatem, donec illa puero ablactato tandem iterum evanescat, vasaque denuo contracta tenui duntaxat lymphæ transitum concedant. In suppressione mensium, quæ a peculiari vitio, in utero hærente, oritur, nimia sanguinis moles, distendendis & ad secretionem disponendis mammis interdum sufficit; qui tamen effectus, in reliquis speciebus, ubi ob cacochymiam & lentescentem humorum dispositionem fluxus supprimitur, minime expectandus est. Vid. J. F. Crellii *Diff. de mammarum fabrica & lactis secretionem*. Lips. 1734. 4°. Sed ad ejusmodi conversionem mensium retentorum in innuptis & innocentibus subjectis, ad mammas

mas & connexam lactis secretionem & collectionem præ aliis dispositæ videntur animo & corpore robustæ, activæ & expeditæ, plethoricæ: quanquam tamen casus rari. Vid. *Mich. Alberti Diss. de lactis præsentia in innuptis. Hale 1741. 4º.*

## APHOR. 40.

Γυναῖξιν ὀκόσῃσιν ἐς τὰς πτῆρας αἷμα συσπύεται, μανίῳ σημαίνει.

**M**ulieribus quibus in mammas sanguis in tumorem convertitur, furorem significat.

**L**egitur hic aphorismus in *lib. 2. Epidem. sect. 6. n. 62.* & in *Cels. l. 2. c. 7. p. 63 sq.*

Complures muliebrium morborum consistunt in aliorum detorto, conversoque sanguinis circuitu, aliò nempe quam ad uterum declinante mensium sanguine, a mutato vasorum diametro. Sanguini autem illi ad pectus, cui insident mammæ, verti familiare est. *Conclusi uteri*, inquit Hippocrates l. 2. de morb. mul. n. 23. *menes ad mammas remittunt, & ad pectus ascendere cogunt*: hinc factæ illic stasi solitum est sævam succedere suffocationem, quam *hystericam* dicunt, cujus urgens adeo interdum paroxysmus est, ut totum cum mammis extumescens & elevatum pectus dissilire ferme videatur. Porro hysterico paroxysmo delirium, *furorem* hîc dictum supervenire frequens. *Esacquet.* Non

tamen perpetuæ prognosticon hoc Hippocraticum veritatis esse, sed insignem pati exceptionem, demonstrant observationes medicæ. Vid. *Eph. N. C. Vol. 3. app. p. 169 sq.* Quo in loco imprimis notanda est historia de fœmina, quæ nunquam menstruata fuit, citra ullum tamen incommodum; nupta vero deinde, omni novilunio ingruente mammas habuit in horrendam magnitudinem elevatas, cum rubore, ardore conjunctam, ut, propter teneriorem cutis texturam, videretur ab utraque parte maximam vesicam bubulam sanguine impletam, & reliquo corpori adnatam, circumgestare; quo in statu per ostidium semper mansit. Atque ita hæc scena per biennium duravit, donec auxilio medicinæ mensibus sua panderetur via.

Inter mammas & cerebrum vix ullus consensus. Sæpe dirissimos mammarum dolores, tumores, inflammationes & cancos tractavi, sed nunquam inde secuta fuit mania: neque metastasis morborum ad mammas maniam intulit. Hoc autem contingere potest in morbis mammarum, ut in aliarum partium morbis, quod acris materia in mammis nata, a sanguine recepta, ad cerebrum delata, maniam inferat; vel quod corpora valde mobilia nimio dolore mammarum commota in maniam præcipitentur. Sed ex rarissimis his exemplis & nihil speciale a reliquis partibus habentibus, non possumus formare præsagium. Quare credo Auctorem nostrum, dum observaverit ea signa circa mammas, & dein maniam, forsan judicasse hæc signa præbuisse causam manix sequentis, dum quivis alius morbus interim maniam induxisset. Hoc etiam fallere potest

exer-

exercitatissimos in arte medica, & fateor me non semel tali modo delusum fuisse, si æger binis morbis laborabat, quorum alter latens quædam symptomata inducat, quæ ex morbo manifesto vix oriri potuere. *Gorter.*

## APHOR. 41.

Γυναῖκα ἢν θέλῃς εἶδεναι εἰ κύει, ἐπὶ τῷ κα-  
θεύδειν μέλι; (ἀδείπνω ἐξῆς) μελίκρα-  
τον δίδοναι πεινῶν κλεῖ μὴν τροφὸν ἔχη περὶ τῷ  
μαστέρεα, κύει ἢν δὲ μὴ, ἔ κύει.

**S**i nosse velis num mulier conceperit,  
ei dormituræ (incoenatæ) aquam  
mulsam propinato; & si ventris tormina  
eam corripuerint, concepit; si vero mi-  
nus, non concepit.

**E**st in *Hipp. lib. de steril. n. 6.* textus: *Mel  
& anisum tenuissime tritum, deinde aqua dilu-  
tum exhibeto, & dormire finito, & si ei tormina  
circa umbilicum suboriantur, prægnans est, alioqui,  
minime.*

Cum in gravidatio causa sit plethoræ, in pri-  
mis scilicet mensibus, propter majorem san-  
guinis coacervationem, quam ad fœtum tunc  
tenellum nutriendum requiritur, aliàs per flu-  
xus evacuandi menses, hinc eo majori co-  
pia fertur ad intestina: cum insuper fibrarum  
tonus per aquam laxetur mulsam, hinc disten-



tio & flatus. Addit *incœnatæ*: sic enim aër inter alimentorum poros divisus, & latens, elicitur majori copia. *Ström Theor. mot. recipr. p. 79.* Sed hæc gratis dicta videntur cogitantanti, quod experimentum fallax sit, siquidem aqua mulsa dormituris pro potu data, aliquando æque in viris ac mulieribus, in gravidis & non gravidis, in assuetis & non assuetis tormina excitat: aliquando in gravidis tormina nulla facit. Præterea quam periculosum sit tormina in prægnantibus excitare, vel ipsæ obstetrices noverunt, cum ex his facili negotio subsequi possit abortus. Adde, quod mulsa per se etiam urinas abunde provocat, ut docet Hippocrates *lib. de victu in acut. n. 26*; quæ vero urinam cient, etiam menstrua provocare possunt, & quæ menstrua provocant, abortum causare solent. Signum ergo in aphorismo positum solitarium ad cognoscendam conceptionem factam, non solum est æquivocum, uti multa alia, in primis præsertim imprægnationis mensibus, sed & penitus falsum merito æstimari debet. Ipse Hippocrates *de nat. pueri n. 38.* aperte fatetur difficillimum esse deprehendere, num mulier utero gestet. Et si aqua mulsa exhibita infallibile rei præberet testimonium, cur hæsitavit, utrum prægnantes essent Tecomæi filia (4 *Epidem. n. 14.*) & Temenei soror (*ibid. n. 18.*)? Cur non exhibuit aquam mulsam? Vid. *Law. Exerc. p. 1 sequ.*

APHOR.

## ΑΡΗΟΡ. 42.

Γυνὴ ἔγκυος, εἰ μὲν ἄρρεν κύει, εὖχρως ἔσιν·  
ἢν δὲ θήλυ, δύσχρως.

**M**ulier prægnans, si marem gestat,  
bene colorata est; si foeminam,  
male colorata.

**I**n lib. de Steril. n. 7. legitur: Quæ utero geren-  
tes maculam in facie veluti ex solis adustione  
(ἰφῆλιν vocant) habent, eæ fœmellam gestant: quæ  
vero bene coloratæ permanent, marem plerumque.

Explicationem credulæ Antiquitati relinqui-  
mus; & Cardano p. 545 sq. qui mirifice sollicitum  
se monstrat. Contra hunc aphorismum dispu-  
tatur in Laur. Exerc. p. 271 sequ.

## ΑΡΗΟΡ. 43.

Ἡ γυναικὶ κυέσῃ ἐρυσίπιδας ἐν τῇ ὑτέρῃ  
γέννηται, θανατῶδες.

**M**ulieri prægnanti erysipelas in utero,  
letale.

**I**nter morbos ex necessitate, cum adsunt,  
mortem afferentes numeratur erysipelas in  
utero, lib. 1. de morb. n. 3. At in lib. de nat.  
mul. n. 12. & l. 2. de morb. mul. §. 58. ubi ery-  
sipelatis in uteris symptomata recensentur, &  
curatio

curatio traditur, morbus dicitur ex quo paucae evadunt, letalis autem si pręgnantes detineat.

Cum uteri textura sit admodum vasculosa, glandulosa & nervosa, collum vero & orificium internum exquisitissimi sensus, patet, quod proclivis valde esse debeat ad suscipiendas acutas & periculosas inflammationes, oriundos inde abscessus, & mali moris exulcerationes; ita, ut sæpenumero ulcus uteri in gangręnam & sphacelum abeat ac interficiat. Erysipelas autem si oborietur in utero, periculo non vacat; aut enim rubor livorem & nigredinem induit ac brevi in sphacelum transit funestum, aut inflammatio discuti renuens suppuratur ac ulcera mali moris, fistulas & gangręnam inducit. Vid. *Hoffm. Med. rat. T. 1. p. 490. & 308.* Si jam mulier sit gravida, sanguis menstruus excerni impeditus, ad uterum accumulatus malum reddere videtur perniciosum, aucta causa materiali erysipelatis. Conf. inferius notata ad 6 aph. 25.

Facile concipere possum erysipelas uteri valde periculosum esse, difficile autem erit detegere, num uterus erysipelate tentetur, tum ex convenientia cum inflammatione, tum ex affectione partium circumjacentium, & quoniam tumor, dolor, & color sensibus externis non patent. Inde majoris momenti est invenire, num uterus erysipelate afficiatur, quam ex erysipelate prognosin formare. Si fœmina in infimo ventre sentiat vehementem dolorem, calorem æstuantem, quę symptomata magis simul urgent vaginam & pudenda quam intestinum rectum ac vesicam, quamvis semper hæ quoque partes consentiant, constabit ex his vel erysipelas vel inflammationem tentare

tare uterum. Sed si tunc simul per reliquum corpus habetur febris remittens magis quam continua, cum calore mordaci magis quam urente; si urina evacuata sit flammea, acris, pellucida, ad flavedinem vergens, ut plurimum sine sedimento & sine signis coctionis; pulsus celer magis quam durus; sanguis emissus si fluidus fere maneat & rubellus, nullam cuticulam formans; judicabimus uterum erysipelate tentari. Sed si febris continua ardens, urina rubra sæpe cum incipientibus signis coctionis, pulsus durus & frequens simul adsint, judicandum est uterum inflammatione affectum esse, quod Galenus ponit quæstione dignum. Uterus in gravidis non solum fit amplior, verum etiam in suis lateribus crassior & magis valens, ut docuit anatomica inspectio in mulieribus paulo ante vel post partum denatis: & Cl. Ruyschius detexit hoc tempore in uteri fundo fibras motrices orbiculares, quas musculum vocat, certo indicio movendi potentiam tunc temporis multo validiorem esse quam in non gravidis. Docet nos observatio practica, quo pars erysipelate tentata majorem habeat movendi potentiam, eo quoque plus periculi inferri ab eadem irritante causa, quum actio valida instigata, omnia destruat, quod non ita ex debiliore actione erit expectandum; ex qua causa variolæ in robustis censentur periculosiores quam in pueris debilioribus. Ergo tempore prægnationis erysipelas plus periculi adfert, quam alias ex sua natura intulisset. Fœtui fere semper mortale est erysipelas, quamdiu non est perfectus, faciet enim abortum; si vero circa finem gestationis fieret, potuisset exclusus fœtus manere vivens. Retineri enim in  
utero

utero nequit foetus, quum erysipelate affectus, cum motu valido inordinato, tum exsudante ichore erysipelatoso placentam ab adhæsione sua depellet: & sanguis materia erysipelatosæ infectus, nutritioni foetus erit ineptus. Si ergo erysipelas uteri generatur ante foetus perfectionem, mortiferum est foetui: sed dein si veniat, foetus exclusus superstes manere potest: inde foetui letalis, id est non semper sed sæpe mortem inferens: matri quoque letalis, nam a parvo erysipelate si sit affectus uterus cum subsequente foetus exclusione, non semper extinguitur mater, sed si magnum sit, mortem inferre potest *Gorter.*

#### APHOR. 44.

Ὅτις αἰ παρὰ φύσιν λεπταὶ ἔσσι ἐν γαστρὶ ἔχουσιν, ἐκλήτρώσκει, πρὶν ἢν παχυθῶσι.

Quæ præter naturam tenues utero gerunt, abortiunt, donec pleniores evadant.

Videntur hic indicari mulieres ad tabem proclives, item quævis teneræ nimis & in spasmus proclives, vel etiam arida valde atque rigida temperie præditæ. Omnes hæ facile dimittunt foetus immaturos, vel quia debilis nimium fibrosa compages grandescentem embryonem retinere nequit, vel quia alimen-  
tum

cum ei debilitum subministrare non possunt, vel quod facile irritabile habentes nervosum systema abortis spasmodicis ejiciunt quod debili nexu cohæret utero, vel denique quod nimia siccitas atque rigiditas fibrarum dilatationi uteri, dum crescit foetus, obicem ponens & resistentiam, foetum premit arctius & suffocat. *Hecquet.* Experimur pauperes, licet macie confectas, minus abortire quam laute viventes: quare hic intelligendæ sunt foeminæ macilentæ nimis, ex deficiente actione nutritionis. Si ita gracilis & macilenta foemina sit gravida, cujus actio ad bonos generandos humores, ut se ipsam nutriat, est debilitata, vix esset rationi conveniens, hoc corpus valere conceptum foetum non solum nutrire, verum simul ipsi incrementum dare. Propterea primo & secundo adhuc mense, dum tenellus embryo paucis liquore absorpto vivere potuit, non excluditur; sed vero majus incrementum capiens, egens copiosiore nutrimento ex uteri vasis, propter humorum defectum in corpore matris, amplius nutriri nequit, unde tandem nutrimenti defectu moritur atque excluditur, plerumque secundo vel tertio mense. Tam diu igitur abortui obnoxiae sunt, donec sufficiens iterum sanguinis copia in eo corpore generetur, quod ex corporis augmento conjicitur: quare tandem crassescente corpore valent foetui sufficiens nutrimentum dare & gestare ad legitimum pariendi tempus. *Gorter.* Ad graciles haud temere etiam referas virgines illas, quæ ad obtinendam gracilitatem, quam adeo depereunt, thoracibus pectus & abdomen in angustias cogunt; tales enim junceæ virgines solent facile prima vice imprægnatæ abortum pati; quod  
 si

si vero foetus ad perfectionem venit, partus plerumque est periculosissimus, cum doloribus immanibus conjunctus, ita, ut non raro foetum vivum frustratim ex utero excindere atque extrahere dura jubeat necessitas. Nec satis malorum: monstra item inde nasci possunt, quando foeminae tempore gestationis nihilominus thoracibus nimium constrictis incedunt, quoniam foetus, tam arcto spatio inclusus, libere sese movere nequit. *Fr. Hoffmanni Diff. de diata virginum. Hal. 1729. 4<sup>o</sup>. cap. 3. §. 2.* Foeminis gravidis maxime noxia existit thoracis illa compressio: hinc enim eveniunt lipothymiae, & forte etiam abortus. vid. *J. H. Schulze Diff. de vestitus ratione ad valetudinem. Hal. 1737. 4<sup>o</sup>.* Hippocrates *lib. 1. de morb. mul. n. 42.* jam inter alias causas, ex quibus partus, in utero concepti aboriuntur, ventris coarctationem, & hinc factam foetus compressionem retulit. Vix autem violentius premi potest uterus, quam si cum pectore etiam abdominis muscoli arctioribus thoracibus continentur, quibus cataphractariae mulieres, quamvis graviditas & valetudo negligentiores amictum excusare posset, se vestire ad ultimos saepe menses solent. Nam tanto magis id pestiferum est & ipsis matribus, & in ipso utero delitescenti foetui, si, postquam plures menses expleverunt, has gravissimas offensiones haud omittunt. Nec tamen his solis machinis in nascituræ prolis vitam sanitatemque grassantur vecordissimæ matres, sed huic insaniae aliam pejorem addunt. Ne enim venter, quod minus decorum putant, projiciatur, in thoracis partem anteriorem infigunt rigidum bacillum, leviter inflexum ex metallo, ligno, cornu, ebore, balænarum virga

ga confectum, quo prominentior umbilicus multum premitur. *La Planchette*, germanice *das Blanckscheitt* appellant hoc nocentioris cultus instrumentum. Periculum vero, quod ex hoc bacillo foetui imminet, multum augetur, si, quæ proceriores quam sunt videri volunt mulieres, calceamentis altiusculis utuntur. Dum enim gravidæ sic calceatæ, seu rectius cothurnatæ, erecta planta incedunt, abdomen anteriora versus projicitur, & thoraci, illius bacilli comitatu rigorato, multum adprimitur, ut taceamus, tali incessu non parum intendi eos abdominis musculos, quos rectos vocant Anatomici, quibus dum submittitur gravidus uterus, is magis coarctatur, foetus vero tandem misere præfocatur. Si vero abortum haud patiuntur mulieres, aliud tamen foetui imminet periculum, dum accedente hac externa violentia, ejus corpusculum, cui summa teneritas ac mollitudo est, deforme ac monstrum redditur. Haud præter rationem ii, qui de monstris scripserunt, contractas adstrictasque vestes & fascias, quibus eæ, quæ conceptum occultare volunt, abdomen coërcent, adnumerarunt portentosorum partuum causis. Nec Hippocratem *lib. de genitura n. 9.* hæc latuerunt, qui foetus eo loco, quo uteri angusti sunt, mutilari probavit. Immo, si miseris partibus non corporis deformitas his uteri angustiis adfertur, ii nihilominus maternam stoliditatem aliis poenis luunt, dum corpora eorum infirmantur, debiliaque fiunt, &c. Vid. *Platner. de Thorac.*



## APHOR. 45.

**Ο**κόσαι δὲ μετρίως τὸ σῶμα ἔχουσαι ἐκπι-  
 τρώσκεισι διμήλωα καὶ τρίμηλωα ἅπερ προ-  
 φάσι Φανερῆς, πύττησιν αἱ κοτυληδόνες μύξης  
 μεσαί εἰσι, καὶ ἔδύνανται κρατεῖν ὑπὸ τοῦ βάρ-  
 ρους τὸ ἔμβρυον, ἀλλ' ἀπορρήγνυνται.

**Q**uæ mediocri corporis habitu præ-  
 ditæ, foetus bimestres, aut trime-  
 stres absque causa manifesta abor-  
 tione excludunt, iis uteri acetabula mu-  
 co plena sunt, neque præ pondere foe-  
 tum continere possunt, sed abrumpun-  
 tur.

**S**edes hujus aphorismi est duobus in locis,  
*lib. I. de morb. mul. n. 84. & lib. de nat. mul.*  
*n. 17: Si uteri acetabula pituita oppleta fuerint,*  
*mensēs pauciores contingunt, & si uterum gestet,*  
*ubi fœtus robustior evaserit, eum corrumpit. neque*  
*enim confirmatur, sed elabitur. Ex eo autem cogno-*  
*scas, quod humida redditur, quodque effluit, mucosum*  
*& viscidum fit, qualia ex alio feruntur, nec mor-*  
*dent, & in mensium cursu, ubi sanguis purgari de-*  
*sierit, per duos aut tres dies mucosa ex utero effluunt,*  
*horrorque & calor minime acutus detinet, præterquam*  
*quod non deserit.*

Ratio abortuum, qui contingunt mulieribus  
 mediocriter carnosīs, si nulla alia causa pa-  
 teat, refunditur in mucum, quo cotyledones  
 seu

seu acetabula uteri (h. e. oscula vasorum uterinorum quæ cohærent cum placenta) obsita sunt, ita ut propterea non possint foetum retinere præ gravitate, sed abrumpantur. Ex hac causa jure accusabitur tubulorum uteri nimia laxitas. Hodie frequentes, qui evenire solent inter secundum & tertium gestationis mensem, abortus adscribuntur plethoræ uterinæ, seu sanguini menstruo secerni impedito ob clausum uterum, & foetu tamen non potente hactenus in sui incrementum eum absumere, unde a vasculis, quæ foetum cum utero necebant, ruptis abortus; qui felicissime sæpe præcaveri solet tempestive instituta sanguinis missione. Vid. *Boerh. aph.* 1294. *Hoffm. Med. rat.* T. 4. P. 3. p. 631 sq. & T. 3. p. 240. Conf. superius notata ad 5 *aph.* 31.

Si Hippocrates inspexisset uterum foemineum, non dixisset *Cotyledones*, sed dixisset uteri cavitatem, quoniam quadrupedes *Cotyledones* habent; sed foeminarum uterus intus unica cavitate donatus satis demonstrat Hippocratem non inspexisse uterum hujusmodi foeminarum, num mucus fuisset abortus causa. Ergo hoc ex aliis signis conjicere debuit, si nempe foemina multum muci continuo fundat per pudenda, si post menstruationem etiam multum muci effundatur, & quando una cum abortu multum muci exit. Ex quibus conspectis forsitan judicavit, habita ratione analogiæ quadrupedum, mucum illum *cotyledones* nimis implere. Tenax mucus latera uteri obfessa tenens intercipit ingressum vasculorum placenta in oscula uteri hiantia: quare foetus ampliore nutrimento egens, non potentia vascula placenta intrare oscula interna uteri, debita copia

nutrimenti fraudatus moritur, & quia os uteri laxius est constrictum, facile excluditur. Ita concipimus ex mucī abundantia generari posse abortum in foeminis mediocriter crassis. Sed inferre velle hanc unicam in his esse causam, nimis arduum videtur: quum non semper ex matris culpa nascatur abortus: potest enim semen virile non satis valens debiliorem præbere embryonem, qui primis mensibus moriens, vel facit abortire ovum vacuum, vel, si placenta tunc maneat vivens, producit molam: potest etiam vita partium auxiliatricum extingui primis mensibus, quando mulier abortiens excludit parvum admodum foetum. Quare causa abortus primis mensibus tam in patre & partibus auxiliatricibus est quærenda, quam in matre, cuius uterus mucō esset plenus. *Gorter.*

#### APHOR. 46.

Ὅσας παρὰ φύσιν παχεῖαι ἰοῦσαι μὴ ἔνδραμάνουσιν ἐν τῇ γαστρὶ, πάντες τὸ ἐπίπλοον τὸ σῶμα τῶν ὑστερῶν ἀποπέζει, καὶ, πρὶν ἢ λεπτυνθῶσαι, ἔκνυσιν.

Quæ præter naturam crassæ non concipiunt, iis omentum os uteri comprimit, neque prius quam extenuentur, prægnantes efficiuntur.

Galenus illius vocis, *præter naturam*, duplicem Antiquorum expositionem adducit, eamque probat, ut *præter modum communem*, & *immodice*

*modice significet; Hippocrates tamen præter habitum naturalem ipsius patientis id esse intelligendum aperte indicavit lib. de superfoet. n. 9. ubi eadem sententia registrata est his verbis: Mulier. quæ præter naturam crassa & pinguis evasit, & pituita repleta, eo tempore non concipit. Quæ vero sua natura talis est, horum gratia concipiet, nisi aliud quid impediât. Et ratio est evidentissima; nam quæ ex natura pinguis est, illius omentum propriam sedem retinet, nec ad osculum uteri comprimendum descendit, ut evenit illi, quæ, cum naturali temperamento tenuis esset, pinguior effecta ejus omentum gravius redditum est, adeo, ut gravitate distentum ad os uteri comprimendum descendere possit, & ex consequenti sterilitatem inducere. Martian. p. 460. Omentum, ἐπίπλοον, operimentum intestinorum membranaceum, tenue & tenerum, a peritonæo veluti, juxta illam diaphragmatis partem, quæ undecimæ thoracis vertebræ accumbit, enascitur, adhærens antèr cavo lienis, toti fundo ventriculi convexo, duodeno fere toti, jejuno & colo intestinis, venæ portarum, ductui choledocho, pancreati, arteriæ mesentericæ superiori, tandem superiori lienis parti, & quandoque hepati; constat ex duplici lamella, marsupium quasi venatorium formante, & cavitate, Bursa dicta, instruitur: anteriore lamella recta deorsum protenditur, supra ventriculum, supra colon (quæ hoc secundum ventriculum pergit), cui etiam leviter cohæret, dein supra tenuia intestina, liberum, pendulum, fit applicatum peritonæo: posterior lamella, cui pancreas innatum est, interferit se strato intestinorum, pone ventriculum, antrorsum descendens, per super-*

inductam peritonæi lamellam roborata, postquam ad inferiora ventriculi pervenit, colo intestino connascitur, eique est loco mesenterii; ea regione, quâ juxta fundum ventriculi pergit, deinde a sede infima coli (quâ hoc sub ventriculo fertur) novum quasi omentum productum, supra intestina tenuia sub priori, anteriori, lamella fertur & ei continuatur. Quia sæpe foraminula in omento apparent, quando elevatur (quæ vero non sunt naturalia) dictum inde est *Rete* vel *Reticulum*. Pinguedinem continet in cellulis adiposis, ductus quasi formantibus, & vasa sanguifera ambientes: inter quos sunt *areolæ* seu spatia membranacea. Pondus Omenti in homine adulto, nec pingui nec macilento, est circiter dimidiæ libræ. Sed in quiescentibus ejus moles augetur quandoque in immensum. Hinc, quisquis pondus ac molem sæpe incredibilem & omenti & mesenterii secum pensitat, utrum vix elevandis iisdem parem judicabit, sique ad mensem unum aut alterum eum gerant, in abortum tamen admodum proclives existunt. Vid. *Sam. Theod. Quelmaltz. Diff. de pinguedine, ejusque sede tam secundum quam præter naturam constitutis. Lips. 1738. 4º. §. 10.* In quibusdam omentum descendit inter vesicam & uterum, ibique spissius fit. *Forest. Obs. Med. l. 28. obs. 71. schol. p. 492.* Quod si mulier præter naturam crassa evaserit, non concipit. Omentum enim crassum & copiosum superincumbens, os uterorum comprimit, neque genituram recipiunt. Huic extenuatæ medicamentum deorsum purgans propinare oportet, & ad uteros quod purgat & flatum inducit in subditio apponere. *Hippocr. de steril. n. 15. & de nat. mul. n. 19.*

Si

Si perpendimus ea, quæ Hippocrates protulit de uteri structura & cotyledonibus (vid. *aph.* 45. præced.), facile constare potest, eum non inspexisse cadavera humana; ac propterea nunquam vidit in denatis sterilibus, num omentum usque ad uterum sit protensum. Igitur per certam quandam conjecturam in præter naturam crassis, judicavit os uteri ab omento compressum sterilitatem induxisse, ut inde istud non potuisset se satis dilatare ad recipiendum semen virile. In valde obesis invenimus quidem hodie omentum usque ad pudenda pendulum, & attingere posse externam uteri substantiam, inde vero argumentari velle, os uteri comprimi ita, ut semen accipere non possit, non erit conveniens: nam in aqualiculo seu in pelvi hæret intestinum rectum laxum & compressile; atque uterus durus, crassus & firmus, ad anteriorem partem sub osse pubis hæret vesica urinaria, peritonæo tecta: reliquum spatium impletur intestinis tenuibus & magna copia pinguedinis. Si increseat ita omentum, ut etiam in pelvi pendeat, recedent intestina tenuia, sed vesica, intestinum rectum & uterus comprimuntur a molli omento. Quæ partes hoc in loco sunt molles & compressiles, eas facilius comprimuntur, quam duriores & firmæ. Si ergo quædam fieret alicujus partis compressio, vesica urinaria, vel intestinum rectum, vel intestina tenuia potius comprimerentur, quam uterus, qui ita firmus est in non gravidis, ut vix cultro percindi possit. Quia vero neque in urinæ, neque in alvi egestionem nullam experimur difficultatem, etiamsi mulier sit præter naturam crassa, quæ tamen fieret, si ab omento premente hæ partes nimis com-

primerentur; optimo jure concludere possumus, Omentum premens uterum sterilitatis causam esse non posse; præprimis quia uteri os coïtus tempore ab omento comprimi non possit, nam vagina membro virili distenta favet dilatationi orificii uteri. Neque ad recipiendum semen magna orificii uteri dilatatio requiritur, modo enim paulo magis hians fiat, quam est amplitudo urethræ virilis, ad recipiendum semen satis capax erit. Interim tamen præter naturam crassæ mulieres ob pinguedinis abundantiam sæpe non concipiunt: cujus ratio mihi videtur, quod tanta pinguedinis copia in pelvi formetur, ut inde ova in ovario nata venire nequeant in Tubam Fallopianam, sine quibus foemina manet sterilis, etiamsi semen masculinum in utero recipiat. Sive nunc receptio ovulorum in Tuba Fallopiana intercipiatur ab omento interposito, sive a reliquæ adjacentis pinguedinis incremento, æqualis nascitur sterilitas, & eadem est causa; nam dum in præter naturam crassis increfcit omentum, reliqua quoque pinguedo augetur. Igitur conducit ad hanc tollendam seu curandam sterilitatem, corpus extenuare parciore diæta, laboribus & exercitiis validioribus, medicamentis evacuantibus, atque frequentiore venæ sectione. *Gorter.*

Quibus videtur in præsentē aphorismo Omenti nomine non ipsissimum omentum, sed pinguedinem exsuperantem indigitari, habent pro sua sententia textus Hippocraticos in adducto loco ex *lib. de superfæt. n. 9. & lib. de aër. aq. & loc. n. 48. de superfæt. n. 18. de steril. n. 10.* quibus in locis nulla omenti, sed simpliciter pinguedinis tantum fit mentio. Etenim frequens

frequens autopsia ostendit, omentum perraro infra umbilicum extendi, ita ut sterilitas ab alia causa ortum habeat, a nimia scilicet pinguedine, quæ uteri membranis adhæreat, ac impedimento sit ne aura seminalis masculina ovarium subeat, ad illud fœcundandum. *Ramaz. Oper. p. 771.* Peccare vero interdum omentum duritie posse, ut sterilitatem inducat, premendo uterum, quo distendi non possit, legere est in *Panarol. Jatrol. Pent. 3. obs. 10.*

## APHOR. 47.

Ἡ ὑστέρα ἐν τῇ ἰσχίῳ ἐγκειμένη διαπύση,  
ἀνάγκη ἔμμεσιν γίνεσθαι.

**S**i uterus, qua parte ad coxam incumbit, suppuratus fuerit, eum per linamenta medicamento convenienti illita curari est necesse. (ulcus cavum fieri necesse est).

**N**onnulli interpretum volunt Hippocratem hic indicare voluisse medicamenti genus seu curationis methodum in ulcere suppurati uteri; alii potius tantum tradere voluisse autumant, cujusmodi sit ex uteri suppuratione futurum ulcus. *Tozzi.* Hinc est, quod posteriores interpretentur hunc aphorismum ita: *Si uterus in coxam vergens suppuretur, necesse est ulcus cavum fieri*; h. e. si uterus suppurationem patitur ea parte, qua ad coxam protenditur, necesse est inde fiat ulcus cavum & sinuosum, ad interiorem nempe cavitatem penetrans. hoc

G 5

enim



enim significat ἔμμοτον, a μὲτος *linamentum* seu *lin-teum carptum*; unde etiam ἔμμοτον (scilicet φάρμακον) dicitur medicamentum liquidum, quod linteolis conceptis (seu penicillis) exceptum intra ulcus ejusque sinus reconditur, & ἔμμοτοι qui cavo ulcere laborant ad interiora coporis penetrante, quod linamento seu penicillo indiget. *Hecquet.* Favent huic expositioni textus in *lib. de nat. mul. n. 6. lib. 2. de morb. mul. n. 29.* ubi casus in h. m. describitur: *Uteri si adhæserint, innituntur, & si attigeris, durtiem sub lateris inanitate deprehendes, dolor inum ventrem invadit, &c.* & inde subjungitur: *Plerumque vero pus colligunt, & ἔμμοτοι fiunt, & fluore pereunt, nisi (ante quam per se rumpantur) uras, aut feces.* Ἐμμοτον vero intelligit Hippocrates non quodcunque ulcus cavum, ejus curatio per μὲτες, hoc est, per penicilla facienda sit, sed ulcus tantummodo, quod ad internas cavitates penetrat; quod quidem manifestum unicuique patebit consideranti loca omnia, in quibus de ἔμμοτῳ fit mentio. His itaque stantibus, dum inquit Hippocrates, si uterus incumbens coxæ suppuratus fiat, necesse est ἔμμοτον fieri, non intendit docere curationem suppurationis per ἔμμοτον faciendam esse, sed admonere, quid ex hac suppuratione eveniat, ulcus scilicet, ad interioram cavitatem penetrans. *Martian. p. 460.*

Uterus pelvi & inguinibus nexus ligamentis latis & rotundis satis valide in suo situ firmatur; sed quoniam ligamenta hæc multis etiam scætant arteriis, hæc æque ac partes reliquæ inflammatione, quæ commutatur in suppurationem, corripì possunt. Ita tumida & inflammata ligamenta coxæ coherentia si ab uno latere

tere inflammantur, uterum versus istud latum trahunt, & coxæ dolorem inferunt. Quia vero Veteres nesciebant hæc ligamenta inflammari posse & dein suppurari, ex apparentibus signis & conversione uteri ad latus dolens, judicabant uteri conversione hunc dolorem generari, qui tandem in suppurationem abierit. Si vero ligamentum uteri, hujus vel istius lateris, inflammatum abeat in suppurationem, pus suppuratione confectum sub multa pinguedine ibidem hærente latens sensim fit acrius, formatque sinum sua gravitate sensim magis deorsum, donec ad latera pudendorum, vel in inguinibus, vel circa interfoemineum, aperturam fistulosam faciat. Quod ulcus cum longe remotum habeat fomitem instar fistulæ ani in viris, difficulter sanabitur, & perpetuo vel pus vel ichorem fundet. Si vero uterus ipse suppuraretur potius, pus vel ichor per pudenda exstillaret. Quia autem ἔμμος notat eum, qui ulcere cavo laborat; atque ἔμμοτον, si subintelligitur φάρμακον, designat aliquod medicamentum molle & liquidum, quod linteo carpto receptum, ut hodie habentur digestiva a Chirurgis, ulceribus cavis inditur; magis conveniens est sensui hujus aphorismi, intelligere ulcus cavum, quam medicamentum ἔμμοτον applicatum. Quum secundo ad principium hujus ulceris cavi & fistulosi pertingere non possimus, atque pinguedo adjacens a stagnante pure corrumpatur, curatio non solum est difficillima, sed & debet artificiose pertractari. Si enim externe applicetur medicamentum aptum, ejus virtus ad originem mali pertingere nequit; liquor injectus nimis cito effluit; turunda indita claudens aperturam nimis diu intus retinet pus aut

aut ichorem. Præstantissima, quæ mihi successit, curatio constabat ex injectione quadam confecta ex melle rosarum, vel quodam digestivo ex terebinthina cum vitello ovi soluta, quæ medicamina postea diluta decocto agrimonix, vel scordii, injecta intus depurabant ulcus istud cavum; dein immittebam turundam ex terebinthina cocta confectam, cui admiscebam myrrham, aloën, olibanum, pulverem sabinæ, vel mitigabam virtutem turundæ addito gummi tragacanthi, mucilagine radicis althææ vel symphyti. Dein tegebam aperturam plumaceola cum aliquo digestivo oblinita. Interna autem medicamenta nihil speciale continebant, talia enim erant, quæ ulceribus internis adhiberi solent. *Gorter.*

### APHOR. 48.

Ἐμβρυα, τὰ μὲν ἄρσενα ἐν πῶσι δεξιῶσι, τὰ δὲ θήλεα ἐν τοῖσιν ἀριστεροῖσι μάλλον.

Fœtus mares quidem uteri dextra parte, foeminæ sinistra magis gestantur.

Effatum hoc nec rationi, nec experientix congruere, ostenditur in *Laur. Exerc. p. 283 sq* & apud *Bartbol. Cent. 4. Epist. 30. p. 126 sq.* Vid. etiam *Eph. N. C. Cent. 1. p. 115.* Transeat ergo aphorismus hicce cum aliis ad credulam Antiquitatem referendis. Hoc solummodo notamus, constare vel ex præsentē aphorismo, naturalem structuram & uteri situm  
Veteribus

Veteribus parum cognitum fuisse, atque rationem istos deduxisse ex uteri fabrica in animalibus. Quippe uterus foemineus non habet cavitatem dextram vel sinistram, sed unicam in medio, ut mares & foeminæ in eodem loco contineantur. Si autem foetus hoc vel istud latius magis occupat, id dependet ab uteri obliquo situ, & talis positura non promittit marem aut foeminam, sed ut plurimum difficiliorem partum. *Gorter.*

## APHOR. 49.

Εἰς ὑστέρων ἐκπύσεως πληρμικὸν ἐπιλαθεῖς,  
ἐπιλαμβάνειν τὰς μυκτῆρας καὶ τὸ σῶμα.

Ut secundæ excidant, sternutatorio naribus appposito, eas, & os comprimito.

Aphorismus hic desumptus est ex lib. 2. *Epidem. sect. 5. n. 42. 43.*

Explicatio peti potest ex dictis ad 5 *aph. 35.* Nares & os ut comprimantur vel claudantur, applicato sternutatorio, in nostro aphorismo requiritur; quo nempe simul majore nisu deorsum trudentur viscera ventris, & eo validius extrudatur id, quod post partum in utero resistat. Ne autem ex hac medendi methodo pejora sequantur mala, quam ex Secundis relictis; causæ retinentes Secundas primò sunt perpendendæ. Quod si remaneant post partum, quia os uteri nimis constrictum est, maxime

xime conducere, ut sternutatorium adhibeatur, videre est supra ad *aph.* 35. Si vero remanserint secundinæ cum orificio uteri aperto, quia placenta tenacius adhæret utero, quam ut statim expelli possit, non esset tutum adhibere sternutatorium; validior enim illa protrusio simul forsân extruderet uterum nunc suo sustentaculo orbatum, quod aliquoties observavi factum per violentiorem funis umbilicalis tractionem. Quæ uteri inversio si non protinus reponatur, majus periculum est exspectandum, quam a retentis secundinis. Majus malum est exspectandum, si portio placentæ separata fundat sanguinem, dum altera pars magis adhærens deneget exitum; nam non solum periculum est ut invertatur uterus, sed etiam nimia sanguinis profusione puerpera non raro in animi deliquium incidit, & convellitur, atque deinceps pallefcens diu vitam debilem & valedudinariam agit, bono sanguine privata. Hanc tenaciorem placentæ adhæSIONem sæpe observavi in partu præmaturo, dum placenta, ante quam ejus propria extincta sit vita, ab utero separari debet. Atque hoc etiam aliquo modo culpæ obstetricum est adscribendum, quæ post partum non ligant portionem funiculi versus placentam, ut per funiculi vasa aperta effluere possit sanguis, qui, hac via intercepta, magis detrusisset adhærentem placentam ab utero. In utroque igitur casu cum orificio uteri aperto, quoniam non caret periculo indere sternutatorium, ego soleo cingere & sustentare totum abdomen, cujus adminiculo ferre semper brevi post partum extrudetur placenta cum membranis: si autem non procedat, obstetricem moneo, ut secundum ductum funiculi

culi umbilicalis immittat manum, qua artificiose, & prudenter adhærentem placentam separat ab utero, & dein unâ cum manu sua, adjuvante conatu matris, placentam educat. *Gortier.*

## APHOR. 50.

Γυναῖκί τὴ κατὰ μὲν ὡς ἂν βάλῃ ἐπὶ στήθων, στήθων ὡς μάλιστα πρὸς τὰς πηθὰς πρὸς-  
βαλλε.

**M**ulieri si voles menstrua sistere, cucurbitulam quam maximam ad mammas appone.

**E**xstat hæc sententia in *lib. 2. Epidem. sect. 6. n. 33.*

In immoderatis menstruis cucurbitulæ mammis affixæ, revulsionem faciunt sanguinis ab utero sursum, si nempe ille sola copia & quantitate peccat. Nam dilatatis per attractionem vasculorum diametris, sanguis eo versus abripitur. Maximam vult cucurbitam Hippocrates, ut & magis & vehementius per venas communes sursum attrahat atque revellat. *Holler. Hecquet.* Sed cautela sit, ut cucurbitulæ infra potius, quam supra mammas admoveantur, ne subinde mammæ ipsæ tumescant, aut inflamentur, non sine graviore periculo: neque insuper scarificentur, ne ulcera exinde oriantur. *Tozzi.* Præterea vero consilium Hippocratis cautius,

cautius, & non nisi præmissa venæ sectione, adsumendum esse, monemur in *Junckeri Med. Pract.* p. 112. Si purgatio nimia mulieri nocet, remedio sint cucurbitulæ, cute incisa, inguinibus vel etiam sub mammis admotæ. *Cels.* l. 4. c. 20. p. 233. De vasorum mammariorum cum uterinis commercio, consuli possunt notata ad 5 *apb.* 39. *Heurnius* maximo cum successu semper in immoderatiore uteri fluxu se adhibuisse refert pulverem, cujus compositio hæc est: Accipe feminis hyoscyami, papaveris albi ana drachmam unam, hæmatitæ, corallior. rubr. ana drachmam semis, camphoræ scrupulum dimidium. M. de quo mane & vesperti dimidia drachma pro dosi sumenda. Nos quoque ab ejus usu olim laudabilem effectum vidimus, sed convenit eum exhibere ubi omnia in actuoso sunt motu arteriarum pulsu celeri & vehementi, cum assidua vigilia, atque tum etiam securius ut ipsi addatur nitrum ad dimidiam drachmam; minime vero ubi vires cum sanguine exhaustæ sunt, & pulsus vix digito tangi potest. Nam a feminis hyoscyami usu paulo largiori, in dementiam conjectas fuisse quasdam personas novimus. *Hoffm. med. rat.* T. 4. P. 2. p. 119. Ex solo semine hyoscyami & papaveris albi, æquali pondere, cum conserva rosarum rubrarum factum electuarium, ab experientia laudatur in *Boyle Util. Phil. nat.* p. 230.



**APHOR.**

## APHOR. 51.

Ὅτις αἱ ἐν γαστρὶ ἔχουσι, ταύτων τὸ σῶμα τῶν  
ὑστέρων συμμέμυκεν.

Quæ utero gerunt, iis uteri os con-  
nivet.

Signum hîc facti conceptus docetur, uterus  
clausus: nam ovum imprægnatum clauso  
strictura suorum musculorum utero continetur.  
*Boerb. J. M. §. 675.* Ast non semper a clauso  
utero posse concludi ad conceptum factum,  
indicat sequens aphorismus 54. Non satis ex-  
pertæ in anatomicis obstetrices credunt os uteri  
esse eam angustiam, quam statim in pudendis  
offendunt, quæ pars connivens perperam a  
multis vocatur os uteri, dum vero sit externa  
coarctatio vaginæ, quum uteri os adhuc satis  
distet ab hac parte, nempe hærens in altera  
interna extremitate vaginæ. Qui igitur ex hu-  
jus vaginæ orificio clauso vellent judicare num  
fœmina sit gravida, omnino deciperentur. Os  
uteri toto gestationis tempore manet clausum,  
tam diu, donec vel partus vel abortus instans  
oris delatationem exigat. Sunt quædam fœ-  
minæ, quæ toto gestationis tempore menses  
fundunt ordinate, ac si non essent gravidæ. At  
inde non sequitur, uteri os ipsis esse apertum;  
nam verisimile potius est, his mulieribus men-  
strua fluere non ex utero, sed ex vagina, si-  
Vol. II. H quidem



quidem in hac similia sunt vasa suis ostiolis donata, uti in utero. Neque os uteri apertum fuisse concludi potest ex eo, quod foeminae quaedam passae fuerint superfoetationem. Nam si animadvertimus, quam parva requiratur apertura, ut ingrediatur semen, dum interim glans penis huic orificio applicata exitum intercipiat, vix verendum est, hoc tempore expelli posse ex utero contenta. Sed ut sit signum graviditatis haec duo adesse debent: primo istud os clausum duntaxat esse debebat solo tempore gestationis; verum ut plurimum omni tempore clausum est, quare deciperet eum, qui tangeret os uteri clausum, indeque semper judicaret foeminam esse gravidam. Si vero inveniret uteri os apertum, tunc tuto iudicium ferre posset foeminam non esse gravidam; aut si offenderet gravidam, instare abortum vel partum. Altera est difficultas, quod in non gravidis os uteri ita habeatur a pudendis remotum in quibusdam, ut digito attingi non possit: in gravidis vero, maxime instante partu, magis ad pudenda descendens tactu explorari potest, quando non requiritur hoc signo uti ad investigandum, num gravida sit, nec ne. Propterea hoc signum & quoniam est incertum, atque etiam impudicum, puto nunquam adhibendum esse, ad investigandum num foemina sit gravida; sed ut cognoscamus, num partus instet, obstetrix eo signo carere nequit; quam diu enim sentiet suis digitis, os uteri firmiter esse contractum, licet dolores parturientium adsint, non potest expectare foetus exclusionem. *Gorter.*

**APHOR.**

## APHOR. 52.

**Η** γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχάσῃ γάλα πλὸς ἐκ τῶν μαζῶν ῥυῆ, ἀσθενὲς τὸ ἔμβρυον σημαίνει· ἢν δὲ στεροὶ οἱ μαστοὶ ἔωσιν, ὑγιεινότερον τὸ ἔμβρυον σημαίνει.

**M**ulieri uterum gerenti si lac copiosum e mammis effluat, foetum imbecillum indicat: quod si solidæ mammæ fuerint, valentiolem foetum significat.

**E**adem sententia legitur in *lib. 2. Epidem. sect. 6. n. 35. 36.* & apud *Cels. l. 2. c. 7. p. 62.*

*Si gravidæ molles, stillentque subinde papillæ,  
Oret Lucinam, se male foetus habet.*

Heerkens de valet. Litter. p. 242

**E** gravidæ mammis lac copiosum effluens mammarum attestatur laxitatem. Quid vero laxitas agit mammarum aliud, quam quod alimentum ab utero derivet, cujus carnea soliditas, i. e. robur & contractilitas impedit adfluxum? Unde foetus debilitas, quemadmodum solidæ mammæ notant valorem & sanitatem ejus. *Ström Theor. mot. recipr. p. 81. Conf. 5 aph. 37. & Eph. N. C. Vol. 4. obs. 66.* Nam sanguis pro foetus alimento destinatus excludit lactis proventum, quam diu foetus bene habet. Quan-

docunque igitur debitum foetui alimentum non impenditur, natura aberrans ad mammas idem facile amandat. *Wedel.*

Circa finem graviditatis, sexto, septimo & octavo mense, quando sensim debilitari incipit actio vitalis in placenta & funiculo umbilicali, mammae sensim cum decremento hujus actionis, disponuntur ad lactis praeparationem, ut tandem, quando requiritur lac pro infantis nutritione, mammae satis validam possideant praeparandi & evacuandi lactis potentiam. Si vero contingat, quod mammae, quae debebant sensim magis turgere & solidiores fieri, se accingentes ad lactis generationem, fiant flacciscentes, & fundentes multum lactis, ut signum & causa foetum infirmum esse declarant. Ex eadem translatione actionis ab utero ad mammas intelligitur, mammas turgentes & solidas indicare foetum & uterum valere: tument enim tunc & solidiores fiunt mammae etiam in puellis, quando uterus ad concipiendum fit aptus, ut ex sororiantibus mammis, etiamsi talis puella non fundat menstrua, conjiciamus eam esse maturam: eo magis si circa finem gestationis fieri debeant lactis promptuaria, tunc enim sensim copia colostri magis turgent, ut non fiant durae, sed solidae & tumentes, promptae ad fundendum lac pro infante. *Gorter.*



APHOR.

## APHOR. 53.

**Ο**κόσαι διαφθείραν μέλλουσι τὰ ἔμβρυα, καὶ τῆσιν οἱ πῆθοι ἰσχυροὶ γίνονται. ἢν δὲ πάλιν σκληροὶ γίνωνται, ὀδύνη ἔσται ἢν ἐν τοῖσι πῆθοισιν, ἢ ἐν τοῖσιν ἰσχυρίσιν, ἢ ἐν τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν, ἢ ἐν τοῖσι γάσασι, καὶ ὁ διαφθέρῃσιν.

**Q**uæ foetus perdituræ sunt, iis mammæ extenuantur. Quod si rursus duræ evadant, dolor erit vel in mammis, vel in coxis, vel in oculis, vel in genibus, neque foetum perdunt.

**P**rius hujus aphorismi membrum, imminente abortu mammæ gracilesce, expositum est ad 5 aph. 37. Secunda parte monemur non semper sequi abortum gracilescentes mammæ, sed has iterum quandoque duras fieri seu solidas & tensas ex flaccidis; hoc tamen casu succedere alicubi *dolorem, aut in mammis, aut &c.* qui dolor est a spastica diathesi, dum fatiscen-tem in mammis elaterem natura erigere satagit, inducta mutatione diametrorum in vasis, quo conatu (mechanismo) in consensum trahuntur aliæ corporis partes. Facta hac mutatione mulier jam non periclitatur abortu. *Hecquet.*

Durities mammarum distinguenda est a mammis solidioribus (aph. præced. 52.), quæ firmum foetum indicabant, & nihil mali portentebant. Neque durities scirrhusa vel inflammatoria, aut scrophulosa est accipienda, quæ

æque in non gravidis , quam gravidis acciðit. Ita etiam lactantibus abundantia vel concretione lactis mammæ indurescunt. Verum hæ omnes species non prælagiunt recensita mala. Quare talis durities est concipienda, quæ provenit ab eadem , sed majore causa , ex qua proveniebant mammæ solidiores & tumentes. Qui impetus major ita implet mammarum vasa sine emissionem lactis , ut ad attactum non sint solidiores & firmæ , verum duræ & ita renitentes , ut ad digitos prementes non admittant foveas ; & propter turgescentiam illam nimium dolorem inferant. Signum ergo est , uteri actionem validissimam esse , unde ad abortum faciendum nullum erit periculum , qui non fit valente uteri actione , sed ex ea debilitata vel perturbata. Quoniam adjacentes partes hac prævalente uteri actione simul agitantur & sanguine implentur , inde in coxis & genibus quoque dolor. An vero oculi inde doleant , dubitare possumus : sed quoniam in lactantibus observavi , quoties mammæ nimia copia lactis turgabant & dolebant , oculos quoque dolore , verisimile videtur mihi , hos oculorum dolores magis ex duris & nimis impletis mammis oriri , quam ex actione uteri validiore. *Garter.*



**APHOR.**

## APHOR. 54.

Ὁκόσησι τὸ σῶμα τῶν ὑστερίων σκληρόν ἐστι,  
παύτησιν ἀνάγκη τὸ εἶμα τῶν ὑστερίων  
ξυμμεύειν.

Quibus os uteri durum est, iis con-  
nivere os uteri necesse est.

Videtur hæc sententia appendix esse ad  
5 aph. 51. ubi ex clauso utero arguebatur  
conceptus factus & mulier gravida esse. Nunc  
docetur, non semper conceptum factum indi-  
cari ab utero clauso, quin potius impediri il-  
lum, ne fiat, si nempe os uteri fuerit durum,  
callosum. *Si uteri tumorem durum senserint, men-  
ses absconduntur, & eorum osculum clauditur, neque  
prægnans fit. Cum sic habuerit, si digito contrecta-  
ris, os asperum deprehendes, neque digitum intromit-  
tit, febris & dentium fremitus eam prebendit, dolor  
inum ventrem desinet, laterum inanitatem & lum-  
bos. Hippocr. de nat. mul. n. 31. lib. 2. de morb.  
mul. n. 45. 46. 50. de steril. n. 15.*

Quia attactu constat, quoties os uteri est  
contractum, simul esse durum, licet nullus adsit  
tumor inflammatorius vel scirrhusus, inde patet,  
quod hæc constrictio dependeat a contractio-  
ne fibrarum orbicularium, qua contractione, uti  
omnes reliqui muscoli, hæ fibræ induratae sen-  
tiuntur: sed orificii uteri dilatatio videtur præ-  
cipue oriri relaxatis fibris orbicularibus. Hinc  
tempore conceptus, partus, & menstruationis,

hæ fibræ orbiculares videntur relaxari, ut transitum præbeant per hoc orificium. Si vero os apertum æque esset durum, quam dum est clausum, signum esset, orificium uteri æque suis fibris distrahi quam contrahi, quod nunc contrarium patet. Ergo quoties invenitur os uteri durum, signum quoque est istud contractum esse. Ut igitur obstetrix sciat in parturientium doloribus, num expectandus sit partus, tangens uteri orificium, si istud inveniat durum, pronunciare potest uteri os esse clausum & propterea partum fieri non posse, & expectandum esse monet, donec uteri os mollescat. Hoc signum quoque valet in lochliis vel menstruis retentis, & in uteri hydropse: nam si detegat os uteri durum, novit os esse contractum & ita intus continere humores; si vero molle inveniat, judicare potest istorum retentionem non oriri ab ore uteri contracto. Sic valet medicus opportuna adhibere auxilia, vel laxantia vel instigantia, ut evacuet id, quod in utero retinetur. *Gortier.*



**APHOR.**

## APHOR. 55.

**Ο**κόσαι ἰν γαστρὶ ἔχουσαι ὑπὸ πυρετῶν λαμβάνονται, καὶ ἰσχυρῶς ἰσχυαίνονται ἀνευ παροφάσιου φανερῆς, πικρὰς χαλεπῶς καὶ ἐπικινδύνως, ἢ ἐκλήτρώσκειται κινδυνεύουσι.

**Q**uæcunque utero gerentes febris detinentur, & vehementer extenuantur citra manifestam causam, eæ difficulter & cum periculo pariunt, aut abortientes periclitantur.

**I**n *Coac. sect. 3. n. 408.* ita scriptum est: *Citra rationem facta colliquatio in uterum gerentibus abortiones indicat.*

*In febris absque manifesta causa extenuari*, intelligimus, quando nec dolor, nec vigiliæ, neque insignis evacuatio intercedit, aut aliud quid eorum, a quibus corpora extenuari magnopere solent, de quibus mentionem fecit Hippocrâtes in *Prognost. n. 2.* Idque virium imbecillitatem significare docuit superius 2 aph. 28. Stante igitur imbecillitate uterum gerentis, si tunc foetum corrumpi contingat, mulierem periclitari, est rationabile. Verum si foetus usque ad exactum gestationis tempus conservetur; difficulter tamen, propter virium imbecillitatem, parit, & periculose: quia, etiamsi ab ægritudine ad tempus partus intervallum aliquod temporis intercedat, non possunt tamen, aut foetus, aut mater pristinum

H 5

recu-



recuperasse robur, ut labores partus absque periculo ferre possint; difficilis ergo, & laboriosus partus exspectandus est. *Martian. p. 461. Conf. Forest. Obs. Med. l. 28. obs. 72. schol. p. 499.* Extenuatio illa non leve vitium in sanguine, & robur destructum indicat; ubi enim cacochymia est, ibi non potest consistere virium robur: quodcumque autem corpus matris viciosis humoribus abundat, vel intestinus calidus depascens humidum motus in sanguine custoditur, fieri non poterit quin mater & foetus sit imbecillior. Quandoque autem accidit, quod mulieres gravidæ extenuentur, quia foetus nimium consumit alimoniam matris; unde etiam non sine ratione scribit Hippocrates, quod tales foeminæ cum periculo pariant, quia causæ necessariae ad partum facile tolluntur, ut sunt robur matris, viæ apertæ molles ac lubricæ. *Fr. Hoffmanni Diss. de morbis foetuum in utero. Halæ 1702. 4º. §. 2. 5.*

Causa non manifesta extenuationem inducens est febris remittens colliquativa, quæ eo fit major, quo magis evacuamus. Igitur dum post partum emittitur magna copia sanguinis, partim sanguinis defectu, partim augmento febris colliquativæ moritur puerpera. Ab eadem hac extenuatione & febribus partus fit difficilior, quia vitio matris excluditur febris; quia vero vita placenta extincta foetus non conatur in lucem prodire, inde sæpe fit, quod post foetus exclusionem placenta tenaciter utero adhærens, quia non satis exaruit, post partum non statim sequatur, sed remanens partum difficiliorem faciat & periculosum, cum stagnans, corruptionem suscipiens, febrem colliquativam augeat. Sive circa principium, sive medium, sive finem

nem gestationis gravida foemina febribus colli-  
quativis vexata, & vehementer extenuata ex-  
cludat foetum, idem patitur periculum. Nam  
& in abortu & in partu naturali, effundit ma-  
jorem sanguinis copiam, & placenta tenacius  
adhærere solet utero, quam ut perfectum abor-  
tum facere possit. Ergo per easdem assignatas  
causas in abortu foemina ita extenuata pericli-  
tatur. *Gorter.*

## A P H O R. 56.

Εἰ πὶ ῥόῳ γυναικείῳ σπασμὸς καὶ λιποθυμία ἢ  
ἐπιγένηται, κακόν.

In fluore muliebri si convulsio acce-  
dat & animi defectio, malum.

Post nimiam sanguinis jacturam, ab inanitione  
spasmus & animi deliquia fieri, supra  
5 aph. 3. dictum est. At vero præsens textus  
non indicat immodicum vel diu durantem men-  
sium fluxum; neque dicitur ex fluxu muliebri  
si fiat convulsio vel lipothymia, verum dicit  
huic fluxui si superveniat, id est, si talia sym-  
ptomata fiant in fluxu muliebri, malum signum  
est. Equidem hodie pronunciamus malum, si  
foemina versetur in naturali menstruatione, at-  
que tum a convulsione vel lipothymia corri-  
piatur; nam observavi ab his supervenientibus  
symptomatibus illam menstruationem non solum  
turbari, sed etiam in medio fluxu sufflaminari,  
cum multo detrimento mulieris. Novi multas  
foeminas,

foeminas, quæ sæpissime menstruationis tempore hujusmodi symptomatibus corripiuntur, quæque per triduum vel ultra decumbere debent, donec cessaverit ille fluxus; etiamsi non sit immodicus. Igitur convulsionem & lipothymiam non deduxi ex nimio profluvio, sed ex aliquo morbo latente, qui producit lipothymiam aut convulsionem, dum uterus se accingit emittere sanguinem menstruum. Notum est, homines debiles, mobilitate solidorum laborantes, his morbis sæpe tentari ex levissima causa. Et quoniam in multis foeminis, quibus sanguinis est defectus, observatum est, menstruum sanguinis fluxum nihilo minus statim fieri tempore, colligere possumus, ipsam plethoram per totum corpus non sufficere ad menstruationem, sed causam adesse debere moventem, quæ contentum sanguinem in arteriis magis ducit ad uterum & ibidem evacuat: quoties enim hæc causa dirigens cessat, etiamsi maneat tali in corpore sanguinis abundantia, menses tamen supprimuntur, quod experimur in foeminis menstruantibus si subito aliquo terrore corripiuntur. Hic nunc motus particularis derivans sanguinem ad uterum, & eum evacuans, non raro reliquum corpus in consensum trahit: & si hoc cadat in mulieres mobilitate solidorum laborantes, quarum corpora ex minima causa admodum turbantur, sæpe fit, quod per consensum hunc mulier corripiatur animi deliquio aut convulsione, quæ hodie vocatur *Convulsio hysterica*. Quibus symptomatibus abortis, sæpissime in medio fluxu supprimuntur menses, qui deinceps difficile revocantur. Nam lipothymia, extinguens omnem motum vitalem, etiam simul extinguit hunc motum particularum

rem uteri, qui cessante lipothymia non semper redit. Eodem modo Convulsio hysterica commutat motum alternum constringentem & dilatantem, quo propellebatur sanguis menstruus, in motum tonicum perpetuo contrahentem, quæ tetanica constrictio non solum valet cohibere menstruum sanguinem, verum etiam lochiorum fluxum, imo si parturienti superveniat, inhibet foetus exclusionem. Igitur lipothymia vel convulsio superveniens valet suppressere naturalem mensium fluxum: quod merito dicitur *malum*. Hoc autem malum si ex spasmo fiat, menses revocari & molestiæ ex spasmo natæ minui possunt auxiliis antispasmodicis anodynis. Si vero lipothymia fuerit causa, illis admiscantur quædam spirituosa aromatica & sales volatiles cum optimo successu. *Gorter.*

## APHOR. 57.

**Κ** αἱ ἀμηνιῶν γινομένων πλεονόντων νῆσι ξυμβαίνει  
νασι καὶ μὴ γινομένων, ἀπὸ τῆς ὑστέρης γί-  
νονται νῆσι.

**M**ensibus copiosioribus profluentibus morbi contingunt; & non prodeuntibus, ab utero morbi eveniunt.

**Q**uo tempore foemininum corpus ad incrementum suum pervenit, in bene facta temperie plus solet conficere cruoris, quam qui valis contineatur, unde arteriis uterinis

rinis fluoris menstrui nomine secernitur. *Boerb. aph. 1284.* Mulieri igitur tempus menstruum, in quo purgatio ipsa procedet, concedendum, quod ut brevissimum tres dies implet. plerisque autem etiam multo plures. *Hippocr. de octim. partu n. 5.* Tempore gestationis & imprægnationis fluxus ille cessat plerumque, ut & quam diu puerpera lactat. Extra hos casus menstrua evacuatio cum magno sanitatis emolumento foeminis contingit: si vero eadem aut modum excedat, aut deficiat, multorum morborum inde originem derivandam esse, quotidiana docet experientia & præfens innuit aphorismus. Nimia sanguinis ex utero effusio, ratione temporis quo impetit multum variat. Nimirum quandoque statim, quo erumpere solent menses tempore, sanguis copiose & cum impetu effertur; quandoque extra illam lunarem periodum, bis vel pluries in mense, redit fluxus; quandoque ipsa menstrua purgatio solito diutius per complures dies liberaliter succedit. Non tamen omnis larga sanguinis per uterum fluxio, quæ in foeminis sanguineis subinde ob nimiam redundantiam accidit, ac si nimia & noxia esset, censenda est, sed ea demum, quæ virium imbecillitate stipatur, quam postea aliæ functionum læsiones conspicuæ, ut inappetentia, cruditas ex mala digestionem, gravativus circa ventriculi regionem sensus, foedus faciei color, pulsus languidus & frequens cum lento æstu, pedum œdematosus tumor, turbatus & minus reficiens somnus, insequuntur. *Hoffm. Med. rat. T. 4. P. 2. p. 207.* Verbo: *mensibus copiosioribus profluentibus morbi contingunt*, quales ab inanitione aut nimia hæmorrhagia quacunque provenire solent. Vid. 5 *aph. 3. Galen. l. 6. de*

*de loc. affect. cap. 5. Forest. Obs. Med. l. 28. obs. 12. schol. Boerb. J. M. §. 775.*

*Si non prodeunt, quæ prodire debent, menstruæ sanguinis evacuationes, oritur plethora: tarditas; gravitas; pallor; dolor lumborum, inguinum; depravatæ functiones omnes fere naturales, vitales, animales; quæ facile deducuntur a vasis nimis pressis, liquido copiosiore, stagnante, suffocato. Ab eodem autem sic accumulato sæpe parantur viæ, raris secretionibus menstruâ notæ; dum per oculos, aures, nares, gingivas, vias salivæ, œsophagum, alvum, vesicam, mammas, cutim, vulnera, ulcera, exire viderint Medici. Vel & sæpe labefactantur inde omnia viscera, oriturque partim a putredine concepta, partim a vasis læsis, infinitum morborum genus. Boerb. aph. 1285 /sqv. Eveniunt autem morbi, non modo si supprimantur evacuationes istæ, sed etiam si minuantur plurimum. Ac primum quidem foemina destituitur conceptione: hæc enim una est e causis sterilitatis maxima. Unde quibus, per ætatem, aut non adhuc accedunt, aut desistere, non concipiunt. Dum autem fluunt menstrua, quantum ex hac parte, semper possunt concipere; quanquam constat, multas concepisse ante quam passæ essent menstrua. Præterea uteri strangulatione vexantur, & scirrhuso tumore, & cancro, & erysipelate; & aquositate replentur, & flatibus, & ulceribus pravis gracilescent; &c. Vid. Forest. Obs. Med. l. 28. obs. 1. schol. Quæ mala impeditiori sanguinis per abdominis viscera cursui debentur. Quia enim in muliebri corpore laxior fibrarum est compages, & major semper sanguinis copia generatur; suppressa consueta superflui evacuatione,*

tione, vel fluxu parcius justo succedente, aut post quinquagesimum annum plane subsistente, exundans moles languidius cursum perficit per imi ventris viscera, & in nervosis eorum partibus hærens, sæva inducit symptomata, ipsa & impetuosius humorum ad certa loca congestionibus infestantia. Hinc cardialgicæ illæ præcordiorum oppressiones, faucium strangulationes, tensive hypochondriorum inflationes, phlogoses, artuum dolores, universi corporis languores, & hujus generis plura. *Hoffm. morb. ex bep. vit. §. 20.* Virgini si menses suo tempore non appareant, multum & febricitat, & dolet, sitit, esurit, vomit, insania vexatur, ac rursus ad mentem redit. Uteri moventur, & cum ad viscera vertuntur, vomitus & febris, ac delirium accedunt. At ubi cessant, esurit & sitit, & febris mitis ac lenta Epialos dicta detinet. *Hippocr. de superfæt. n. 24.* Cum menses in occulto latent, dolor infimum ventrem infestabit, & pondus quoddam incumbere videtur, lumbi & laterum inanitates stupendum in modum dolent. Si vero menses nullo modo prodeunt, ex morbo crassi, lenti & glutinosi redduntur. *lib. 1. de morb. mul. n. 10.* Cum igitur exitui via minime pateat, copiosior autem sanguis per cibos & corporis incrementum affluat, tunc sanguis effluvio carens, propter copiam ad cor & septum transversum resilit. Ubi igitur hæc oppleta fuerint, cor obstupefcit, indeque torpor, & ex torpore dementia invadit: tum etiam horror cum febre irruit, febres inerrantes appellant. Quæ cum ita se habeant, ob acutam quidem inflammationem insanit, ob putredinem clamat, ob caliginem terretur & timet, ob oppressionem  
 vero

vero quæ circa cor est, suffocationem sibi parat, ob sanguinis autem vitium animus anxietudine & impotentia conflictatur & malum contrahit. &c. *lib. de virgin. morb. n. 2.* Quibus foeminis menstrua non proveniunt, necesse est capitis acerbissimi dolores sint, vel quælibet alia pars morbo infestetur. *Cels. l. 2. c. 7. p. 59.* Eleganti expressa carmine sunt, quæ suppressionem menstruorum excipiunt mala, apud *Coulej. p. 85:*

*Succedunt gravitas membrorum uique tumores;*

*Fertque suum corpus non patienter onus;*

*Succedunt placitarum olim fastidia rerum,*

*Ipsius & vitæ nausea tetra subit;*

*Ulceraque, & putres ruptis fornacibus ignes;*

*Et vomitus misto sanguine terribiles.*

*Nunc labor, atque uteri nequicquam pugna furentis,*

*Et mortes anima mox titubante breves.*

*Pectore tardus nunc domito vix spiritus exit,*

*Mox omnes artus Tussis anghela quatit.*

*Ipsa etiam victor scandit Capitolia mentis,*

*Et cerebri gyros occupat hostis atrox.*

*Hinc vigiles noctes, vigiles sed somnia terrent;*

*Veraque Mens patitur dum mala, falsa creat.*

*Factatamque diu serus vitam obruit hydrops,*

*Atque anima e mersa naufraga puppe natat.*

*Ab quoties verno gemmantes flore puellas*

*(Multa sagittifero jam meditante Deo)*

*Hic ferus exurit subita rubigine morbus!*

*Flet deceptus amor, tristis amator abit.*



## APHOR. 58.

**Ε**πὶ ἀρχῇ φλεγμαίνοντι, καὶ ἐπὶ ὑστέρῃ φλεγ-  
μαίνοντι, καὶ ἐπὶ νεφροστικῇ ἐμπύουσι στραγ-  
γυρία ἐπιγίνεται. ἐπὶ δὲ ἡπύῃ φλεγμαίνοντι  
λόγῳ ἐπιγίνεται.

**A**d recti intestini, & uteri inflamma-  
tionem, renesque purulentos stran-  
guria succedit. At jecoris inflammatio-  
ni supervenit singultus.

**S**tranguriæ hic indicantur tres causæ. Dici-  
tur Stranguria seu urinæ stillicidium, quan-  
do lotium guttatim cum ardoris sensu emit-  
titur, & pro causâ agnoscit vel acrimoniam ir-  
ritantem, vel excoarctationem partium vesicæ,  
vel calculum occludentem, aut tumorem, in  
vesicæ collo, ejusve urethra. vid. Boerb. J. M.  
§. 822. Est urinæ incontinentiæ species, præ-  
cepta nempe & crebra destillatio, quæ reddi-  
tur ægro invito, sine periodico vesicæ conatu,  
qui esse solet cum urinæ copia vesicam disten-  
dit, ipsamque excitat ad liberalem & liberam  
vacuationem rei molestæ. Talis invita urinæ  
destillatio quæ stranguria est, proportionem re-  
spondet ei lientericiæ cujus præcepta egestio est  
ab impotentia continendi ea quæ assumuntur,  
quam edit vel alvus aphthosa, vel proritata  
morsu potionis aut cibi. Omnis enim strangu-  
ria fit, aut morbo vesicæ, aut ejus symptoma-  
te. Morbus quidem est; exulceratio, vel  
coagmen-

coagmentatio lapidosa; vid. 4 aph. 75. 79. 81. Symptoma autem, proritatio quam facit triplex urinæ materia in vesicam confluens. Triplicem urinæ materiam, unde proritatio est vesicæ, Hippocrates lib. 6. Epidem. sect. 5. n. 30. docet in hac sententia: *Urina tum cibo & potioni est concolor, tum qualis esse consuevit, tum ubi est humidi colliquatio.* Ac prima quidem materia est potionis præcipitis, ut vini albi Germanici calce infecti; aquæ vini; tum vini albi, cantharidibus medicati; præterea fontium Chalcantho medicatorum, atque diureticorum omnium fortiorum. Altera urinæ materia stranguriosa, est serum biliosius eorum qui sunt in venis humorum. Atque hæc stranguria non raro est critica & salutaris, de qua illud scriptum est l. 1. Epid. sect. 2. n. 76: *Utile fuit unum maximumque omnium quæ apparebant signorum, ac plurimos liberavit qui erant in maximis vitæ periculis, quibus conversio facta est ad stranguriosam urinam.* De tertia urinæ materia stranguriosa, humoris liquamine, sic legitur lib. 2. de morb. n. 1: *Crebro urina redditur cum incaluerit multum caput. Siquidem in eo liquatur pituita, quæ liquata, partim quidem ad nares, partim ad os, partim etiam per venas quæ ad pudendum tendunt, secedit. Quo cum pervenerit, tum is qui mingit, patitur quemadmodum a stranguria.* Ad symptoma etiam spectat stranguriosa prostatae glandulæ inflammatio & ulcus, unde colluvies illa foeda quæ vulgo est pissa-calida (gonorrhœa). Duret. in Coac. p. 347. In præsentē aphorismo nostro inflammatum intestinum rectum, aut uteri os, comprimendo vesicæ collum, urinam libere effluere impedit, unde stranguria. Valles. Conf. Hippocr. de fistul. n. 3. 4. Pus e renibus suppuratis in vesicam

cam delatum, acre cum sit, irritando facit stillicidium. Quod ultimo loco adfertur de singultu, id *Celsus* l. 2. c. 7. p. 62. ita expressit: *Frequens singultus, & præter consuetudinem continuus, jecur inflammatum esse, significat.* Est convulsio speciei singultus in orificio ventriculi superiori, quæ pars est nervosissima, nervos habens a pari vago, communicantes cum nervis hepaticis. Præterea hepar cum diaphragmate nequitur, quod dicto ventriculi orificio seu stomacho præbet transitum. Ergo ubi est hepar inflammatum, per consensum oritur spasmodica stomachi contractio seu irritatio, singultus. Conf. 6 aph. 13. Qui *singultus ex jecoris inflammatione, malum, uti habet 7 aph. 17.* quia notat magnitudinem causæ.

In foeminis raro fit *ex intestino recto inflammato stranguria*, quia vagina interposita facit, ut inter intestinum rectum & urethram minor sit communitas quam in viris, in quibus hæ partes juxta locatæ sunt. Dein non semper ex inflammato intestino recto ita consentit vesica vel urethra ut stranguriam faciat. Tamen propter vicinitatem harum partium, & quia ex intestino recto inflammato etiam interdum afficitur vesica vel urethra, fieri potest stranguria. Propterea non debemus semper in inflammatione intestini recti quærere aliam causam stranguriam inducentem, quamvis videatur morbus novus, quum inflammatio latius dispersa, vel vesicam vel urethram in consensum trahens, stranguriam inducere possit. Hoc boni ex hac observatione habemus, ut solummodo tentemus curare intestinum rectum inflammatum, post cujus mitigationem & curationem curabitur quoque sponte stranguria. *Pex uterum* in aphorismo  
non

non solum intelligenda videtur illa pars, quam hodie uterum vocamus, verum etiam vagina, quoniam vagina magis consentit urethræ & vesicæ, quam uterus ipse. Quando igitur in fœmina uterus aut ejus vagina ab inflammatione tentatur, eodem modo, ut statim dictum est de intestino recto in viris, stranguriam inducere potest, & curari debet. Quomodo inflammatio ab erysipelate harum partium distinguatur, supra (*aph.* 43.) traditum est; interim credibile est, erysipelas æque ac inflammationem producere posse stranguriam. *Renes*, sive ex prægressa inflammatione formaverint pus, sive corrodendo vel detritu calculi contraxerint ulcus pus fundens, quamdiu istud pus est blandum, redditur per urethram sine ulla rosione; unde sæpe in empyematicis, phthisicis, & critica evacuatione morborum acutorum redditur cum urina pus, sine ulla inducta stranguria, quoniam interna urethræ latera muco naturali obducta non afficiuntur a puris transitu. Si vero istud pus redditur acre, corruptum & ichorosum, non solum simul in transitu suo auferit mucum naturalem, verum etiam tangens nuda latera vesicæ & urethræ, irritando facit ut involuntarie contrahantur. Hinc in principio, dum fluere urina incipit, urethra se dilatare permittit, sed in transitu irritata se contrahens iterum exitum urinae & puris intercipit, qualis morbus vocatur stranguria. Quoniam non omni in casu pus ita est acre & corruptum, non semper adest stranguria. Sed si superveniat, signum est majoris acrimoniae & corruptionis in pure transeunte, quod malum est, & difficiliorem curationem arguit. Quando *hepatis inflammationi* supervenit singultus, hoc

pendere debet vel ex natura aut magnitudine inflammationis, vel ex diverso loco inflammato provenire debet. Quum vero experimur interdum in graviore hepatis inflammatione non fieri singultum, qui autem supervenit quandoque leviori inflammationi, verisimile est ex parte hepatis diversa inflammata singultum nasci: nimirum quando hepatis quædam pars inflammata diaphragmati consentit, ut ita convulsive deorsum tracto subito diaphragmate, cum simul clauditur larynx, in nobis generetur singultus. Nam statpere velle ab œsophago convulso singultum fieri, id non responderet phænomenis, quia œsophagi convulsio, elevando diaphragma, extruderet aërem, dum in singultu attrahitur aër, cujus introitus simul intercipitur. Credibile ergo, ligamenta hepatis, neſtentia hepar diaphragmati, esse inflammata, quando singultus supervenit. Facile ergo ex his colligitur, omnia spirituosa & arcana contra singultum hunc nihil valere, sed eum curandum esse, uti curantur omnes morbi inflammatorii. *Gorter.*



APHOR.

## APHOR. 59.

Γυνή ἢ μὴ λαμβάνη ἐν γαστρὶ, βέλη δὲ εἰδέναι εἰ λήψεται, περικαλύψας ἱματίοις θυμία κάτω· κὴν μὲν πρὸς τοὺς σι δοκίη ἡ ὁδμὴ διὰ τῆ σώματος εἰς τὰς ῥῖνας, καὶ εἰς τὸ στόμα; γίνωσκε ὅτι αὐτὴ ἔστι δι' ἐν αὐτῇ ἄγονός ἐστιν.

Si mulier non concipiat, scire autem expetit num conceptura sit, vestibis undique obvolutæ per inferna suffitum apponito; & si odor quidem ad nares, & os usque per corpus tibi pervadere videatur, ipsam non ex sese infœcundam esse scito.

Fallax & anile experimentum est, & non minus indignum Magno Hippocrate, quam est illud superius 5 aph. 41. Vis autem plura ejusdem farinæ? Consule lib. de steril. n. 6. de superfœt. n. 9. & 10. lib. 1. de morb. mul. n. 107. lib. 2. de morb. mul. n. 40.



## APHOR. 60.

**Η** γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἔχοντι αἱ καθάρσεις  
 πρὸς ὕμνηται, ἀδύνατον τὸ ἐμβρυον ὑγιαίνειν.

**S**i mulieri utero gerenti purgationes  
 eant, foetus ut bene valeat fieri non  
 potest.

**I**n lib. de nat. pueri n. 5. hæc leguntur; *Menses non prodeunt mulieri, quæ prægnans est, si puer sanus futurus sit, præterquam quibusdam perpissimum primo mense.* Conf. lib. 1. de morb. mul. n. 99. Hæc autem nunc videntur enunciatæ illo, quod habetur 5 aph. 51. *Quæ utero gerunt, eis os uteri connivet.*

Fœtum sanum esse non posse prodeuntibus menstruis, intelligendum est de metu futuri abortus: nam lib. 1. de morb. mul. n. 46. pronuntiatur; *si mulieri fœtum duarum aut trium mensium, aut grandæorem utero gerenti, menses confestim singulis mensibus prædant, ea ut tum extenuetur, tum debilis reddatur necesse esse; uterûs enim tunc plus æquo debiscere & fœtus incrementum dimittere; si autem uteri plus æquo debiscant, sanguinem singulis mensibus, sicut prodire consuevit, effluere, & quod in uteris continetur tenue & debile evadere; verum si diligens cura adhibeatur, tum mulierem, tum fœtum melius habere, si vero nulla adhibeatur, fœtum corrumpi.* Et ibid. n. 44. scribitur: *Si uterum gestent, & menses appareant, aut abortus fiunt, si copiosi & graveolentes fuerint, aut morbofi fœtus redduntur.*

redduntur. Equidem inter signa imminents abortus est, quando sanguis cum grumis sat larga sæpius copia cum summa debilitate, & frequentius animi deliquio, ejicitur, & tertio demum die foetus expellitur. Præcedit ut plurimum subitaneus corporis rigor & horror cum lassitudine, inappetentia, nausea, cordis palpitatione, lumborum dolore; circa pubem gravativus dolor atque in partibus genitalibus frigus: quo grandior autem & adultior est embryo, eo acerbiores spasmi, dolores ac majora symptomata non sine periculo observantur. Signa abortus futuri Hippocrates lib. 2. de morb. mul. n. 6. ita proponit: *Ruber fluxus fluit talis, qualis recenter jugulatæ victimæ fluit, & per intervalla sanguinis grumi, quandoque vero etiam fluorem rubrum ejicit, venter imus attollitur, extenuatur, inflatur, induratur, ad contactum velut ulceratus indolefcit, febris & dentium fremitus detinet, dolor est ad ipsa pudenda, pubem, lateris inanitatem, lumbos, tendinem, ventrem, pectus, & scapulas, reliquaque omnia dolent, impotentia & animi demissio detinet, & color mutatur.* Ab abortiva vero hæmorrhagia probe ille cruentus ex utero fluxus, qui multis prægnantibus foemellis citra noxam, & abortus metum contingere solet, distinguendus est. Nam sæpissime fit, ut, quæ sanguine abundant foeminæ, secundo & tertio graviditatis mense sanguineum experiantur fluxum, citra dolores & spasmos in regione lumbari & abdomine, citra debilitatem, & præcedentem horrorem & rigorem partium extremarum. Hoc autem in casu sanguis non ex uteri cavitate, sed potius ex vasculis vaginæ uterinæ cum euphoria profluit. Atque nota sunt exempla, ubi a medio gestationis tempo-



re usque ad ipsum partum sanguis ex genitalibus effluxit, salvo nihilominus & vivaci satis prodeunte foetu. Quare fallit aphorismus: Si mulier gravida sit menstrualis, non potest sanus esse foetus. *Hoffm. Med. rat. T. 4. P. 3. p. 622. Conf. Epb. N. C. Cent. 1. p. 116. Cent. 6. obs. 75. D. 3. a. 3. o. 35.* Corruunt ergo quæ ex adducto textu *lib. 1. de morb. mul. n. 40.* pro tuenda præsentis aphorismi veritate multo molimine disputat *Martianus p. 253 sq.*

## APHOR. 61.

**Η** γυναιὶ καθάρσεις μὴ πρὸνται, μήτε φρίκης, μήτε πυρετὸ ἐπιγενομένη, ἀσθενεία αὐτῇ προσπίπτωσι, λογίζεσθαι ταύτων ἐν γαστρὶ ἔχειν.

**S**i mulieri purgationes non prodeant, neque horrore, neque febre superveniente, ciborum vero fastidia ei accidant, gravidam esse existimato.

**S**igna conceptus seu imprægnationis factæ hic traduntur: at quæ non sunt perpetuæ veritatis. Judicium difficile. Nec certe adeo in genere conceptionis signa, primis potissimum mensibus, existunt, quàm vel falsa, vel fallacia, & aliis morbis communia eadem. *Epb. N. C. Cent. 1. p. 115.* Legi merentur relata in *Bresl. Samml. Suppl. 2. p. 133.* & *Hebenst. Anthropol. for. p. 16 seq.* Enim vero est status aliquis foeminarum, in quo si fuerint, sibi persuadere,

suadere, se gravidas haud esse, nequeunt, siquidem, quas uterum gerentes experiuntur mutationes, easdem sibi quoque evenisse, sensu aliquo interno, qualis pręgnantibus esse solet, percipiunt; non enim tantum uteri molem sibi succrescere sentiunt, sed & lactis aliquando speciem in mammis alunt, etiam si ea ætate fuerint, qua, foetus concipi, frequens adeo haud est. Attamen maxima graviditatis similitudo illis est, quæ corpus peregrinum, haud animatum, quod mola dicitur, utero gerunt, quando, mox hydatidas, vesiculas scilicet limpida aqua turgidas, easque plurimas, circa ovaria inque uteri cavo gerunt, mox materiem aliquam folliculo inclusam, atheromatis, steatomatis, aut meliceridis specie, ventre alunt, mox aquas utero collectas, quo ille vehementer distenditur, circumferunt. Hi quidem matricum tumores, cum morbus sint, & symptomata, qualia hydropicis esse solent, secum adferant, inducere nullam poterunt, ut credat, se gravidam esse, nec aliis, hac sua specie, facile imponet foemina, nam vitalem hanc uteri plenitudinem haud esse, signa declarant, quæ describuntur ab Hippocrate *de nat. mul. n. 2*: *Si hydrops in uteris oboriatur, menses pauciores & deteriores contingunt, deinde derepente deficiunt, venter intumescit, mammae siccæ evadunt, & in reliquis male habet, sibi que utero gestare videtur: & alibi: uterus plenus instar gravidæ, nihil autem movetur in utero, nec lac in mammis generatur.* Sed vero est quædam molæ species, quæ carne fungosa, mox uterum replente, mox ejus substantiam vehementer distendente, consistit, & graviditatis imaginem inprimis exhibet, quandoquidem illi intercurrent motus spastici, foetus in  
utero

utero conversionem imitantes. Ac, ne quid desit naturæ ludibrio, lac etiam in mammis gignitur. Quin & lac sibi generare didicerunt vaferrimæ mulieres, dum frequente suctu naturam irritant, & sanguinem sibi in mammas convocant; sunt etiam, quæ, urticarum usu mollique frictione, prurientes mammas ad lactis officium invitant. Vid. *Hebenstr.* l. c. p. 185.

## APHOR. 62.

**Ο**κόσαι ψυχρὰς καὶ πυκνὰς τὰς μήτρας ἔχουσιν, ἢ κυίσκῃσι, καὶ ὀκόσαι καθύγχευς ἔχουσι τὰς μήτρας, ἢ κυίσκῃσιν, ἀποσβέννυται γὰρ αὐταῖς ὁ γόνιμος. καὶ ὀκόσαι ξηρὰς μᾶλλον καὶ περικαῖς, ἐνδείη γὰρ τῆς τροφῆς φθείρεται τὸ σπέρμα. ὀκόσαι δὲ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν κρᾶσιν ἔχουσι σύμμετρον, αἱ πιαῦται ἐπίτεκνοι γίγνονται.

**Q**uæ frigidos, & densos habent uteros, non concipiunt, neque quæ præhumidos habent, siquidem in ipsis genitura extinguitur: & quæ plus æquo siccos, & adurentes, alimenti namque inopia semen corrumpitur. At quæ ex utrisque moderatam nactæ sunt temperiem, eæ foecundæ evadunt.

**S**edes hujus aphorismi esse videtur in lib. i. de morb. mul. n. 33. Concipit autem neque ea quæ humiditate redundat, neque quæ resiccata est, nisi horum aliquid ex prisca natura insit.

Steri-

Sterilitatis foeminarum causæ traduntur, quas omnes fere precarias, & fabulas pronunciat *Lifter*. Ad tres illæ uteri intemperantias reducuntur. Nam uterus vel frigidior est, quam par sit, vel humidior, vel denique cum caloris excessu siccior. Hujusmodi vero intemperantiæ non simpliciter accipiendæ sunt, sed totius corporis respectu. Quandoquidem plures mulieres concipere observantur, quarum uterus longe intemperantior erat, quam alterius cujusdam, quæ sterilis ob eandem intemperantiam fuerit; e. g. sit mulier toto temperamento biliosa, cujus singulæ partes totius temperamento respondeant; altera vero naturali totius temperamento frigida sit, uterum vero cæteris paribus calidiorem habeat. Harum quidem prior concipiet, quia ejus uterus a totius temperie non recedit. Posterior vero nequaquam, ob calidam uteri temperiem totius respectu consideratam. Et tamen quæ concipiet, calidiorem habebit uterum, quam quæ sterilis supponitur. In hunc igitur sensum præsens sententia recipienda est, alioqui in regionibus, & in temperaturis a mediocritate recedentibus mulieres pro majori parte steriles essent. *Martian. p. 462.* In uteri densi, frigidi & humidi, causam sterilitatis constituentis explicatione, non ad tardiores modo succorum motum, viscosæ & serosæ abundantiam materiæ, atque ab his proveniens frigus, sed ad elasticæ etiam defectum virtutis & fibrarum vasorumque uterinorum atoniam respiciendum, quæ efficiunt, ut liquor maris genitalis in ar-  
vum muliebrem projectus, tenacis copia pituitæ obrutus nihil præstare queat partim, partim ex utero nimis laxo & flaccido denuo quasi per lubricum

lubricum profundatur, aut etiam, si uteri orificium nimia pinguedine aut mucro oblitum est, ne admittatur quidem. Vicissim etiam a nimia uteri siccitate, nimioque calore, e succi nutritii defectu, propter salis acris sero minus temperati prædominium, adeoque a majore, quam decet, fibrarum uteri vi elastica, altera sterilitatis causa. *Sientzel de Ven. l. 3. §. 18.* Quando vero laudatur uteri temperatus & moderatus status, eo nihil aliud, quam tonus & robur ejus æquabile, moderatum, & ad liberum sanguinis circulum aptissimum intelligitur. *Hoffm. Med. rat. T. 4. P. 3. p. 632.* Si non conceperit, sed postero aut tertio die quæ viri sunt nimio humore diffuentia foras prodeant, uteros humidiores esse constat. *Hippocr. lib. 1. de morb. mul. n. 26.* Si vero humidius uterorum os fuerit, attrahere genituram non possunt. *ibid. n. 34.* At mulieres quænam magis aut minus uterum gestare sint idoneæ, hunc in modum æstimare licet, imprimis quidem in formas intuenso. Parvæ namque grandioribus ad conceptum præstant, tenues crassis, candidæ rubris, nigræ liventibus. Præstant item quibus venæ exstant, iis quibus minime apparent. Quin etiam grandiori natu exuberans carnis moles, malo est: mammæ autem turgidæ & magnæ probantur. Atque ista quidem visui sunt exposita. At sciscitari oportet, num menstrua singulis mensibus appareant, & num satis idonea copia, & an boni sint coloris, æquali copia in singulis temporibus, & ratis mensium diebus effluant, quod quidem optimum est. Locus vero conceptui idoneus, quem sane uterum nominamus, sanus esse, & siccus, & mollis debet, ac neque contractus, neque proclivis, neque ore distorto

to aut compresso, aut diducto. Etenim quicquid horum contigerit, conceptum fieri impedit. *lib. 2. Prædiæ, n. 33.*

## APHOR. 63.

**Π**αραπλησίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρρένων. ὁ γὰρ δι' ἀραιότητα τοῦ σώματος τὸ πνεῦμα ἐξω φέρεται, πρὸς τὸ μὴ παρασπύμπειν τὸ σπέρμα· ἢ διὰ τὴν πυκνότητα τοῦ υγροῦ καὶ διαχωρεῖται ἐξω· ἢ διὰ τὴν ψυχρότητα ἐκ ἐκπυρρᾶται, ὥστε ἀθροίζεσθαι πρὸς τὴν πόσιν τῆτον· ἢ διὰ τὴν θερμασίαν τὸ αὐτὸ τῆτο γίνεται.

**E**adem verò ratio est in maribus. Aut enim propter corporis raritatem spiritus foras dissipatur, ita ut ne semen transmittatur, aut propter densitatem humor foras non excernitur: aut ob frigiditatem non accenditur, ut ad eum locum cogatur: aut ob caliditatem hoc idem contingit.

**C**ausæ sterilitatis in viris exponuntur; de quibus idem sentit *Lister*, quod de illis in præcedente *aph. 62.* Galenus præsentem sententiam rejicit pluribus capitulis, variisque rationibus contra eam adductis: quibus non obstantibus, sententiam verissimam, Hippocrate dignam censeo, si recto sensu accipiat, qui talis est. Sterilitatis mulierum causas ad tres in præcedenti aphorismo reducere ad frigi-

frigiditatem uteri, ob quam densior effectus  
 non concipitur; secundo ad humiditatem genit-  
 turam suffocantem, & tertio denique ad siccita-  
 tem urentem, genituramque corrumpentem.  
 In hoc autem aphorismo easdem repetit cau-  
 sas tanquam sterilitatem virorum producentes,  
 non tamen eodem modo, verum, ut indica-  
 ret easdem causas concurrere, dixit, *similiter  
 autem in maribus*. Quia tamen modus, & ratio  
 diversa est, eas subsequenter explicat; & certe  
 si causas sterilitatis virorum diligenter conside-  
 raverimus, inveniemus omnes ad tria capita  
 reduci. Eorum enim alii erigunt quidem,  
 verum coire volentes, spiritus erectionem fa-  
 cientes statim evanescent, subsidentque & con-  
 cidit penis, ideoque semen in uterum ejacula-  
 ri non possunt, quod si aliqui emittunt in fo-  
 ribus pudendi muliebris illud perdunt; & de  
 his intellexit Hippocrates dum dixit, *aut propter  
 corporis raritatem spiritus foras dissipatur, ita ut ne  
 semen transmittat*. Namque rationi consentaneum est,  
 taliter affectos ob caliditatem, &  
 siccitatem temperamenti, & potissimum genita-  
 lium, unde spiritus tenuiores generantur, quam  
 par sit, steriles esse. Hi respondent mulieri-  
 bus, quas ob siccos, & exustos uteros non  
 concipere, sed genituram corrumpere dixerat  
 in præcedenti. Alii secundo loco sunt, qui  
 & erigunt, & coeunt quidem, verum nunquam  
 semen effundunt; & hos significavit Hippocra-  
 tes dum dixit, *aut propter densitatem humor foras  
 non excernitur*. Tales sunt, qui frigido, & sic-  
 co sunt temperamento: in quo cum spiritus sint  
 frigidiore, non ita incalescunt, ut semen de-  
 ducere, & impellere possint, Hippocrates cau-  
 sam reduxit in habitus densitatem, eo quod  
 -igitur  
 genituram

genituram a toto corpore succedere existimavit. Verum utcumque sit, certum est, primariam causam esse frigiditatem, & siccitatem temperamenti totius corporis, & potissimum testium, aliarumque partium generationi inservientium: respondetque sterilitatis mulierum causæ, de qua in præcedenti dixerat: *que frigidos, & densos habent uteros, non concipiunt.* Tertio denique loco sunt quidam, qui nec erigere, nec coïre possunt, quos vulgus *ligatos* vocat: quandoquidem impotentiam a frigidityte humiditati adjuncta provenire rationabile est: hosque intellexit Hippocrates dum dixit, *aut ob frigiditatem non concalescit, ut ad hunc locum congregetur*; nam cum opinio esset Hippocrati, semen, sive genituram in actu coïtus a toto corpore excerni, dixit frigiditatem esse causam, cur semen ad genitalia, unà cum spirituum convenienti copia (ex his enim genitura constat) non congregetur. Nam taliter affecti, non solum non erigunt, sed neque titillationem illam percipiunt, quam spirituum facit affluxus, quod si horum nonnulli aliquando semen emittunt, id sine erectione efficiunt, & absque spirituum concursu, ut genituræ nomen non mereatur, sed inutilis excrementi, ex quo adnotare est, summo artificio dixisse Hippocratem, *non congregatur*, quasi illud, quod modo dicto excernitur, non sit semen a toto ad pudenda congregatum, quale debet esse vera genitura. Subjungit inde: *aut ob caliditatem hoc idem contingit*, eo quod cognovit multos calido, & humido temperamento præditos, nec erigere, nec coïre posse, quod experientia ipsa sæpius nobis significavit. *Martian. p. 462.* Itaque alii sunt qui non erigunt; alii, qui erigunt.

Vol. II. K gunt



guant quidem, sed non perdurant; aliqui perdurant aliquamdiu, sed semen emittere non possunt. *Mercur. Med. Pract. l. 3. c. 39.*

Quando sine voluptatis sensu, vel saltem cum sensu paucio, solitoque celerius semen destillat; affecta tantum nec dum perfecta erectio-  
ne; unde præceps & involuntaria resolutio; malum hoc videtur oriri a nimia ductuum emissariorum amplitudine, per quæ semen e conceptaculis exprimitur facilius promptiusque, atque adeo ante quam omnia ad opus comparata sint. Solet gonorrhœis diuturnis succedere, si morbi naturâ aut ægrotorum negligentia, contumaciores fuerint. Tentetur usus remedium omnium, cum internorum, tum externorum, quæ adversus gonorrhœas valent. Sed ne qua noxa possit inferri, a blandioribus fiat progressus ad fortiora, & hæc caute & interjecto spatio repetantur. Quando arrigitur quidem penis, nec invalide, sed nullum, vel paucum & serosum semen emittitur; vitium tunc pendere videtur ab omnimoda constipatione ductuum emissariorum, quibus vesiculæ seminarie & prostatae cum urethra communicant, ideoque præposterum nimiumque usum injectionum fortius adstringentium sequi, quo nonnulli ad gonorrhœæ curationem abuti solent. Nullam curationem videtur admittere. Quando penis flaccidus & victus jacet, neque potest arte ulla exfuscitari; malum est, quod multa variaque vitia supponit latentia: 1. vel in ipsis seminis conceptaculis, ubi potissimum viget rei Venereæ sensus, nempe in prostaticis vesiculisque seminariis, ut si callis induruerint, aut fungosis carnibus oppleantur, ex quo efficiatur, ut a collecto semine nullatenus, aut segnius titillentur:

tur: 2. vel in musculis erectoribus, aut acceleratoribus, quorum ministerio virga rigescit & tenditur, ut si laxi & inertes ad erectionis negotium sint: quibus singulis noxis haud rarum est feminis conceptacula, musculosque erectioni famulantes, a causa Venerea patere. Hoc malum nullam videtur curationem admittere, præsertim si contra hydrargyrosin jam tenax fuerit. Tententur remedia, quæ ad callos resolvendos efficacia sunt. Imo supra perinæum fiant aquarum thermalium embrochæ, quæ adversus musculorum erectorum & acceleratorum inertiam remedio esse possunt. *Astruc morb. Vener. p. 514.*

Præter recensitas jamjam ex morbis Venereis propullulantes impotentia virilis causas, sunt multæ aliæ, quæ videri possunt in *Fritsch. Gesch. P. 1. p. 354 sqv.* Adde impotentiam ex frigore, pene paralytico facta, annotatam in *Eph. N. C. D. 1. a. 3. o. 41.* & ab inopinato terrore, in *Select. Med. Francof. T. 1. p. 119.* Ut plurimum impotentia Veneris pendet ab impotentia, & debilitate imaginationis, quacunque id de causa succedat, metu, pudore, iudicii defectu, nimia applicatione ad studia, aut ad negotia, & nativa stoliditate mentis, & reliquis id generis. Et qui forti imaginatione præditi sunt, uti sunt, qui in arte sua supra cæteros excellunt, & præstant, ut plurimum luxuriosi, & ad Venerem potentes observantur; eadem enim spirituum vis, & iudicium acre reddit, & Venerem potentior; nisi tamen vis corporis studio, & applicatione frangatur, quo in casu iudicium acre cum Veneris jungitur impotentia. *Bagliv. p. 95.*

Consentaneum est, ut adhuc aliquid adferam

de *ligatis* paulo ante apud Martianum vulgo dictis, qui aliis *maleficiati* audiunt, & apud *Tibullum* l. 1. eleg. 5. *devoti* vocantur. Significantur impotentes ad coitum per maleficium, per veneficia vel incantamenta. Veneficii seu incantationis hoc genus, *ligatura* appellatur, item *nodatio*, *ligatio ligulæ*, *maleficium ligaminis*. Distinguitur *ligatura*, 1. in temporariam, & perpetuam; 2. in universalem, & respectivam, quarum illa notat impotentiam coeundi cum quacunque foemina, hujus autem efficacia se exerit tantum respectu certæ alicujus foeminæ. Maleficium factum arguitur, ubi homo juvenis, vegetus, & cætera sanus, nullum vitium corporeum præferens quod obstaculo esse queat coitui, paratus ad exercitium Veneris, hoc perficere nequit, sed membrum virile antea validum & rigidum, dum ad actum progredi parat,

- - - - - non magis movetur  
*Quam lentæ jalices, lassove papavera collo.*

Artes ad *ligaturam* patranda sunt variae; easque non nuper natas esse patet ex Virgīlii ecloga 8. quæ elumbem hanc artem sic docet:

*Necte tribus nodis ternos, Amarylli, colores.*

*Necte, Amarylli, modo: Et, Veneris, dic, vincula necto.*

Quæcunque autem apud auctores memorata reperiuntur *ligaturas* inducendi artificia, v. g. per seram clausam, *ligulam* constrictam, cultum parieti infixum, &c. non produnt aliquid cui nexus tribui possit causalis cum corpore ejus, cujus virilitas enervari debet. Hinc effectus

effectus maleficii adscribitur soli imaginationi, seriæque intentioni ac impressioni incantatoris, putaturque posse animam humanam per fortem imaginationem, non solum in proprium, sed etiam in aliud, externum, corpus agere. Sunt etiam, qui, imaginationem extra corpus proprium tanta agere non posse perspicientes, cacadæmonem socium ei addunt, cujus ope ajunt fieri, permittente Deo, maleficium liganis. Ad quod declinandum inhibendumve, & jam factum tollendum, jactata auxilia, non minus vana, ridicula & superstitiosa sunt, quam illa, ut vidimus, quibus inducitur; v. g. mictio per anulum sponsionis, vel per ansam lapidis sepulchralis, &c. Tempore in multis, in aliis usu congruorum medicamentorum naturæ ignavæ excitandæ accommodatorum, in quibusdam pulso pudore, emendata propria imaginatione, ligaturam incantamento, si diis placet, inductam, sublatam fuisse, docent historiæ. Vid. *Fritsch. l. c. p. 205 sq. Lang. lib. 2. epist. 9. Kämpf. Amæn. 656 sq.* Apertum esse videtur, quod, qui referunt id genus nænias, eo ipso illas refutare censeantur possint. Ubi nulla causa apparet, vel in suspicionem venit, physica corpori ipsi vel partibus genitalibus inhærens, tuto posse, arbitror, recurri ad mentem ipsius patientis, præconceptum metum, odium &c. vel ad deficientem imaginationis vigorem, ex sententia Baglivi superius adducta.

Observavit Hippocrates, uti & hodie observatur, quod viri interdum ex matrimonio non accipiant liberos, in quibus viris vel fœminis nullum apparet vitium sterilitatis, fœmina tamen illa in secundis nuptiis invenitur prolifera. Propterea judicavit vitium sterilitatis

in semine virili latitare, quod quadam intemperie laborat. Galenus acriter hic insurgit credens hunc aphorismum esse spurium & Hippocrate indignum, quasi ex intemperie non potuisset in masculis fieri sterilitas. Ego vero puto hanc causam æque valere inferre sterilitatem masculis quam foeminis. Uterus enim non est organum ova foeminea formans, sed ea generantur in ovario, ex humore suis vasis allato, per actionem specialem: sine ovis his maturis & bene formatis nullus fit conceptus in utero, etiamsi uteri cavitas semine virili optimo esset plena. Itidem in viris per actionem testium ex allato humore præparatur semen prolificum: si vero illa actio testium vel sit debilior vel aliena, conficitur quidem in testibus liquor & ducitur ad vesiculas seminales, sed quia non continet illa animalcula viventia, quæ in semine bono deteguntur microscopiis, ille liquor seminalis, ad ovula foeminarum applicatus, ovulum imprægnare nequit. Non enim sufficit, ut ovum maturum foemineum in utero irroretur liquore quodam ex viro proveniente, ut imprægnetur, sed requiritur semen maturum his viventibus animalculis præditum. Quia vero per intemperiem ita mutari potest actio, quæ facit ovula in ovario, ut nullum inde perfectum & maturum ovulum prodeat, nulla videtur restare ratio, cur non æque in viris per intemperiem prædominantem potuisset produci liquor seminalis generationi ineptus. Imo verisimile videtur, hanc causam frequentissimam esse causam sterilitatis in viris. Sed quoniam in foeminis hæc causæ non solum inferunt sterilitatem ex imperfectis natis ovis, verum etiam si uteri quoque corpus eadem

eadem laborat, ratione incrementi foetus, verisimile videtur hanc intemperiem frequentius in foeminis quam viris inducere sterilitatem. Gortier.

## APHOR. 64.

**Γ**άλα διδόναι κεφαλαλγίαις, κακόν. κακὸν δὲ καὶ πυρεταίναις, καὶ οἷσιν ὑποχόνδρια μετέναι διασπασίζοντα, καὶ πῖπ διψώδεσι. κακὸν δὲ καὶ οἷσι χολώδεσι αἱ ὑπχωρήσεις, καὶ ἐν πῖσιν ὄξείσι πυρεπῖσιν ἐᾶσι, καὶ οἷσιν αἵματος πολλῇ διαχώρησις γέγονεν. ἀρμόζει δὲ ταῖσι φθινύδεσι, μὴ λίαν πολλῷ πυρετοῖσι διδόναι γάλα, καὶ ἐν πυρετοῖσι μακρῶσι, καὶ βληχεῶσι, μηδὲν δὲ τῶν προειρημένων σημείων περιέειν. παρὰ λόγον δὲ ἐκτετηκόσι.

**L**ac exhibere capite dolentibus, malum. Malum item & febricitantibus, & quibus præcordia sublata murmurant, & siticulosus. Malum quoque & quibus biliosæ sunt dejectiones, quique febribus acutis laborant, & quibus copiosa sanguinis dejectio facta est. At tabidis lac dare convenit, non valde admodum febricitantibus, & in febribus longis, & languidis, dum nullum ex supra commemoratis signis adfuerit; & præter rationem extenuatis.

**A**pyd Celsum l. 3. c. 22. p. 170. aphorismus hic ita legitur: *Lac, quod in capitis dolentibus, & in acutis febribus, & per eas facta nimis* sui,

*sci, ac, sive præcordia tument, sive biliosa urina est, sive sanguis fluxit, pro veneno est; in phthisi tamen, sicut in omnibus longis difficilibusque febriculis, recte dari potest.*

Lactis usus apud Antiquos frequentissimus fuit. Sæpe enim ad leviter purgandum: non raro ad abluendum, & attemperandum post purgationem, sæpissime ad humorum acrimoniam corrigendam: & denique ad crassesciendum seu nutriendum lacte utebantur, & sicuti ad purgationem omnium tenuissimum eligebatur, quale est asininum, & in satis notabili quantitate exhiberi consuetum fuit; ita ad crassesciendum, crassius præferebatur. His enim intentionibus potissimum lac ab Hippocrate usurpatum fuisse in illius doctrina colligere licet; idque ipsemet confirmavit *lib. 2. de morb. mul. n. 14.* ubi hæc habet: *optimum est hoc, nam & purgatur, & nutritur, & fluxus obtunditur ab hujusmodi lacte (nempe bubulo).* Et quia illud copiosum dare aliquando opus erat, ne merum potatum læderet, (ut homini illi contigisse narratur, cujus historia *lib. 4. Epidem. n. 23.* registrata est) variis admixtis illud temperabant. Quod Hippocratem quoque fecisse legimus ubique, modo ut lactis facultates augerentur, modo, ut corrigerentur; namque sæpe mulsam, aliquando muriam addidit, ut abstersoriam illius facultatem augetet; non semel vinum, ne ventriculum laxando læderet, aut humectando nimis intentæ exsiccationi non reluctaret; sæpissime aquam, ut febrienti convenire posset, & refrigerandi, vel humectandi virtus major esset. Utebantur autem & bubulo, & ovillo, & caprillo, pro rei exigentia. Hac tamen distinctione, ut, cum intentio erat pur-

purgandi, aut subluendi alvum, in maxima quantitate exhiberetur; nam aliquando ad congi mensuram dedit Hippocrates, in aliis vero casibus raro duas cotylas excessit, ut in ventriculo detineri, & concoqui posset. Ac ad purgandum quidem, & ad subluendum, fero lactis frequenter inprimis uti consuevit Hippocrates; nunquam tamen illud in febre ardente usurpavit, etiamsi omnibus intentionibus satisfacere posse videatur, quæ in hujus morbi curatione occurrunt, ita ut Galenus hoc lacti præferendum pro febris ardentis curatione existimaverit. Sed sciendum est, Hippocratem non consuevisse in febribus ardentibus medicamento purgante uti admodum frequenter. Nam cum purgatio non conveniat (ut ipsemet testatur *lib. 3. de morb. n. 3.*) quando jam febris ardentis signa in lingua apparent, quæ sunt ejusdem siccitas, & ariditas, ante harum apparitionem febris essentia nondum aperta est, & si tandem cognoscitur, eo tempore ad eum fervorem non pervenit, ut pro purgatione serum, aut lac dari debeat in ea quantitate, quæ intentioni satisfaciatur, cum factius sit eo tempore medicamentum dare, quod humorem peccantem promptius purgare possit. Hac igitur ratione pro curatione ardentis febris, nec fero, nec lacte quidem purgavit Hippocrates, nisi ubi supposuit ichores biliosos in ventrem decumbentes peccare, uti in *lib. de vict. acut. n. 34.* ubi lac asininum subducendi gratia probat; nam eo casu nullum videtur excogitari posse remedium convenientius asinino lacte, hoc enim purganti facultate humores dictos ad motum jam concitados facillime educere potest, universumque corpus æstuans re-



frigerare, & succos omnes mitigare, & attemperare; & quoniam expedit post purgationem, alvum laxatam firmiorem permanere, lac præcoquendum jubet, quod in omnibus fluxionum generibus Hippocrati usitatum fuit. Nec ex lacte læsionem ullam propter febrem timet, quia, cum ratione copię cito descendat, putredinem a febrili calore contrahere non potest, quæ ægrotanti noxam inferat. Quia igitur in hoc casu humores ventrem obsident, & ad motum sunt dispositi, clystere subducere eos tentandum est prius, cui si non cedant, ad purgationem ex lacte confugiendum est. Lac autem potius, quam serum lactis præbet: 1º. quia serum fortasse haud ita biliosos humores educit, quemadmodum pituitosos, nam etiam si sero potissimum ad abluendum, & contemperandum utatur Hippocrates, in pituitosis tamen morbis longe frequentius eo usus est, quam in biliosis, quamvis id novum quam plurimis futurum sit; qui tamen si loca percurrant, in quibus de sero lactis exhibendo sit mentio, id verissimum esse invenient. Imo idem Hippocrates *lib. 1. de morb. mul. n. 45.* inter medicamenta pituitam subducentia serum lactis adnumeravit. 2º. Quia, cum serum admodum familiare sit humori peccanti, quem ichorem biliosum vocat Hippocrates, timet ne assumptum serum in eum convertatur; hac enim ratione succorum cognationes considerandas esse admonet *lib. de Vet. Med. n. 42.* ut cavere possimus non ea tantum, quæ ex propria natura nobis sunt incommoda, sed etiam quæ talia sunt ob cognationem, propter quam in cognatum succum facile transmutantur. Ne igitur serum ob cognationem, quam habet cum humore peccante,

cante, in eum forte transmutaretur, in ipsius morbi augmentum, & ægrotantis perniciem, fero dimisso lac ipse præbet. 3º. Fortè etiam serum non proponitur in hoc casu, quia supponitur esse tempus, in quo serum majorem habet acrimoniam, quam conveniat. Certum est enim, non in omni tempore serum dare antiquos consuevisse. Nam Hippocrates de eo exhibendo nunquam verba fecit, quin conditionem apposuerit, quæ peculiare aliquod, & idoneum tempus respiciat, *libro enim 2. de morb. n. 13. de curatione ulcerum capitis tractans ait, si vero tempus anni ferat, etiam serum postea bibat, sin minus, lac asininum.* Sed & *lib. 1. de morb. mul. n. 88. pariter, nec non lib. 2. n. 11. aliisque quamplurimis locis, eandem conditionem apposuit, etsi diversis vocibus, cum aliquando dicere solitus sit, si adsit anni tempus, aliquando pro tempore, & similibus, quæ idem important.* Verum non Hippocrates modo in eo exhibendo certum anni tempus consideravit, sed etiam Medici Gnidii, quos de fero, & lacte pro tempore exhibendo scriptis tradidisse adnotavit Hippocrates in principio libri *de vict. acut.* Quamvis re vera nulli ab Hippocrate definitum sit, quo tempore dari expediret, & quo ab eo abstinere, adeo cunctis id perspicuum erat, cavisse autem tempus æstivum ob assignatam rationem probabili conjectura ex Hippocrate elici potest. Nam de vere non potest dubitari, quin eo tempore conveniat, cum serum eo tempore sit optimum; unde curationem tabis dorsalis, quam fero, ac asinino lacte absolvit Hippocrates, in vere aggrediendam optabat *lib. 2. de morb. n. 49. neque pariter de autumno, cum lib. 7. Epidem.*

*Epidem. n. 3.* serum circa autumnale æquinoctium Erotolai filio datum memoretur: cur vero in hyeme dari non debeat, nulla ratio persuadere potest, imo quia illud exhibere in morbis consuevit Hippocrates, in quibus pituita prævalet, quæ in hieme viget plurimum, hoc tempus pro sero exhibendo aptissimum erit, cum enim ejus usus probatur in utero gerentibus, quæ ob pituitæ copiam periclitantur, *lib. 1. de morb. mul. n. 45.* cui in morbo pituitoso ab eo vocato *lib. 2. de morb. n. 68.* nec non in morbo crasso, *lib. de intern. affect. n. 51.* aliisque morbis a pituita, qui hyeme potissimum vigent, si eo tempore suspectum esset? Quare tempus æstivum solum erit, in quo sero non utebantur antiqui: unde non erit mirum, si pro dictâ febre ardente curanda, quam æstate fieri ait Hippocrates, serum non proposuerit, sed lac asininum ejus succedaneum, quippe quod omnia subterfugiat incommoda, quæ in sero adnotavimus. Neque serum præscribit Hippocrates *lib. de steril. n. 22.* febrienti & dolenti ex puerperio, sed lac cum tertia mulsæ parte exhibet, ut eo mediante, & purgationis acrimonia ex corruptione contracta, quæ mulierem dolore vexet, attemperetur, & simul alvus adstricta emolliatur. Eligit autem caprillum, quod in substantia mediocritatem inter tenuitatem, & crassitudinem tenet. Nam asininum, alloqui febrienti minus noxium, fortasse timuit, quippe quod alvum vehementius movere posset, quam in puerperis conveniat, quæ suspitione permotus illud decoquendum jubet, ita enim immodicæ evacuationis omnis suspicio tollitur. Pinguedinem vero detrahit, tum quia hæc pariter ad alvi fluxum disponere posset,

set, tum maxime, ut feбри minus officiat, cujus gratia illud frigidum actu præbet, & tertiam mulsæ partem ei admiscet; quantitas vero, quam præscribit duarum heminarum, animadvertenda est, quæ pro ducenda alvo minima est, cujus gratia ad semicongii mensuram illud exhibere consuevit; maxima tamen propter mulsæ permixtionem, si nutritionis gratia exhibeatur, quo consilio nunquam duas heminas in totum excedere consuevit. Quare dicendum est, in præsentī casu lac dari, nec nutritionis gratia simpliciter; nec sola intentione purgandi: quod etiam ex eo confirmatur, quia, si pro nutritione tantum illud exhiberet, longiori tempore ejus usum perscripsisset, etsi in gratiam purgationis, unica vice contentus fuisset, nec subjunxisset, *si neque venter subeat*, sed ut eodem tempore alvus mediocriter laxetur, humorumque acrimonia corrigatur. Neque vero purgationem aut ex lacte asinino, aut ferro convenire docet Hippocrates lib. 2. de morb. mul. n. 17. ubi de purgandis, quæ uteri patiuntur strangulationem, tractat; quodocunque patientes natura sunt lienosæ, aut exsanguæ, aut doloribus, aut aurium tinnitibus vexantur; quo in loco & pluribus aliis lienosas natura ab hujusmodi purgatione rejicit, eas intelligens, quæ ab ineunte ætate lienis tumoribus sunt subjectæ, ita ut facile iis lien intumescat magis. Hujus vero ea est ratio, quia, cum lac, & ferum ad purgandum in magna copia assumi debeat, ab his lien naturali constitutione debilis existens facile intumescit: quod tamen periculum non incurrunt illi, quibus lien alioqui robustus aliqua occasione intumescit. Et ideo non sunt reprehendendi Medici antiquiores, si ali-

aliquando lienis tumores purgatione ex sero,  
 & lacte curare tentarunt, ut videre est apud  
 Hippocratem *lib. de intern. affect. n. 28. & 29.*  
 & 56. ubi de lienosis tractatur. Exsanguibus  
 vero, & pallidis alia ratione lactis, & feri pur-  
 gationem prohibet, quia scilicet calor in his  
 exiguus existens a copiosa potione obrueretur.  
 Eundem feri, & lactis usum prohibet iis, qui-  
 bus aures sonant, quia, cum hoc symptoma  
 capitis repletionem ex imbecillitate arguat, in-  
 fernum ventrem tanto humore perfundere,  
 non est tutum: quando caput inde nimis reple-  
 ri posset. Quando vero in aphorismo præsen-  
 ti ait Hippocrates, *lac dare caput dolentibus, ma-  
 lum*, &c. de eo non intelligit, quod purgatio-  
 nis gratia in notabili quantitate exhibetur; id  
 namque proprie loquendo non est *lac dare*, sed  
 potius *lacte purgare*, & hic dicendi modus Hip-  
 pocrati usitatus fuit, ut in ejus doctrina mani-  
 feste apparet. Nec lac hoc modo exhibitum  
 ea incommoda adfert, quæ lacti alio modo ex-  
 hibito imputantur, & ratio est, quia non diu mo-  
 ratur in ventriculo, ut in caput vapores di-  
 mittere, & flatus inducere valeat, & quia co-  
 piosum assumitur, corruptionis periculo non  
 subicitur (ab his enim lactis noxæ pendent).  
 Hocque fuisse Hippocratis consilium, ex ipsius-  
 met doctrina demonstrari potest, quando lacte  
 asinino, aut caprillo diluto ad purgandum utitur  
 in omnibus casibus, in quibus a præsentia apho-  
 rismo prohibetur; eo enim in capitis ulceribus  
 utitur *lib. 2. de morb. n. 13.* & in comitialibus  
*lib. de vict. acut. n. 38.* nec non in comitialibus  
 eodem in loco, in quibus cum caput afficiatur,  
 inconueniens esset, quatenus lac dare caput  
 dolentibus, prohibetur. Præterea in febribus  
 lacte

lacte asinino purgationem instituit sapissime. Nam & in quotidiana ex bile, & in febre interficiente appellata *lib. 2. de morb. n. 36. & 65.* eo utitur, & in febre ardente *lib. de vict. acut. n. 34.* lacte asinino purgandum esse corpus jubet. Taceo alios morbos, quæ febrem acutam conjunctam habent, in quibus eodem lacte purgari jubet, v. g. in erysipelate *lib. 2. de morbis n. 53.* & alia quam plurima, quæ singula referre nimis tædiosum esset. Quare & in secundum casum peccasset, quæ *lac dare febrientibus* prohibet. Similiter contra tertium errasset, quod malum esse *lac dare* inquit iis, quibus *elevata murmurant hypochondria*, quando & in hepaticis, & lienosis etiam ad hydropem tendentibus, asinum lac ad purgandum præbet, *lib. de intern. affect. n. 26. & 28.* Ulterius lac improbat iis, quibus *larga sanguinis evacuatio facta est*, & tamen *lib. de vict. acut. n. 66.* lacte asinino eos purgandos esse jubet, quibus sanguinis copia effluxit. Cum igitur lacte purgationis gratia utatur Hippocrates in omnibus casibus, in quibus per præsentem aphorismum damnatur, asserendum est, *lac dare*, non significare purgatorium, sed quod refectionis, aut alterationis gratia exhibetur: quod ex eo confirmatur, quia referens casus, in quibus utiliter exhibetur, eos tantum meminit, qui refectione egent, tabidos inquam, a febribus longis vexatos, & præter rationem extenuatos; quos lacte purgare nullo modo licet, aut saltem raro. Vid. *Martium. p. 463. 338. 383. 298. 287.*

Lustrandi sunt singuli memorati in aphorismo casus.

*Lac exhibere capite dolentibus, malum.* Cephalalgia intelligenda venit præsertim a repletione, seu sanguinea; in qua lac nocet, quia virtute nutritiva

nutritiva sanguinis quantitatem auget. Tum vero infestum etiam est lac capite dolentibus ex vicio ventriculi, dum cruditates acres, acidæ, biliosæ, in ventriculo latitantes irritant fibrillas nervosas, quæ per consensum afficiunt meninges cerebri. Quia itaque lac ingestum ab hærentibus in ventriculo inficitur, ut acefcat, vel rancescat biliosumve evadat; patet, quod, acrimonia aucta, causa mali incrementum sumat. Augetur etiam a lactis usu cephalalgia Venerea, quia Venereum miasma corrumpit ingestum lac, unde, crescente acrimonia, augetur causa cephalagiæ. In quacunque alia denique cephalalgia, a laudabili sanguinis atque lymphæ defectu, v. g. ex vigiliis nimis, morbis diuturnis, laboribus gravioribus & hæmorrhagiis copiosioribus originem ducente, lac nocet, tum quia sufficientes desunt vires ad subigendum tempestive lac, (quare hærens in primis viis corruptionem subit) tum quia sæpe peccans acrimonia in humoribus lac inficit suo vicio, unde ab irritatis nervis malum. Quid? quod ab lacte acido, corrupto, corrosivo reddito, oriantur ex affectis nervis convulsiones epilepticæ, exemplo suo confirmant infantes. *Nonnulli ab ulceratis uteris, capite dolentibus lac propinant, quod capitis dolore vexentur, quidam vero aquam quod animo linquantur. Ego contra, si capite doleant, & mentis læsio adsit, convenire aquam existimo, cum vero morsus & acrimonia inest, his lac bene facit. Hippocr. lib. I. de morb. mul. n. 88.*

*Malum febricitantibus lac: quatenus febres fovet, augendo quantitatem humorum, visciditatem, acrimoniam. Nutrit enim lac abundanter; obstructionibus favet per substantiam caseosam; & rancescit in calore febrili, intuitu nempe partium suarum cremoracearum, pinguium.*

*Hypo-*

*Hypochondriacis, seu præcordia elevata & murmurantia habentibus non convenit lac.* Hippocrates hic duo symptomata simul copulavit, ut indicaret lac dari posse etiam illis, quibus suspensa (elevata) tantummodo sunt hyponchondria, & quibus murmurant solum. Nam si a bile intumescat hepar, lac convenit, unde ipsemet Hippocrates *lib. de intern. affect. n. 31.* in hepate secunda, a bile in hepar confluenta, a qua durum, & dolorosum fit, non lac asinum modo, aut caprillum ad purgandum præbet, sed etiam bubulum ad bilem attemperandam per plures continuos dies exhibet. Similiter murmurante absque tumore ventre, lac non prohibetur, quia, si a bilioso succo per ventrem discurrente murmur fiat, lac datum utile esse potest, uti videre est in *lib. de vict. acut. n. 63.* Quare lac dari vetat Hippocrates, quando elata hypochondria simul murmurant. Hæc enim a flatuum copia generationem in hypochondriis habentium dependent, cui affectioni lac noxium est, non solum, quia flatuosum est, sed etiam quia, cum taliter affecti acidæ corruptioni subjiciantur, lac in ventriculo ob analogiam facillime iis acescit. *Martian. p. 464.* Si enim hypochondria flatibus infestata & elata fuerint ab acido viscoso, crasso & crudo, obstruente, spasmodico & flatulento, lac ingestum vel coagulationem subeundo, vel corruptionem, obstructionibus & flatuum generationi copiosiori pabulum subministrat. Si ventriculus debilis est, inque eo largus acidi proventus gignitur, lac miras turbas, anxietates, flatulentias, borborygmos, tormina, excitat. quare infensus est ejus usus hypochondriacis. *Hoffm. Rem. benign. §. 10.* Apollonius, cui elata erant  
*Vol. II. L viscera,*



viscera, & qui flatibus abundabat, cum lacte usus esset copioso, crudo, caprillo & ovillo, vitiosaque victus ratione, insignes omnium offensiones factæ sunt. Nam & febres exasperatæ sunt, neque memorabile aliquid ex ingestis alvus reddidit, &c. vid. *Hippocr. lib. 3. Epidem. ægr. 13.* Alius quidam a flatibus distentus, laterum inanitatem cum quodam dolore in tumorem sublatam habuit, & per excretionem materiæ puri similis sanatus est. Excretionis autem causa fuit error insignis, potus nempe multi lactis meracioris, quod in ventriculo corruptum vomitum excitavit. Adnotavit autem Hippocrates conditionem, quod meracius fuit, quia, si alicui liquori admixtum bibisset, citius a ventre descendisset, nec in eo corruptum esset. Eodem tempore febris supervenit, cujus causa Medicus adhibitus fuit, qui curationem ex arte instituit. Nam ratione doloris calefactoria adhibenda jussit, quod per vocem *ἁπτόντι* significavit, & ad vomitum compescendum, acrimoniamque corrupti lactis, pulciculam ex farina crassiori in cibis dedit, & ita ventriculus substitit, sublato vomitu, egressitque alvus quid puri simile, quod nihil aliud fuisse videtur, quam reliquiæ lactis corrupti: quod a ventriculo descenderat, & in intestinis corruptionem, & acrimoniam majorem contrahens febrem accendere & in transitu sedem inflammare potuit; ex ciborum enim corruptione in ventriculo febris supervenire non admodum solet. Hujus igitur materiæ excretionem facta, & flatus dissipati sunt, illique affectio sedata est. Vid. *Hippocr. l. 4. Epidem. n. 23. Martian. p. 329.*

*Malum lac siticulosus, & quibus biliosæ dejectiones:*

*nes: quia sitis a siccitate, quæ a viscido prædominante, seu humoris diluentis seu lymphæ defectu, vel ab humorum acrimonia; in utroque autem casu lac materiam præbet augmento mali, dum viscidum auget per caseosam substantiam, & acrimoniam suscipit ab admixtis humoribus acidis, sive biliosis alcalescentibus.*

*Ubi copiosa sanguinis evacuatio facta est, nocet lac ingestum: quoniam post nimiam sanguinis jacturam, visceribus laxis, debilitatis, vires corpori non sunt sufficientes coquendis assumptis; unde lac ingestum corrumpitur.*

*Conducit lac tabescentibus, non magna febre dentis &c.* Notandum tamen est, quod si juxta propositos ab Hippocrate canones, lac ægrotantibus exhibere velimus, nullus fere locus erit illud exhibendi; nam nullum fere tabidum lacte egentem inveniemus, qui vel capite non doleat, vel hypochondria non habeat suspensa & obmurmurantia, vel sitim non patiatur, vel biliosis quandoque non exerceatur dejectionibus, vel denique cui non nunquam sanguinis fluxus non acciderit. Quapropter nisi omnia simul hæc contra-indicantia vim faciant, aliquid pro tabidis sublevandis est audendum, adeoque lac propinandum, etiamsi unum vel alterum ex recensitis ab Hippocrate signis obfistat. Etenim nullum pro tabidis nutriendis præstantius habemus præsidium, quam lac, primum, & primis corporis nostri staminibus maxime analogum, nutrimentum, exhibere. *Cyilli in Ettm. Oper. T. 2. p. 597.* Equidem si tabes (μαρασμος) revera humiditatis, quæ in solidis partibus subsistit, absolutus existit interitus, nullam medicinam recipit. Propter hoc igitur nonnulli Medicorum merito decepti in

discernendo, putarunt, se verum marasmm curasse. Etenim fieri potest, ut tenuitas carni-um, maciesque, & veluti colliquatio earum resarciatur: primariam vero humiditatem, & quæ solida ipsa nutrire potest, prorsus absum- tam perditamque non licet restituere. Sic enim senium quoque sanari nequit, ut quod naturalis sit tabes. Quemadmodum igitur se- nium nulla medicina tolli potest, sic neque ea quæ revera tabes. Attamen propter humanum benignumque artis auxilium, contendere cum morbis oportet, & non ceu deploratos omni- no relinquere. Interdum enim, ubi quis na- turam dextram nactus fuerit, & tabes incipiat, nondumque solidas partes torruerit. speratum successum consequi poterit. *Alex. Trall. l. 12. c. 5. p. 729.* Lac igitur omnibus hecticis, præ- fertim in marasmm desinentibus, si quid aliud, idoneum est. Quapropter etiam iis valde con- veniens est, qui vires habent imbecilles, ne- que alimentum possunt attrahere: & hoc so- lum in corpus distribui, trahique non parum accommodate potest. Itaque lac muliebre primum locum obtinet, secundum vero asini- num. Verum quoniam ægre nonnulli hoc as- sumunt, caprillum ipsis dandum est, quod me- dium fere existit, & magis potest nutrire. Con- stat autem, etiam curam animalis habendam esse, ut nutriatur domi hordeo, myrti, lenti- sci, & quercus foliis. ita enim lac non amplius corrumpitur. Nam hujus sollicitudo habenda est, ut ne hecticorum alvus subducatur, præ- cipue eorum qui ex frequenti syncope, & diu- turna vacuatione alvi in marasmodem febrim inciderunt. Quam ob rem quibus venter im- becillis est, & facile subducitur, in his etiam  
lac

lac bis coquere, vel etiam fluviales lapillos in id conjicere oportet. Redduntur autem igne candentes, ut serosum a lacte per ipsos dissolvatur. At qui lac solum nolint assumere, aut cum ptisana, aut alica, aut chytro ipsum decoctum exhibeto: ad hæc cum itrio, hoc est libo fuminali, & similagine pari modo bis coctum offerto: præterea magis adhuc illis lac exhiberi debet, quibus etiam venter copiosiora & biliosiora dejicere videtur. Procedente autem tempore, ubi febres mitigatæ fuerint, & vires aliquo modo instauratæ, mollissimum & recentem caseum ex eo coagulatum dare ipsis non alienum est. Quatenus enim vires augeri cernimus, eatenus nos quoque cibis adjiciemus. *Ibid. c. 4. p. 725.* Sanguinem ex pulmone rejicientes omnes lacte utantur, mollique & recenti caseo, præsertim caprillo, aut bubulo. Neque enim medicamentum, aut cibus, aut aliud quidpiam adeo accommodum ipsis est, aut utile, atque lac. Et qui per initia solo ipso constanter longiori tempore usi sunt, omnes in totum consanuerunt. Novi autem quendam, qui cum toto anno ipsum & bibisset, & comedisset, interim cum frumentaceo aliquo, aut similagine, aut libo fuminali, aut alica, aut lente, aut panico incoquens: cumque ita agendo a vino abstinuisset, liberatus fuerit, & puris sputo, & ne postea in phthisin inciderit. *Ibid. l. 7. c. 1. p. 304.* Quod si post sanguinis rejectionem puris sputum prodeat, & diuturnior affectus fuerit, & corpus totum alimentum non sentiens, contabescere manifesto inceperit, neque thorax multum puris contineat, etiam solum ipsis lac dari debet, si non vehementer febricitent: si enim multo infestante

calore exhibeatur, non item nutrire, aut humectare poterit. Nam ab eo quod contra naturam est, vincitur, & in alienam, corruptricemque qualitatem mutatur. Ubi calor febrilis moderatior evaserit, lac ipsis exhiberi debet. Sin id quod rejicitur, expurgatione adhuc indigere tibi videatur, & non modo sordidum, sed & foedi odoris existat, asininum omnibus aliis antecellit: quippe etiam eo quod probe purgat, omnia vincit. Item equinum ipsis propinandum est, quod asinino ad omnia sit persimile. Quare etiam ægre spirantes eo adjutos subinde conspexi, cum opportune esset datum. Omnia enim, quæ pulmonum caverinis infixæ sunt, rejectioni reddit miorigera. Adjectum autem est opportune, ut cum hos febris non infestat, neque accessionis tempore exhibeatur. Quod si ægri horum animantium lac nolint assumere, dabitur ipsis secundo loco bubulum, aut caprillum. Etsi enim lac horum non adeo purgantem vim obtineat, tamen nutriendo amplius quiddam aliis præstare potest. Porro ne lactis potio ægri ventriculum corrumpat, satius est ipsum supra carbones incoquere. Sic enim decoctio bonam serosi partem auferet, ut etiam ipsum ad ventrem retinendum magis quam alia efficax evadat. Sin autem calculos fluviales candentes, excussosque ut pulverem non contineant, injicias, aut ferramenta eodem modo ignita, commodius adhuc, & utile efficies. Cæterum variis modis lac ipsum comedant, interim cum similagine, alias cum libo suminali, aut oryza, aut alica cum ovorum luteis. Sic enim appetitus quoque conservabitur, & usus lactis, qui omnia potest, fastidiosus non erit. Etenim ulcus purgare,

gare, carne obducere, & totum corpus plus quam universa, nutrire poterit. *l. c. cap. 2. p. 309.* Tabis lac medela est & nutritio, & ventris calefactio, & vesicæ lenitio. *Aret. Curat. acut. l. 1. c. 3.* Propinandum vero est lac maxime mulieris, quæ proxime peperit puerumque nutrit. Si lactis humani copia non datur, asinæ quæ non pridem peperit, lac accipito: tenue est enim ac fluxile hujusmodi lac. *ibid. l. 2. c. 3.* Lac vero assumtu suave, potu facillimum, nutritu solidum, & qualibet esca a pueritia familiarius est: præterea visui colore delectabile, medicamen arteriam non asperans, guttur lævigans, ad ejiciendam pituitam facilem spiritum reddens, inferiorem exitum lubricum efficiens, ulceribus dulce subsidium, & quolibet alio benignius. Si quis multum lactis potat, nullo alio eget alimento. *Idem Curat. diut. l. 1. c. 8.* Cum nihil aliud comedendum, vel bibendum, nisi solum lac, ægrotantibus conceditur, *Diæta Lactea* dicitur. Ut autem quod expertus sum dicam: Infantes, vel in prima pueritia constituti, etsi jam a lacte depulsi fuerint, & cibis solidioribus assuescere cœperint, si in tabem incidant, omni denegato cibo commode possunt nutricis iterum mammas exsugere, & Lacteam Diætam cum nutritionis commodo ferre; at qui jam adoleverunt ægre possunt, omni proscripto cibo & potu, solo lacte exsucto nutriri: nec unicum vidi ad secundam diem Diæta Lactea absque summo languore utentem. *Cyrilli* ubi supra. Quod ergo attinet Diætam lacteam pro nutriendis phthisicis & tabidis, certe legitimus lactis & quorumlibet lacticiniorum usus in omni casu multum valet, imprimis quando malum dependet ab acrimonia sanguinis & lymphæ salsa muriatica, quippe ad

L 4

quam

quam lactis usus nobilissimus est, ubi cætera rite præmissa fuerint, & dyscrasiæ contentorum maximam partem correctæ: e contra parum proderit quoties atrophia est a colluvie aut corruptela cujusdam visceris, aut quando est a vitio stomachi, nisi hæc impedimenta prius removeantur, & ventriculi digestio plus minus restituatur; alias enim vix fieri potest, quin lac etiam corrumpatur in ventriculo. In atrophia ergo ista imprimis lac convenit, quæ est a nimia acrimonia humorum, conjuncta cum eorum caliditate vel quasi acredine massæ sanguineæ, ubi opus est, ut humectetur & temperetur. Sub ejus usu semper aliquid sacchari, vel conservæ rosarum addatur, ne tam facile coagulari possit. Porro in graviore malo, qui lacte utuntur, debent ter in die istud fumere, mane scilicet, a meridie, & vespere, & vix alium cibum gustare, nisi passulas, aut cibum facile digestibilem: idque per aliquot septimanas, donec denuo corpus iterum proficiat: & sumpto lacte, moderato exercitio corpus successive movendum est, ut facilius idem distribuatur; non enim longa in stomacho indiget digestionem. In ista etiam tæbe, quæ ex ulceratione pulmonali oritur, lacticidem præprimis confert; nam abstergit parte serosa, nutrit corpus, & temperat parte butyrosa. Convenit præ cæteris lac muliebre; idque, si fieri potest, ex mammis nutricis sanæ ab ægro exsuctum, ne ab aëris attactu alterari possit. Post lac muliebre est bubulum & caprilum, in specie in atrophia scorbutica, præsertim si capra prius appropriatis vegetabilibus, vulnerariis imprimis & antiscorbuticis, nutrita fuerit: item lac equinum cum paucis saccharo.

Sane

Sane in scorbutica phthisi optima sunt lacticia, quibus instillari possunt spiritus cochleariæ, aut salis ammoniaci, aliave similia. Veteribus in usu fuit lac asininum, optime ulcus detergens, quia ferosum. *Ettm. Oper. T. 2. p. 686.* In omni hectica haud postrema eo tendit indicatio, ut roscidum illud humidum, quod calor continuus non modo ex sanguine, sed etiam ex tubulis solidis, & una cum hoc ipsam tandem carnem atque pinguedinem absument, resarciatur. Huic scopo quam maxime satisfaciunt alimenta medicinali simul virtute instructa, inter quæ palmam fert lac ipsum. Optimum humanum, quod promptius consumptum restituit humidum & calorem, idque ex mammillis suctum, ne ab aëre vitietur. Asininum minus quidem nutrit, sed magis refrigerat, calorem temperat, abstergit & aperit. Efficacius nutrit caprillum & vaccinum, sed gravius est, multumque caseosæ substantiæ habet, ideoque, ne ventriculum male afficiat, corrigendum. Mihi præ reliquis placuit Hippocratis lacte utendi methodus, quam *de intern. affect.* n. 11. sic tradidit: *Dandum est & lac asininum coctum ad subpurgationem, aut bubulum, aut caprinum. Bibat etiam crudum lac bubulum, tertia aquæ mulsæ parte admixta, per dies quadraginta quinque, admixto etiam origano.* Recte enim gravis hic auctor passim ad lenem purgationem commendat lac asininum coctum, quia sal ipsi inest dulce instar sacchari, abstergens leniter & laxans, quod, coctione diffuso humido, concentratur magis. Origanum autem adjicere præcepit procul dubio ad roborandum stomachum & genus nervosum debilitatum. Ego, si lac asininum haberi nequit, ita lactis curam



adornare soleo, ut præcipiam primum, per duos, vel tres dies mane potare lac, e vaccis herbis recentibus & appropriatis partibus multum, ad libram unam, in qua uncia mannæ, aut sacchari rosati, vel conservæ rosarum dissoluta. Dein mensuram solius lactis quotidie bibere præcipio, addendo sacchari unciam dimidiam & nitri drachmam dimidiam. Pro circumstantiarum ratione, præsertim ubi suspicio labis in mesenterio, aut exulcerationis in viscere interno, lacti confundo ad dimidias, vel tertias, aquam, aut puram fontanam, aut longe melius Selteranam mineralem. Hac vero deficiente, aquam communem infundere suadeo cum veronica, soncho, pulmonaria, hepatica, musco pulmonario, tussilagine, hedera terrestri, scolopendrio, capillis Veneris, floribus hyperici & rosarum, & infusum hoc cum tantundem lactis, vel caprilli, vel bubuli calide bibere, adjecto saccharo, & pro meliori absterfione, aliquot guttis olei tartari per deliquium. Cura hæc minimum per sex hebdomades continuanda, ac interea vitanda omnia quæ stomachum gravant, debilitant & lac coagulant. Vinum quoque ex toto circumcidendum, & non aliud, ad stomachum fovendum, concedendum, quam parcum Hungaricum, aut mulsam ex melle Borussico confectam. Ante quam tamen cura lactis instituat, videndum est, an ventriculus illud ferre possit. Sunt enim nonnulli, qui lac natura penitus averfantur. Notavi etiam, quod, qui diætæ vinosæ dediti cerevisiam largius potant, lac commode ferre nequeant. Tutissimum autem lac asininum, sero plus redundans, minusque caseosæ substantiæ habens. Quodsi tamen asinini lactis copia non est, substitui potest

test serum lactis dulce. Sunt etiam qui lactis serum in B. M. destillant & prolectam destillatione aquam mirifice dilaudant, tam potam, quam loco vehiculi assumendorum medicamentorum. *Hoffm. Med. rat. T. 4. P. 1. p. 571.* Novi, solo lacte caprillo cum floribus papaveris rhœades cocto, admixta dimidia aquæ parte & adjecta portione mellis, quotidie largius assumto, immodicam etiam ex pulmonibus sanguinis profusionem optime conquievissè primum, ac postea usurpatis simul inter cibos confectis ex amylo, ex toto fuisse sanatam. Id tamen de usu lacticiniorum omnium tenendum: ut non modo ventriculi, an ea ferre possit, habeatur ratio, sed & ne simul & semel, sed parcis & repetitis vicibus, ingerantur. *Ibid. P. 2. p. 44.*

Serum coctum & lac asinum fere inter purgantia medicamenta numerarunt Antiqui; nostrique homines eundem effectum ex lacte asinino ad infinitum damnum phthisicorum, & a plurimis morbis convalescentium etiam inviti quotidie in hac urbe (*Londini*) experiuntur. *Lister Exerc. med. p. 117.* Asinum lac apud nos (in Anglia) maxime eligitur. Sed ubi illud non in promptu est, serum lactis vaccini, vel etiam caprini, præsertim si herbis suave olentibus pastæ fuerint capræ, in ejus locum commode substitui potest; ipsum vero lac vaccinum, quantumvis decocto hordei, ut moris est, diluatur, sæpissime non convenit. Neque alienum erit, serum illud infusis herbis quibusdam, quæ stomacho gratæ sint, & flatu discutiant, morbo accommodatius parare. At infeliciter interdum evenit, ut, cum lactis usum maxime desiderat corpus, tanta sit intestinorum lævitas, ut illud ferre non possint. Cum  
in

in tali igitur loco res fit, illud hoc modo componendum est: flores rosarum rubrarum siccatarum, balauſtia, cortex malorum granatorum, cinnamomum, ſingulorum drachma una, coquuntur in lactis vaccini libra una. Cum ebullire incipit, frigida aqua affunditur parua portione, ut reſtinguatur & ſubſidat; finitur iterum ebullire, & eodem modo reſtinguitur; idque toties faciendum eſt, donec libra una abſumpta, lactis ſimul & aquæ quod reſtat, libræ unius menſuram adæquet. Tum colandus eſt liquor, quem totum, commiſto ſaccharo, partitis, uti commodum erit, hauſtibus, ægrotus ebibet quotidie. Hac via nutritur ſimul corpus, & venter comprimitur; nec quicquam obſtat aliorum ciborum, vel medicamentorum, uſui huiusmodi diæta. *Mead. Monit. p. 48.* Qui apud Anglos primum mos invaluit, lac cum Caffè conjungere, ſimulque potare, jam in Italiam tranſductus eſt, ut in quotidianas & populariter conſuetas hæc potatio tranſierit. Re vera decoctum Caffè, lactis promptiori in ventriculo digeſtioni non parum favet. Solemus & toſti panis buccellam, vel menthæ folia viridia lacti præmittere, aut ſi mavis juxta Cl. Baconis a Verulamio methodum, illud per ſacculum pulvere menthæ & rosarum rubrarum reſertum trajicere, deinde calidum propinare. Illud tamen omnino verum in praxi deprehendimus, tunc lac egregie in ventriculo confici adeoque exacte nutritionis negotium procurare, cum repurgatis quoad fieri poteſt primis alimentorum officinis, ea adhibeatur induſtria, ut lac in vacuum omnino ventriculum admittatur, nec niſi in vacuum jam a lacte ventriculum cibus quicumque ingeratur: eo nempe fine ut  
nul-

nullam in ventriculo admixtionem lac patiatur, adeoque nullum noxium saporem adipiscens, in sanum dulcemque chylum mutari queat. *Cy-rilli apud Ettm. Oper. T. 2. p. 597.*

*In febribus longis & languidis, nullo ex dictis signis seu circumstantis præsente, quæ prohibent lactis usum, dari potest lac, non quodcunque, sed dilutum, seu serum ejus, quo infarctus viscerum tollantur virtute diluente & abstergente. Indigitantur febres, quæ hodie lentæ & hecticæ dicuntur, h. e. quæ diuturnæ sunt & continuo, licet leniori ac remittente, æstu præternaturali, succos corporis consumendo, tabem inferunt viresque debilitant. Hoffm. Med. rat. T. 4. P. 1. p. 553.*

Uti vero in ulceribus & infarctibus pulmonum, lactis serum, seu lac asininum, egregie se gerere observatum est: ita etiam in aliis internarum partium apostematibus & ulcerationibus, exhiberi bona cum spe potest, maxime si remixtum fuerit cum melle aut sapone Veneto. Hippocrates foeminæ ex partu sanguinem vomitione rejicienti ob læsum hepar, lac asininum bibendum præcipit ad dies quinque, deinde vero lac bubulum ad dies quadraginta propinat, sub vesperam autem exhibet sesamum tritum. vid. *lib. de nat. mul. n. 46. & lib. 1. de morb. mul. n. 113.* In curatione ulcerum jecoris dandum est asininum lac bilem non generans, bene nutriens, in caseum non spissescens, quæ lactis virtus est. Si vero per intestina pus educere velis, tibi lac eductorium esto, præcipue quidem asinæ: si id non adsit, capræ aut ovis. *Aret. Curat. diut. l. 1. c. 13.* In consummatis autem hecticis & phthisicis, inprimis si colliquativæ jam accesserint diarrhœæ, disso-

dissolutionem universæ humorum massæ indicantes, ab omni prorsus lacte abstinendum est.

Tandem *præter rationem extenuatis* lac convenire Hippocrates monet, quatenus defectum materiæ nutrientis restituimus usu lactis: videmus enim γαλακτοφάγῃ communiter & robustiores & carnosiores ac pinguiore alii deprehendi. Vid. A. E. Büchneri *Dissertatio de noxiæ & salutari usu lactis juxta Hippocratis aph. 64. sect. 5. Erford. 1739. 4°.*

Ad summam supponit aphorismus phthisicos febricitare non nisi febre hectica; ergo per febres longas, febres quædam putridæ intelliguntur, sed cum nec in omnibus febribus putridis tuto lac conveniat, duæ adduntur conditiones requisitæ: 1. ut cum ejusmodi putridis non jungatur capitis dolor, neque iliorum murmuratio, neque sitis &c. 2. ut febribus similibus laborantēs, toti quasi consumti conspiciantur. Atqui in tali statu fuit vir sexagenarius, cum ultra annum febre quartana intermittente simplici pressus esset, cui omni die, qua a febrili paroxysmo immunis erat, lac caprinum exhibitum fuit, unde, ubi per aliquot tempus continuasset, notabiliter incrassari, refici & viribus restitui cœpit, redeunte appetitu, & paulo post medicamentis antifebrilibus sumtis febris desiit. Vid. *Eph. N. C. D. I. a. I. o. 22.*

Lac alimentorum esse optimum & naturæ amicissimum, vel ex eo colligi poterit, quod chylus, qui proxima materia sanguinis est, lac sit, & lacte omnis generis animantia juniora, etiam ipsi infantes, quam optime nutriantur & membra teneriora non modo inde nutrimentum, sed & primum robur accipiant. Solo quoque lactis usu corpora firma ac robusta red-  
di

di & conservari posse, nonnulli Helvetiæ populi suo exemplo nos docent, qui solo lacte vescuntur. At vero cum non omnium corporum sive naturarum eadem sit ratio, neque ventriculus apud omnes eodem modo constitutus, lac vero facile in coagulum caseosum abire queat: hinc non omnibus etiam æque utile est. Sicuti vero lac iis, qui nimis fluidos & salfos habent humores, macilenti sunt, & vasa aperta habent, motu gaudent & febre carent, amicissimum est: ita omnibus repletis, pituitosis, viscerum obstructioni obnoxiiis, & qui ventriculi sunt imbecillioris & copiosum acidum in eo foveant, inimicissimum est. Et quoniam ex ventriculi vitio, ejusque ab acidis & corruptis humoribus infarctu, facile caput dolet, hinc rectissime Hippocrates, *Lac dare capite dolentibus*, &c. Quare *Aëtius l. 2. c. 90.* præclare monet, quod ii, qui lacte uti velint, latas debeant habere ac amplas venas & apertos viscerum meatus. Nocet vero lactis usus maxime iis, qui calculo tam renum, quam vesicæ laborant, quia caseosa, quam lac continet, materia ad calculi concretionem non parum contribuere videtur. *Fr. Hoffmanni Diss. de dietæ vitio multorum morborum causa. Hal. 1715. 4º. §. 32.*

Ex huc usque propositis explicari quoque posse putem, quæ scribit Plinius *l. 28. c. 9*: Lactis usus contrarius capitis doloribus, hepaticis, nervorum vitiis, febres habentibus, vertigini (præterquam purgationis gratia), gravedini, tussientibus, lippis.

APHOR.

## APHOR. 65.

**Ο** κύσσοισιν οἰδήματα ἐφ' ἑλκεσι φαίνεται, ἡ μάλα σπώνται, ἡ δὲ μαίνονται. τρεῖων δὲ ἀφανισθέντων ἐξαίφνης, τοῖσι μὲν ὀπίσθεν, σπασμοί, τέτανοι τοῖσι δὲ ἔμπροσθεν, μανία, ἢ ὀδύνη πλευρᾷ ὀξείαι, ἢ ἐμπύησις, ἢ δυσπνευρία, ἢ ἐρυθρὰ ἢ τὰ οἰδήματα.

**Q**uibus in ulceribus tumores conspiciuntur, ii fere neque convelluntur, neque in furorem aguntur. At iis derepente evanescentibus, quibus quidem id a tergo incidit, convulsiones, & nervorum distentiones fiunt: quibus vero ab anterioribus, furores, aut lateris dolores acuti, aut puris collectio, aut intestinorum difficultas, si rubri tumores fuerint.

**L**egitur hic aphorismus in lib. 2. Epidem. sect. 3. n. 129 sq. his verbis: Tumores in ulceribus a convulsione & insania vindicant. Qui si derepente disparent: his quidem quibus a tergo fuerant, convulsionem cum dolore: illis vero quibus a fronte, insaniam aut acutos laterum dolores, aut sanguineam intestinorum difficultatem convehunt. Celsus l. 2. c. 7. p. 62. ita habet: Si tumores super ulcera subito esse desierunt, idque a tergo incidit, vel distentio nervorum, vel rigor timeri potest: at, si a priore parte

*parte id evenit, vel lateris acutus dolor, vel insania expectanda est. Interdum etiam hujusmodi casum, quæ tutissima inter hæc est, profusio alvi sequitur.*

Omne ulcus tumorem adjunctum habet, quia divisa vascula, dum se retrahunt vi elateris naturaliter fibris insiti, humores continent, qui per illa integra & continua libere fluebant, jam vero hærent & stasin faciunt, unde attollitur in tumorem pars ulcerata tam diu donec per-rumpentes humores, qui stagnabant, puri materiam præbent. Si jam tumores vasculorum repente evanescunt absque eo, quod suppuratio eveniat, significatur humores aliorum translatos, qui excitatis spasmodicis motibus aliorum, originem præbent enarratis malis. Hujus observationis insignem fidem faciunt aliæ historiæ, quæ scabie & pustulis in cute subortis melancholiam decrevisse memorant. Ita puellam maniacam per ulcera in crure orta curatam refert Forestus, sicut e contrario ab occluso ulcere melancholiam cœpisse auctor est Amatus. *Hoffm. Med. rat. T. 4. P. 4. p. 205.*

Si morbi materia ex uno loco ad alterum feratur, quando vocatur *metastasis*, talis translatio bona esse potest, & mala. Nam ut bona sit, omnis materia est transferenda ex parte magis principe ad minus principem, ex loco ubi exonerari non potuit ad aliquod emunctorium conveniens: ita enim æger liberari potest ab omni materia morbi. Si vero imperfecta sit translatio, vel ad partem, ubi eadem materia majus periculum inferre potest, augebitur morbus. Ambitus ulceris vel ora ejus vel tument, vel non elevantur, prout fluens humor morbosus in istis colligitur, vel non. Si multa sunt ulcera dispersa per cutim, ut hic

*Vol. II. M habetur*



habetur in plurali, non possumus accusare vitium locale, sed humorem morbosum per totum corpus dispersum, uti in variolis. In tali nunc statu morbofo observavit auctor ægros non valde convelli, aut insanire, id est, rarum est, si ora ulcerum turgeant, quod tunc ægri corripantur convulsione vel insania. hoc etiam observamus in variolis; quoniam morbi materia per corpus dispersa tunc colligitur ad ulcera, propterea non fertur ad encephalon, ut irritando nervos inferret convulsionem vel insaniam. Si vero illa intumescencia evanescat, facile fieri potest, ut ad encephalon delata materia morbofa istos morbos inferat. Non tamen illa intumescencia tam certum est signum, ut nunquam inde fieri possit convulsio aut insania; nam observavi in ulceribus cum læso nervo vel tendine intumescenciam magnam prælagisse convulsionem vel insaniam. Hujus discriminis ratio est, quoniam alia pars in consensum potest trahi, & per metastasin recipere morbi materiem. Quod si vero ex intumescencia læsi nervi vel tendinis generetur convulsio aut insania, hi morbi non superveniunt ex metastasi, sed ex consensu, qui non admodum frequens est in ulceribus cutis. Dispatencia tumorum in ulceribus (materia nempe per apertum ulcus nondum beneficio maturationis evacuata) semper mala est; verum non determinat, qualis morbus sit expectandus; nam prout illa retrogressa materia in hanc vel illam partem deponitur, ita quoque morbus erit varius, & magis minusve periculosus. Si feratur ad nervos motores, inducit motum involuntarium validum; sed si feratur ad partes acuto sensu donatas, idem tunc acre validos dolores

dolores infert, qui hic dicuntur *dolores lateris*, qui locus solus non est obnoxius huic receptioni. Observavi quoque ex tali disparentia natos fuisse dolores capitis & ventris: sed quoniam ille dolor pectoris observatus fuit ab auctore, eum pronunciat; sed propterea non negat alias quoque partes dolore corripì posse. Si delata fuerit materia ad eum locum cerebri, in quo mens nostra sensus internos exercet, eum locum in suo placido motu ita perturbat, ut mens tali modo afficiatur ex hac commotione interna, ac si agitaretur perturbatis quibusdam sensibus externis, & quoniam tunc anima nostra ex perturbato motu interno ratiocinatur, & operatur, talis actio dicitur *Insania*. Hoc autem mirabile observavit auctor in hac metastasi, quod ex ulcerum detumescencia in partibus posterioribus frequentius generetur convulsio & tetanus; sed ex metastasi partium anteriorum frequentius insania & laterum dolores. Quomodo autem ex hac detumescencia generari possit suppuratio vel empyema, primo intuitu videtur conceptu difficile. Sed quoniam materia purulenta in marginibus ulcerum confecta, uti alibi in corpore, inde reduci potest, & humoribus circulantibus misceri, ex communi observatione translationis puris satis evincitur, suppurationem alibi in corpore, vel in cavo pectoris, fieri posse. Neque obstat nimia puris crassitudo, & quod nulla patens via sit ex una parte in aliam. Nam sæpe experimur in empyematicis pus evacuari per urinas, non quod ex pectore ad renes sit canalis apertus transmittens pus; sed pus aliquo modo liquatum, venulis absorptum, cum sanguine circulante circumductum, actione renum

iterum separatur & cum urina exit. Quoniam translatio a peripheria corporis ad interiora semper est mala, facile intelligitur, quod talis suppuratio non solum mala sit, sed & revocationem ad priora loca relicta exigit. Per *dysenteriam* intelligenda est frequens alvi dejectio cum dolore, sive sanguis exeat, sive non: & addita verba illa, *si tumores rubri fuerint*, referenda duntaxat esse videntur ad hanc metastasin ex ulceribus ad intestina; nam si rubedo illa major adsit in oris ulcerum, significatur materiem erysipelatofam vel & aliam acrem irritantem adesse, non vero purulentam, uti in precedente metastasi; & si illa materia acris rubedinem inducens, quæ Veteribus dicitur biliosa, miscetur sanguini circulanti, illa quoque frequentissime deponitur ad intestina, ubi sua irritatione generat dolorem & tormina, & quoniam ad partem stimulatam magis confluunt humores, intestina irritata magis mota, maiorem copiam recipiunt, generant dysenteriam humoris acrioris, qua egestionem continuata tandem egeritur etiam ipse cruor. Quamvis vero metastasis fiat ad organum excretorium, non tamen ita bona est censenda, nam id acre obambulavit prius totum corpus, ubi reliquos quoque humores inquinare potuit; ulcus eo fluxu non est sanatum, unde fit imperfecta metastasis, quæ semper mala; evacuatione hac sæpe etiam exulcerantur intestina, ut ita augeatur malum; contenta alimenta in intestinis tali corrupto humore perfusa non concoquuntur, & una cum corrupto humore eliminantur, atque ita privatur corpus suo naturali pabulo. *Gorter.*

APHOR.

## APHOR. 66.

**Η**ν, τραυμάτων ισχυρῶν ἰόντων καὶ πνηρῶν,  
οἰδήματα μὴ φαίνεται, μέγα κακόν.

**S**i magnis, & pravis existentibus vul-  
neribus tumores non conspiciantur,  
ingens malum.

**D**esumpta est hæc sententia ex *lib. 2. Epid. sect.*  
*3. n. 128.*

Facto vulnere vasa divisa a sese mutuo rece-  
dunt & tumere incipiunt a stagnante in illis hu-  
more, uti modo dictum est ad *aph. 65.* Tumor  
præfens spem facit futuræ suppurationis: con-  
trarium ergo malum, quia absens tumor indi-  
cium est, fluxionem divertisse ad partem ali-  
quam nobilem. Hinc bene Celsus *l. 5. c. 26.*  
*n. 26: Nimis intumescere vulnus, periculosum: ni-*  
*bil intumescere, periculosissimum est. illud indicium*  
*magnæ inflammationis: hoc emortui corporis est.*  
Hinc tumores mediocres optimi sunt. *Heister*  
*Chir. p. 49.*



## APHOR. 67.

**T**ὰ χαῦνα, χρηστά· τὰ δὲ ἑνώμα, κἀκα.

**M**olles boni, at crudi mali.

**E**st pars seu continuatio præcedentis aphorismi, & in lib. 2. *Epid. sect. 3. n. 128.* ita legitur; *Si laxi & molles fuerint bono sunt, si vero sursum ferpant damno.*

Molles intelliguntur tumores, qui vergunt seu proclives sunt ad suppurationem; crudi seu duri i. e. cocti seu suppurati difficiles.

## APHOR. 68.

**T**ὸ πρὸς ὀπίσθεν τοῦ κεφαλῆς ἀδυναμία, ἢ ἐν μέσῳ ὀρθῇ φλέβῃ ἡμυθῆσαι ὠφέλιον.

**E**i, qui parte capitis posteriore dolet, recta in fronte incisa vena prodest.

**T**otidem verbis habetur hæc sententia in lib. 6. *Epid. sect. 2. n. 48.*

In omni, a quacunque etiam causa proficiatur, dolore cephalico, initium curationis ab injectione enematis, item a venæ sectione, si plethora id exigit, faciendum est, ita tamen ut alvi apertio huic præcedat. Sæpius pletho-

ra

ra soluta, ad meliorem derivationem causæ peccantis a parte affecta, frontis venam aperire expedit. Et tunc *Heurnii* monitum dignum utique observatione est. Suadet nempe, *ante sectionem*, ut *vinculum collo injiciatur*, quo intumescat frontis vena, quæ oblique erit secanda, cavendo diligenter ne lædatur tunica pericranii. *Hoffm. Med. rat. T. 4. P. 2. p. 202.* Licet vero venæ sectio in fronte, in morbis qui caput gravius offendunt, experientia teste, eximiam conferat opem; id tamen non universale est, neque omnibus omni tempore convenit, sed simul consideranda est ipsius corporis constitutio. Nam si ejusmodi capitis morbis magna vasorum plenitudo juncta, vel etiam spasmi vehementiores in inferioribus, sanguinem *επιρροή* (conferunt) & cum impetu ad caput urgent, verendum est, ne dato per apertam ibi venam vacuo spatio, major cruoris copia eo inviteatur. Quapropter Veterum peritissimi unanimi suffragio, ut vena simul in brachio vel pede solvatur, suadent. Sic *Alex. Trallianus l. 1. cap. 16.* Si, præcipit, *circa caput aliquid moliri cogites prius quam totum corpus recrementis liberum reddideris, offendes magis quam juvabis, copiosorem materiam ad locum affectum attrahens.* Hinc neque in hemicrania, seu capitis dolore contumaci, vertigine chronica, melancholia, venæ sectio in fronte quippiam adjumenti afferre potest, quia major inde sanguinis ad caput affluxus proritatur & vasa membranarum cerebri obstructa magis infarciuntur, sed præstat tunc sanguinem ex inferioribus ducere. Vid. *Hoffm. l. c. T. 3. p. 608. 612.*

## APHOR. 69.

**Ρ**ίγα ἀρχεται γυναιξὶ μὲν ἐξ ὀσφύος μᾶλλον, καὶ διὰ τούτου ἐς κεφαλὴν. ἀνδράσι δὲ μᾶλλον ὀπίσθεν, ἢ ἔμπροσθεν τοῦ σώματος, οἷον ἀπὸ τοῦ πηχέων, καὶ μηρῶν. αἱτὶα καὶ τὸ δέρμα ἀραιόν, ὧστε δὲ τούτο ἢ θριξί.

**R**igores mulieribus quidem initium ducunt ex lumbis magis, & per dorsum ad caput perveniunt. Quin etiam viris parte corporis posteriore magis, quam anteriore, veluti ex cubitis, & femoribus. Quod & indicat cutis raritas, quam etiam pilus ostendit.

**E**xstat aphorismus hic in *lib. 2. Epidem. sect. 3. n. 111 sq. & l. 6. sect. 3. n. 30 sq.*

Quo molimine, & qua intentione Naturæ fiant rigores, & quotuplices sint, dictum est ad 4 *apb.* 29. ubi etiam videre est, quod præsens aphorismus intelligendus sit de rigoribus criticis & periodicis. Galenus exponens primam ejus partem, inquit: propterea rigores incipere a lumbis, quia partes illæ sunt frigidiores & magis sensiles; sunt debiliores, ut propter hoc citius sentiant læsionem humorum acrium: addit Galenus, potissimum hoc contingere mulieribus, quia ipsæ sunt natura debiliores & frigidiores viris. Quod autem communetur hic rigor per dorsum capiti, causa hæc

hæc est, quia lumbi sunt admodum connexi ipsi medullæ, ita ut communicatus rigor medullæ communicetur capiti, cui connexa est medulla. De secunda particula dicit Galenus, propterea viris a partibus posterioribus incipere rigorem, quod illæ partes sunt debiliores, & frigidiore. Atque cum cubiti coxæque sunt membra frigidiora & debiliora, utpote remota maxime a corde; in his rigor prius incipit. De tertia parte; Hippocrates cum vidisset dubium esse posse, an partes anteriores sint calidiores, & posteriores frigidiores, dicit hoc significari ex raritate: quæ fit a caliditate. Si itaque sunt rariora, sunt sane calidiora. Quod autem hoc verum sit, inquit Galenus, probare Hippocratem ex pilis animalium, quia ubi sunt plures pili, partes sunt rariores & calidiores. Sed non caret hæc Galeni interpretatio nobilissimis dubitationibus. Primum dubium est, an rigores in mulieribus & viris semper inchoant a partibus posterioribus & a lumbis, quia *Aristoteles sect. 1. problem. 26.* scribit: Medicos consuevisse præcipere ægris, ut ante febres contegerent pedes, eo quod rigores incipiant a pedibus: & huic sententiæ experientia adstipulatur, quandoquidem nullus est, qui in actu practico non experiatur semper prius frigere nares & pedes. Sed quod magis est, idem Hippocrates *lib. 6. Epid. sect. 5. n. 47.* rigores ait magis fieri circa ventrem superiorem, febrem in inferiore: superior venter qui stomachus est, in parte anteriori magis est collocatus; ea propter videtur inferre rigores magis incipere a partibus anterioribus. Dupliciter mihi videtur responderi posse: uno modo, Hippocratem non dicere quod a lumbis semper

M 5

fiant



fiant rigores, sed quod magis ab his. Sed alia responsio accommodatior est, rigorem dupliciter considerari posse, vel prout a refrigeratione primo perdurat usque ad calefactionem; vel considerari potest secundum impetum illum & vehementem concussionem. Si consideretur primo modo, vere rigor semper inchoat a naribus, & pedibus. & hoc pacto loquitur Aristoteles quando dicit rigorem incipere a pedibus, intelligens totam illam refrigerationem a principio usque ad finem, & hoc verissimum est. Si alio modo consideremus, rigor a partibus posterioribus semper incipit, quia vere illa percussio oritur a partibus posterioribus, a medulla. Ad Hippocratem vero dicendum, comparare ventriculum, & intestina quoad rigorem & febrem, ac dicere, ventriculum ob sui sensum exquisitum ab humoribus acris magis excitare rigorem, h. e. agitationem totius corporis pro depellendis succis mordacibus; intestina vero, cum sint putredinis loca, magis febrem facere: non propter hoc tamen negat, quin in febribus, ubi locus putredinis non sit in aliqua parte, inchoet a lumbis. Sed hic quoque aliquod dubium oritur, quomodo dicat mulieribus rigorem oriri a lumbis; viris non ab his incipere asserat, sed a partibus posterioribus; præterea, quæ est ratio, quod a pedibus non incipiat? Primum responderi potest, hoc maximo iudicio dixisse Hippocratem, quia viris vere incipiunt rigores a dorso, a parte posteriori; mulieribus a lumbis, quia uterus subtus lumbos est, unde fit, ut ratione uteri partes lumbi sint debiliores & frigidiores, & lucta potissimum sit circa has partes. Secunda dubitationi respondendum, pedes non percipere

percipere rigorem, quia in ipsis non fit lucta, cum partes illæ non ita offenduntur. Sed quæ est hujus rei causa? Natura cum animadverteret pedes debere continuo calcare terram, & consequenter impingere rebus duris, ne læderentur fabricavit eos ligamentis, nervis durissimis: ut propter hoc nequaquam vellicentur ab humoribus acribus. Circa postremam partem est non levis, nec inutilis dubitatio; scilicet, utrum verum sit, pilos animalium magis abundare in partibus anterioribus quam posterioribus: nam si diligenter videamus bruta animalia, sive in ipsis faciamus partem posteriorem dorsum, sive caudam, quælibet harum pilosior est, quam anteriora sunt, excepta tamen simia: imo *Aristoteles sect. 1. probl. 52.* quærens rationem, propter quam animalia bruta habent partes posteriores pilosiores, homo autem anteriores, idcirco esse inquit, quia natura semper tegit partes debiliores magis, ut cum in homine sint partes anteriores debiliores, in brutis posteriores, jure magis sint pilis tectæ. Itaque non est verum, ut inquit Hippocrates, pilos ostendere raritatem cutis, quia, ut inquit Galenus, pili sunt plures in anterioribus partibus quam posterioribus. Pro solutione dupliciter responderi potest; partes, quæ statim se offerunt obtutui, & oculis nostris, ac proinde injuriis externis, & præsertim aëris, anteriores esse, scilicet partes pectoris; quod si verum est, necessarium est anteriora esse pilosiora. Sed si hoc non placet, est alia ratio solvendi hunc nodum, scilicet delendam esse vocem *animalium* in textu *l. 2. Epid. sect. 3. n. 112.* ut intelligatur de pilo humano; unde si deleatur hæc dictio, necesse pilosiores, quia  
revera

revera calidiores: quod sit delenda, ex eo colligo, quod in *l. 6. Epid. sect. 3. n. 30 sq.* nequaquam est. Ut jure existimet Hippocrates, partes anteriores esse rariores, quia sunt pilosiores. *Mercur. Præl. in l. 2. Epid. Hipp. p. 202 sq.*

Ex tota theca vertebrarum nullibi plures emergunt nervi, quam ex vertebra lumborum, inde enim remergunt nervi, qui ad omnia viscera ventris tendunt & ad pedes. Lumbi etiam constituunt partem infimam medullæ spinalis, ubi illa medulla in caudam veluti compactam, non amplius mollem medullosam, abit. Hoc etiam in loco infantes frequentissime patiuntur spinam bifidam. Humor roridus nutriens, vagina medullæ spinalis coercitus, hic satis magna copia colligitur, & nudis nervis accumbit. Ideoque nervi in hoc loco maxime sunt expositi rebus acribus applicandis: quoties enim aliquod acre in illo succo hæret, ob locum declivorem & ampliorem ad nervos hic nascendos applicatum, horrorem & rigorem inducit. Quia omnes hæ concurrentes causæ minus inveniuntur in locis reliquis, magis hoc in loco habetur rigoris origo in lumbis, quam in partibus cæteris. Si jam perpendimus, capsulam nervi ruditer tactam concitare rigorem, & capsulam nervi continuatam esse vaginæ medullæ spinalis, plane constare potest, per irritatam capsulam medullæ spinalis in lumbis, irritamenti propagationem fieri posse usque ad meninges, quum meninges cum vagina hac unam continuatam membranam constituent, quæ omnibus nervis per totum corpus dispersis largitur capsulam. Quod autem in mulieribus frequentius in lumbis quam in viris incipiant

cipiant rigores, inde forsan est, quod foemini-  
nis major concessa sit pelvis ossea, & in ea  
uterus locatus, plures nervi hic oriantur quam  
in viris, & ita major proventus hujus succi,  
qui acrimoniam illam irritantem continere po-  
test. Pilos copiosiores nasci in viris quam  
foeminis constans est observatio, præprimis  
quando ad maturam ætatem pervenerint. An  
vero inde major vel minor cutis raritas possit  
probari, non caret dubio: nam pili per cutis  
poros transeuntes, istosque implentes, mino-  
rem raritatem relinquerent, quum spatiola ra-  
ritatem facientia impleantur. Nec video, ex  
qua ratione illa raritas probaret frequentiores  
horrores fieri ex dorso, sed absentia pilorum,  
uti in foeminis, indicaret horrores fieri debere  
ex lumbis. *Gorter.*

## ΑΡΗΟΡ. 70.

Οἱ ὑπὸ περὶ τῶν ἀλίσκόμενοι, ὑπὸ σπασ-  
μοῦ δ' ἅπαντες ἀλίσκονται· ὡς δὲ ἀλίσκων-  
ται πρότερον, εἴτε ἐπιγένηται τετραταΐς, παύ-  
ονται.

Qui quartanis corripuntur, fere con-  
vulsione non tentantur: quod si  
prius corripiantur, deinde quarta-  
na superveniat, liberantur.

Hic aphorismus in l. 6. *Epidem. sect. 6. n. 16.*  
ita legitur: Qui Quartana vexantur, non  
ullo magno aliquo morbo corripuntur: quod si antea  
corripiantur, Quartana succedente liberantur.

Qu

Quæ febres serviant solvendis morbis, & quibus, notatum est ad 2 *aph.* 26. Intermit- tentes quidem, quando rite tractantur, cor- pus a colluvie vitiosorum humorum liberant & expurgant, & purius ac siccius efficiunt. *Hoffm. Med. rat. T. 4. P. 3. p. 16.* At omnium est tutissima Quartana, placidissima, & longissima. *Hippocr. l. 1. Epid. sect. 3. n. 17.* Secundum *River. p. 177.* „ Quartana febris, epilepsiæ „ superveniens, & diu perseverans, eam sol- „ vit: quandoquidem a calore febrili materia „ morbifica sensim absumitur, si pituitosa sit; „ vel si melancholica fuerit, a parte affecta trans- „ mittitur in locum, ubi minera morbi resi- „ det, ut novis paroxysmis materiam suppe- „ ditet”. Ex nullis liquidem febribus ulla magis saluti hominibus est, quam tertiana & quartana, quod etiam vulgo notum est. Hæ si recte percurrant tempora, neque nimis diu perseverent, nec in ætate plane decrepita & viribus consumtis fiant, sanguinem egregie de- purant & obstructions circa mesenterii venas potenter tollunt, nec non humores concretos, congelatos, crassos & viscidos, qui variorum spasmorum causæ sunt, resolvendo, auferunt, & nervos præhumidos exsiccant, nimis reso- lutos ac laxos firmant & roborant, unde *Gulpi* persuasio, quod quartanæ magnum robur in- generent corpori, ut is, qui tertiana vel quar- tana fuerit correptus, intra aliquot annos de- gat liber & immunis ab omnibus morbis. *Hoffm. de sal. febr. §. 30.* Oportet autem, ut quarta- na sit genita, absque lienis aut alterius visceris affectu. Quandoquidem ex liene sæpenumero graviter vidimus, inquit Galenus, homines fe- bre laborasse quartana, ac deinde collecta aqua

aqua inter cutem esse defunctos. Verum ipsa sua sponte quartana absque aliquo visceris affectu, præsertim magno, periculo vacat, neminemque jugulat, ut inquit *Celsus* l. 3. c. 15. p. 146. & ab aliis etiam morbis liberat. Quamvis autem dictum sit ab antiquis, quod quartana sit salubris, neminemque jugulet; id quidem intelligi debet non simpliciter; senes enim magna ex parte interficit, juxta parœmiam vulgarem Italicam, *Quartana el giovane sana, el sene amassa*: nam juxta Hippocratem, senibus si ægritudines diuturnæ fiunt, commoriuntur: inde credo natum proverbium, *Quartana juvenem sanat, senem interficit*. Licet hæc regula non semper sit vera: nam & seniores aliquos curavimus; nisi de decrepitis intelligatur & valde senibus, qui rarius curantur, ob virtutis debilitatem & defectum. Est & apud Italos aliud proverbium, *La quartana non fa sonare la campana*: quod quoque intelligitur de juvenibus & non de senibus; cum senes magna ex parte moriantur, & juvenes curentur. *Forest. Obs. Med. l. 3. obs. 32. schol.*

Quum Convulsio sit morbus ex variis causis natus, atque hinc non habeat antidotum constans, cui omnes ejus species auscultent, ideo incertum quoque est præsagium, an Quartanis correpti non admodum corripiantur convulsione; cum quædam causæ convulsionem inducentes æque generari possint, siue Quartana sit præsens, vel absens. Imo observavi levissimas convulsiones hystericas frequentius fieri in iis, quæ quartana febre laborant, quam in perfecte sanis. Nisi ergo addatur certa convulsionis species ex sua latente causa, non possumus pronunciare, an quartanarius liber mansurus sit a convulsione, vel

vel non. Possunt quædam esse causæ convulsionem inducentes, quæ a superveniente febre quartana subigi possunt, & cum sudore subsequente expelli: sed & sunt plures aliæ causæ convulsionem inducentes, quæ potius per quartanam intenduntur. Quapropter, nisi per multiplicem experientiam constet, quænam species convulsionis a Quartana subigatur, tam diu incerta manebit & hæc prædictio. *Gorter.*

APHOR. 71.

Οἰόσοισι δέρματ' περιτίνεται καρφαλία, καὶ σκληρὰ, ἄνευ ἰδρώτων τελευτῶσιν· οἰόσοισι δὲ χαλαρὰ, καὶ ἀραιὰ, σὺν ἰδρῶτι τελευτῶσιν.

Quibus cutis obtenditur arida, & dura, ii sine sudore moriuntur: at quibus laxa, & rara, cum sudore vitam finiunt.

Desumpta est sententia ex lib. 6. *Epidem. sect. 6. n. 29.*

Inter pessima signa, qua mortem indicant in febribus acutis, est ubi, qui antea molli erat cute, jam est scabra & arida; indicium enim est consumptæ humiditatis. *Holler.* Ut plurimum experimur, instante morte, ex tota facie sudorem guttatim exprimi: ne autem hoc phænomenon expectemus ante quam quis moriatur, hoc aphorismo addisci potest, interdum sine apparente sudore homines mori. Sed ut prædicamus, num prius sudor

dor sit expectandus, vel nullus, indicia ex cute desumenda: nam quibus tota *cutis* est *arida* & *dura*, hi sine sudore moriuntur. Talis est cutis in iis, qui ex marasmo moriuntur consumptis omnibus humoribus; vel & etiam in validissima febre ardente, dum omnes humores in lentorem fuerint compacti, & tamen vehementer tali motu vitali instigato, ita destruuntur solida & consumuntur spiritus, ut æger in vigore febris moriatur. Frequentius autem diminutis viribus & colliquis humoribus homo moritur; in quali statu ante mortem cutis defectu contractilitatis *laxa* est, & tenuitate corrupti humoris undique fit uliginosa. *Gorter.*

## APHOR. 72.

**O**ι ικτερώδεις & πάντες η πνευμάλωδεις ειν.

**Q**ui morbo regio laborant, non admodum flatulenti sunt.

**H**oc est, non infestantur rustibus, torminibus, vel flatibus. Intelligendus est aphorismus de ictericis natura, h. e. de hominibus biliosis, quibus non symptomatice sed naturali habitu bilis diffusa est per totum corpus: huiusmodi enim homines sunt calidi. *Heurn.* Alias icterus, sive a spasmodica contractione ductus choledochi, impeditum in hepate secernendi aut secreti liquidi liberum fluorem supponens; sive a viscida, amurcosa & inerti, vel ab acri, fervida & commota bile nascatur;

Vol. II. N flatuum



flatuum exortui non obstat, quinimo favet. Nam in primo casu bilis in intestina effusio intercepta permittit ut ingesta alimenta sponte fermentando aërem artificialem seu flatum producant; hinc icterus a calculo obstipante exitum bilis in duodenum, atque hepatis scirrhusa induratio irritando flatum producit: in secundo casu fervidior æstus prædicto effectui edendo magis adhuc congrua existit causa. Ictero affectos persæpe flatuosos esse, exemplum adfert ipse Hippocrates l. 3. *Epid. sect. 3.* in historia Apollonii, qui mortuus est ictericus, & tamen, ut ait, *flatibus abundabat*. Præterea ictero tympanitem supervenire non infrequens. Hippocrates igitur minus recte aphorismum hunc protulisse videtur; cuius tamen hic est sensus, ictericos non ita valde flatibus obnoxios esse, quia, juxta divinum senem, flatu a debili calore flunt, & e contra in ictericis biliosus humor, morbi parens, acrem & mordacem movet æstum. Notandum denique, Hippocratem sermoni suo adjecisse, *non admodum*, perpetuitatem quidem negationi sic adimentem, ut observavit Galenus, flatum cum ictero occurrere posse. *Gorter. Combalus. Pneumat. §. 187.*



**HIPPOCRATIS**  
**APHORISMORUM**  
**SECTIO SEXTA.**

**N 2**



# HIPPOCRATIS

## APHORISMORUM

### SECTIO SEXTA.

#### APHOR I.

**Ε**ν τῇσι χρονίῃσι λευεντερίῃσιν ὀξύρεγμῇ ἐπι-  
γενομένη, μὴ γενομένη πρότερον, σημεῖον  
ἀγαθόν.

**I**n diuturnis intestinorum lævitatibus,  
si ructus acidus, qui antea non ex-  
titit, superveniat, bonum est signum.

**L** ib. 2. *Epidem. sect. 2. n. 49 sq.* unde absque  
dubio desumptus est aphorismus, hæc sen-  
tentia legitur hoc modo: *Diuturnis & trabenti-*  
*bus intestinorum lævitatibus, ructus acidus bono est*  
*qui prius non adfuit, qualis Demænetæ contigit. Quem*  
*& arte parare forte licet. Nam & hujuscemodi per-*  
*turbationes, prioris status immutationes afferunt;*  
*forte etiam intestinorum lævitatem acidī ructus sol-*  
*vunt; sanatus est veratri potione.* Quo quidem  
dicendi modo dubitasse videtur Hippocrates,  
an hujusmodi ructus esset bonum signum tan-  
tummodo, an etiam ut causa prodesse posset?  
& an illum provocare expediat? Quia, si ut  
causa juvat, certum est, illum esse excitan-  
dum,

dum, si vero ut signum tantummodo, frustra illum provocamus. Veruntamen si eundem Hippocratem diligentius examinabimus, inveniemus, huiusmodi ructum lientericis etiam ut causam prodesse. Ructus enim acidus facere, & pinguis, & caseosa, & mellita, & ex sesamo parata edulia testatur *lib. de affect. n. 44.* contra eos, qui acidus ructus a frigidis excitari credunt, dum ratiocinationibus nimis intenti, quæ sensibili experimento (quo distante sua quæque docet Hippocrates) dignoscuntur, neque percipere possunt. Prædicta igitur omnia ructus acidus movent, quæ cum calida sint, & difficilis transitus, totis viribus diuturnam lienteriam sanare possunt, nam quatenus calida concoctricis facultatis debilitatem, quæ a frigidityte ortum ducit, corrigunt, quatenus vero tarde descendunt, ipsi symptomati occurrunt, quod in celeriori ciborum descensu consistit. Quibus si turbatio addatur, quam eadem inducunt, hac mediante, fluxioni valde conferunt. Turbatio enim humores ad superiora conturbat, ut navigationis exemplo demonstrat Hippocrates, unde motus ad inferiora retrahitur. Verum si acidi ructus (objiciet aliquis) pro curatione lienterix adeo rationabiles sunt, cur dubitanter hanc sententiam protulit, dum dixit: *fortassis autem licet etiam arte parare?* Quia rationibus nunquam adeo credidit Hippocrates, ut absque experientia aliquod remedium nobis tradere ausus fuerit, & fortasse etiam, quia observaverat, aliquando ructum acidum arte inductum lientericos minime curasse, quippe qui eo casu majori auxilio egerent, quod observaverat in Demæneta, cui ructus huiusmodi supervenientes morbum ex parte

parte levio<sup>re</sup>m fecerunt quidem, veruntamen ad perfectam curationem helleboro opus habuit. Quod etiam ulterius dubitandi occasionem ipsi præbuit, an, sicuti ructus acidi in longis intestinorum lævitatibus supervenientes semper juvant, ita aliquando integram sanitatem afferre possint, & causa dubitandi ex eo provenit; quia hujusmodi ructus lienteriam sanant, aliquando non, sanant, quando neque in ventriculo, neque in reliquis corporis partibus humoris copia viget, quæ morbum foveat, nequaquam vero ubi prædicti humores abundant: quo casu helleboro, aut aliquo alio medicamento sursum purgante pro integra curatione egent, sursum enim in hoc morbo purgandum esse, non deorsum, præter evidentem rationem, quæ id suadet, ut revulsio fiat in contrarium; ex ipsomet Hippocrate colligitur, non solum, quia Demænetam helleboro curavit, qui sursum purgat, sed etiam ex 4 aph. 12. ubi monet in hoc morbo sursum non esse purgandum in hieme: quasi id cæteris anni temporibus communiter faciendum sit. Humores enim ad contrariam partem sunt ducendi, ei scilicet, ad quam symptomatice fluunt, juxta illud 6. Epidem. sect. 2. n. 9. *Diffimilia, si sursum sublata tendant, per inferiora solvere convenit, atque his contraria facere.* Hac eadem ratione in cholera morbo, in qua majus est quod infra dejicitur, quam quod evomitur, helleboro utitur Hippocrates 5 Epidem. n. 4. & in fluxu ventris diuturno, lib. de affect. n. 26. Vid. Martian. p. 464 & 306. Ructus acidus lientericis superveniens signum bonum, non propter aciditatem ructuum, sed propter contractilitatem ventriculi auctam, ad ructus expellendos.

lentos. *Stræm theor. mot. recipr. p. 29.* Nam a labefactata contractilitate ventriculi & intestinorum est lienteria.

Tenax gluten corruptum lateribus intestinorum adhærens suo speciali stimulo in intestinis producit motum ad exonerandum disponentem, & quia simul obstipata a viscoso sunt oscula absorbentia, & tunc simul non fit ille motus vermicularis, qui requiritur ad pellendum chylum in lactea vasa, cuncta quæ tunc egeruntur, non mutata per intestina trajiciuntur & egeruntur. Quia vero talis spontanea corruptio diu perseverare potest, & corruptum tenaciter adhærens lateribus intestinorum, expelli nequit, necesse est, ut talis lienteria interdum duret per multos annos. Constat ita, putredinem chronicam permanentem esse causam lienterix diuturnæ. Ergo ex ructu acido superveniente constare debet, causam hanc ructum producentem tollere posse antecedentem putredinem. In ructu acido duo sunt observanda, primo ructum fieri motu ventriculi inverso, quo truditur aër in ventriculo contentus per œsophagum; & secundo, ut ille aër imprægnatus sit vapore acido. In vetusta lienteria continuus motus erat deorsum, sed quoniam nunc fit ructus, signum est, eum motum deorsum non ita constantem esse, sed quoque incipere sursum; hinc spes est, fieri posse, ut restitua-tur motus peristalticus, qui vicissim operatur sursum & deorsum in intestinis, quali modo agit in sua actione naturali, qua præparantur alimenta; & quia in ordinem redire incipit, signum est, causam priorem, eam propulsionem facientem, incipere minui. Hinc solus ructus, si prius non adsuit, bonum signum præbet.

Sed

Sed si ructus fiat acidus, eo signum est melius; quia ex ructu acido scio, eum nunc hominem, qui tam diu laboravit putredine, nunc laborare acido fermentato, quod generatur ex assumtis vegetantibus per fermentationem in acidum commutatis. nam ructus acidus sine fermentatione in nobis nunquam generatur. Si ergo ructus acidus superveniat, signum est, motum peristalticum in ordinem redire; putredinem cessare; sed laborare hominem morbo ex acido, qui cum possit actione nostri corporis subigi, certe tale signum est bonum. Ex istis facile decernere possumus, an succi vegetantium saponacei acidi ita sint vitandi in diuturna lienteria; an debeamus adstringentibus talem lienteriam compescere; an jura carniū sint danda ad majorem nutritionem, ut multi præcipiunt. *Gorter.*

## APHOR. 2.

Οἱ δὲ ῥῖνες ὑγρόπραι φύσαι, καὶ ἡ γονὴ ὑγρόπρη, ὑγιαίνουσι νοσητέον· οἷσι δὲ πύλαια, ὑγιανόπρη.

Quibus nares natura sunt humidiores, & genitura humidior, ii morbosiore sunt valetudine; at quibus contraria sunt, salubriore.

Quia plurimum genituræ a capite provenit; ut ipsemet Hippocrates *lib. de genitura* n. 3. testatur, hinc fit, ut genitura naturale cerebri temperamentum sequatur: ita  
N 5 ut,



ut, quibus caput, sive cerebrum natura humidum est (hoc indicant nares sæpe fluentes, quas humidiores appellat), iis genitura humidior est, & hi (subjungit statim) morbosius sanæ degunt, hoc est vitam ducunt non solum morbis obnoxiam, sed in tempore sanitatis valetudinariam; his vero contrarii, firmiori, & stabiliori valetudine utuntur. Quod quidem indicat, quantum ad corporis valetudinem conferat capitis optima dispositio, quod summa cum ratione morborum radix appellatur. Et hic est germanus præsentis aphorismi sensus; alium tamen Hippocratem habuisse indicant ea, quæ *lib. 6. Epid. sect. 6. n. 37.* leguntur, unde forsan aphorismus desumptus est, hunc in modum: *Quibus nares natura humidiores, & semen genitale humidius ac copiosius, ii minus salubriter degunt. Plurimi autem, quibus ex morbo istud accidit, contra se habent.* Quorum verborum sensus est. Eos, quibus multa e naribus ex natura erumpunt, & ex consequenti cerebrum humidius habent, & genituram pariter humidiores, & copiosiores emittunt, eos imbecilles esse & valetudinarios. Qui vero tales sunt, non ex natura, sed ex morbo, eos saniores esse, indicant enim hæc expultricis facultatis robur, quæ humores noxios facile a se excutit. Addidit vero *plurimi*, quia hæc regula non omnibus fortasse competit. *Martian. p. 464.* Debiliore fruuntur ac morbosa sanitate & morbis sunt obnoxii, qui fibrarum syntaxi donantur laxa; contrarium autem dicendum, si nares post morbum humidæ, quia signum est solutionem fieri salubrem. *Valles.* Ergo humidum, de quo agit Hippocrates hoc loco, est malum sanis, bonum ægris. *Holler.*

Omnes

**Omnes fere Commentatores cum Galeno per**  
*genituram* intelligunt semen virile, & inde ex  
 ejus majore humiditate præfagium formant.  
 Ego autem puto, genituram in h. l. non no-  
 tare semen, sed partes genitales tam virorum,  
 quam mulierum, quoniam γονή æque notat par-  
 tes genitales quam semen, & hoc loco agitur  
 de naribus humidioribus, non vero de muco  
 humidior: itaque conveniens est, ut hic quo-  
 que accipiantur partes genitales, non vero se-  
 men. Propterea concipiendum est, Hippo-  
 cratem intellexisse humiditatem partium geni-  
 talium utriusque sexus. Quæ humiditas in his  
 partibus eodem modo, ut in naribus, oritur  
 ex laxitate & deficiente motu in partibus his.  
 Quamvis vero inde non sequatur, ut inde ho-  
 mo aliquo morbo dicatur laborare, quum tam  
 levis sit partis affectio, ut non mereatur mor-  
 bi nomen; attamen non est perfecta sanitas,  
 tam ratione signi, quam ratione causæ; sæpe  
 enim fit, ut, si quadam in parte conspiciatur  
 debiliior actio, etiam in reliquo corpore actio  
 habeatur languidior, maxime si duobus simul  
 in locis talia signa inveniuntur, uti hic in par-  
 tibus genitalibus & naribus. Atque humores  
 his in locis stagnantes, minus commoti, sensim  
 corrupti & minus præparati traduntur commu-  
 ni circulationi, ubi totam massam inficiunt hu-  
 more crudo & leviter corrupto, qui quidem  
 actione vitali emendari potest, sed tamen inde  
 non fruitur ille homo perfecta sanitate. Si ve-  
 ro partes, quæ ex natura sunt laxiores & uli-  
 ginosæ, modice siccæ inveniuntur, signum est,  
 huc confluentes humores ita attenuari, ut per  
 insensibilem perspirationem evolent: nam actio  
 validior in his partibus non solum propter ma-  
 jorem

jorem concitatum calorem ex hoc motu, & promptiorem expulsionem minuit hujus partis humiditatem, verum etiam reducit per vasa absorbentia & venosa eam humiditatem, quæ alias ibidem subsisteret. Hinc ratione signi & causæ harum partium siccitas modica est bona, quum notet actionem valentem, & non permittit, istos humores stagnando corrumpi. *Gorter.*

### APHOR. 3.

**Ε**ν τῇσι μακροῖσι δυσεντέρεσσιν αἱ ἀποστίαι  
κακόν, καὶ σὺν πυρετῷ, κἀκρον.

**I**n longis intestinorum difficultatibus  
cibi fastidia malum denuntiant, &  
cum febre pejus.

**E**xstat hic aphorismus in *lib. 6. Epid. sect. 8.*  
*n. 1.*

Quando per morbosam aliquam causam deletur famis sensus, etiamsi in corpore habeatur alimenti defectus, qui naturaliter in nobis famem excitat, proprie vocatur inappetentia; sed quando simul capienda alimenta aversionem pariunt, *fastidium*, ἀποστία, dicitur. Experimur fastidium fieri, si motus ventriculi fiat inversus, ut in nauseosis, vel quando aliquid putrefactum in ventriculo hæret. Si ergo aliquis fastidiosus fiat, signum est, ventriculum consentire & putrefactum quoque in eo hære. Dysenteria autem est morbus intestinorum, & fastidium morbus

morbus ventriculi : ergo causa mali latius est dispersa, quod malum est. præterea per fastidium designatur, dysenteriam abiisse in putredinem, quæ commutatio quoque est mala. Denique corpus per dysenteriam ita exhaustum nunc privatur simul suo naturali nutrimento, quod amissum restaurare debebat. Hoc in longis dysenteriis periculosum est, quarum causa est constans. Si dysenteria *cum febre* incepit, & tamen non cessat dysenteria, signum est, febrem non valere causam dysenteriae superare & expellere: interim tam longa fuit facta evacuatio, ut vires vitæ per imperfectam crisin fuerint exhaustæ; quare vix ulla spes superest curationis. Si vero in principio non adfuerit febris, sed postea superveniat, talis febris vel accenditur per consensum ex motu perturbato intestinorum, vel ex translatione materiæ ex cavo intestinorum ad organa circulatoria. Utrumque malum est. Nam motus febrilis in organo circulatorio per consensum concitatus non compescet motum turbatum intestinorum, neque emendabit corruptos humores in intestina confluentes, verum utraq; hæc potius augebit. Si humor corruptus ex intestinis, ubi est scaturigo in dysenteria diuturna, feratur ad organa circulatoria, tunc simul tota massa sanguinis hoc putrefacto infecta citiorem interitum minabitur. Recte ergo ait Auctor, *cum febre pejus*, quoniam latiore consensum & translationem indicat, quam quæ observatur a sola apostitia superveniente. Gorter.

APHOR.

## APHOR. 4.

Τὰ περιμάθηρα ἔλκεια, κακοῦργα.

Ulcera undiquaque glabra, maligna.

Eadem verba leguntur in *lib. 6. Epid. sect. 8. n. 2.*

Ulcera circumglabra dicuntur, ex quorum ambitu & circa illorum labia pili decidunt, neque iterum renascuntur. Notantur acres, erodentes, succi. *Tozzi*. Aliæ etiam partes glabræ dicuntur, si squamulæ epidermidis secendant & quasi politam superficiem relinquant. Sed præcipue tunc habentur glabræ partes, si earum superficies obducta sit mucō tenaci, ac si esset pinguedo corrupta tenax parti adhærens. Hæc ultima species an sit concipienda ac si solummodo haberet in ambitu glabritiem, an vero etiam in ulceris cavitate, disputari potest; nam si ulcus ipsum & ejus margines sint glabræ, tale ulcus quoque circumglabrum dici potest. Talia nunc ulcera pronunciantur maligna, quia designant, hic colligi corruptos humores, & difficilem curationem admittunt. Si enim pinguedo naturalis circa partem exulceratam hærens corrumpitur, illa vel abit in ichorem tenuem, qui cuncta, quæ tangit, liquefacit, ut inde squamulæ epidermidis decendant & pili defluant; vel abit in tenacem & corruptum mucum, qui omnem consolidatio-

nem

nem impedit. Monemur ergo, quam diu videmus ulcera circumglabra, nos non posse expectare curationem, sed transitum in majorem malignitatem. Hinc omni ope tentanda est emendatio & ablatio corrupti per externa abstergentia antiseptica applicata, & per interna, quæ usus docuit summo opere cohibere progressum putredinis. *Gorter.*

## APHOR. 5.

Τὰν ὀδυνέων καὶ ἐν πλευρῇσι, καὶ ἐν στήθεσι,  
καὶ ἐν πῖπν ἄλλοισιν (μέρεσιν), ὡς μέγα  
διαφέρουσι, καταμαρτυροῦν.

Dolores & in lateribus, & in pectore, & in cæteris partibus, num multum differant, perdiscendum.

Hic aphorismus primo aspectu Hippocraticæ dignitatis minimum retinere videtur. Quis enim Medicus adeo negligens est, qui dolorum vehementiam, aut majorem, aut minorem non consideret, cum præsertim ægrotantium querelæ ad hujusmodi considerationem compellere etiam invitum possint? Quare dicendum est, præsentem aphorismum idem naufragium cum aliis multis incurrisse, ob negligentiam illius, qui eos collegit. Nam clariori, & veriori sensu ita legitur *lib. 6. Epid. sect. 7. n. 83: In doloribus laterum, pectoris, aliarumque partium, tempora num multum inter se differant, animadvertendum est, quando nimirum melius,*  
*aut*

*aut rursus pejus habeant, nihil in hoc delinquentes.* Sententia quidem aurea, qua admonemur repentinæ doloris sublevationi non esse fidendum, nam sæpe paulo post derepente, nullo errore accedente, sæviores repetunt: quare ut fida sit alleviatio, paulatim, & per sua tempora fieri debet; & quamvis hæc sententia in omnibus verificetur, magis tamen in doloribus laterum, & pectoris contingit, ab hujusmodi enim partibus non cito, & facile infixus humor discutitur, quemadmodum si in alvo, aut ventriculo peccet. *Martian. p. 464.* Quin, ipsa doloris idea, magnitudo, æqualitas vel inæqualitas, tum assiduitas vel intermissio, cujusmodi sit ea partis afflictio plane ostendit, medentemque docet, quomodo se gerere debeat in ejus curatione. Sic e. g. *Dolores lateris in febribus æqualiter ibi & absque signis subsistentes, venæ sectio lædit, quamvis aversum a cibis animum, ac sublatum seu tumidum hypochondrium æger habeat.* *Coac. sect. 3. n. 342.* In quo textu pro *in febribus* fortasse melius *sine febribus* legitur. Nam lateris dolor cum febre non ita respuit venæ sectionem, quam sine febre. *Duret. in Coac. p. 371.* Sive autem in citata Coaca emendationem *Dureti* optes, sive retineas lectionem communem (quam defendit *Martianus p. 590.* intelligens dolores lateris a matéria tenui & biliosa ventriculum obsidente, non admodum fixos & stabiles, sine signis doloris per excellentiam pleuristici seu lateralis dicti, quos ut purgatio sive alvi excretio juvat, ita phlebotomia lædit, quia sanguine misso, humor noxius tenuitate peccans adhuc tenuior redditur, & accedente febre, tenuitas augetur, & acrimonia.) illud manet ratum, Medici prudentis esse, distinguere dolores

dolores ab invicem, quo felices muneris sui  
successus expectare possit.

## APHOR. 6.

Τὰ νεφριτικά, καὶ ὁποῖα κατὰ τὴν κύσιν ἀλ-  
γήματα, ἐργαδῶς ὑγιάζεται τοῖσι πρὸς  
εὐτησί.

Renum, & vesicæ vitia in senibus  
ægre curantur.

In lib. 6. Epid. sect. 8. n. 4. hæc leguntur: *Re-  
num vitia supra quinquagesimum annum sanata  
non vidi.*

Senes renum & vesicæ morbis obnoxii sunt,  
juxta 3 aph. 31. Difficulus autem sunt sanabi-  
les, quia ætas senilis excrementis & cruditati-  
bus abundat, quibus vitia illa augmentum ca-  
piunt; & quia vasa habent angustiora, rigidio-  
ra, quæ non favent perficiendis coctionibus.

Omnes morbos nephriticos, ut sunt renum  
infarctus, inflammationes, exulcerationes, do-  
lores ex calculo, difficilius in senioribus sanari  
experientia confirmat. Nam sicut læsiones &  
exulcerationes internarum partium, propter  
humorum intemperiem & excrementorum  
abundantiam, quæ in provectiori ætate incre-  
scit; ita etiam, quæ renibus & vesicæ inhæ-  
rescunt, propter urinæ ingentem acrimoniam,  
difficillime ad sanationem perducuntur. Hoffm.  
*Med. rat. T. 4. P. 2. p. 367.*



## APHOR. 7.

**Τ**ὰ ἀλγήματα πὰ κατὰ τὴν κοιλίαν γινόμενα, πὰ μὲν μετώρα, καφόπρα· πὰ δὲ μὴ μετώρα, ισχυρόπρα.

**D**olores qui ad ventrem fiunt, sublimes quidem, leviores: non sublimes vero, vehementiores.

**S**ublimes dolores hic dicuntur extimi & superficialiorem attingentes; non sublimes, intimi. Illi, in abdominis musculis, mitiores; hi, in visceribus, vehementiores. Ita censent omnes auctores, qui sequuntur expositionem Galeni. Gorterius vero putat, si voluisset Auctor illam doloris differentiam indicare, quod dixisset dolores externos & internos. Neque etiam illa sententia ubique vera inveniretur, quia in partibus externis æque vehementes dolores oboriuntur, etsi minus periculosi, quam in partibus interioribus. Quare credit per μετώρα tales dolores intelligi debere, qui ventris (abdominis nimirum) inflationem seu elevationem faciunt, quando nempe per dolores intenditur venter, quasi flatibus distenderetur. Si enim causa dolorem faciens valide agit, eo majorem dolorem facit, quo fibra magis manet renitens, quando talis pars simul non tumet, sed in sua constrictione persistit: si vero fibra dimittant tensionem, pars ea tumere incipit, & tunc fit doloris lenimen: quod podagrici

saepè

sæpe experiuntur. Hoc omnino verum est in ventris doloribus, si motu inordinato intesti-  
norum producitur aër artificialis, cujus expan-  
sio impeditur per validam fibrarum tensionem,  
immanis fit dolor: si vero relaxatis fibris aër  
permittitur expandi, statim mitefcit dolor.  
Hinc calida & humida, quæ fibras laxant, ap-  
plicata cum ventris intumescencia leniunt do-  
lores.

## APHOR. 8.

Τοῖσιν ὑδρωπικοῖσι πᾶ γινόμενα ἔλκεα ἐν σώ-  
ματι, ἔ ρηϊδίως ὑγιάζονται.

**H**ydropicis orta in corpore ulcera;  
non facile sanantur.

**B**ene Celsus l. 3. c. 21. p. 161. *Communis,*  
inquit, *omnium hydropis specierum est humoris*  
*nimia abundantia: ob quam ne ulcera quidem in his*  
*aegris facile sanescunt.* Quia nempe indefinenter  
affluens serum prohibet sanationem. Nam in  
genere & axiomatis instar practici habendum  
est, omnia ista ulcera, quæ ex causa prove-  
niunt interna, & magna succorum serosorum  
impuritate sustentantur, nunquam fere non dif-  
ficilis esse sanationis. Hoffm. Med. rat. T. 4.  
P. 5. p. 258.

## APHOR. 9.

**Τ**ὰ πλατὰ ἐξανθήματα ἔ πάνυ π κνησμών-  
δεα.

**E**fflorescentiæ latæ non admodum pruriginosæ.

**D**esumpta videtur hæc sententia ex lib. 6. *Epid. sect. 2. n. 52.*

Hujus generis pustulæ seu exanthemata notant succos minus acres, qui acriores magis in profundo latentes pustulas creant fastigiatas.

## APHOR. 10.

**Κ**εφαλῇ πνέοντι, καὶ περιωδυνέοντι, πύον, ἢ ὕδρω, ἢ αἷμα ῥυέν κατὰ τὰς ῥῖνας, ἢ κατὰ τὸ στόμα, ἢ κατὰ τὰ ὦτα, λύει τὸ νέησµα.

**C**apite dolenti, ac vehementer laboranti, pus, aut aqua, aut sanguis per nares, vel os, vel aures effluens, morbum solvit.

**I**n genere omnis doloris cephalici causa, a liberiori & æquabili sanguinis per vasa sanguifera, quibus cutis capitis, pericranium, ipsaque dura mater instructa sunt, progressivo  
&

& circulari motu impedito, tanquam a fonte derivatur. *Hoffm. Med. rat. T. 4. P. 2. p. 190.* Ubi itaque fientibus evacuationibus, in aphorismo memoratis, accumulatorum circa caput humorum, reddita libera sanguini circulatio est, doloris cephalici contingit solutio; quæ pluribus apud Hippocratem locis memorata est: *Coac. sect. 2. n. 21. 25 sq. 59. de Judicat. n. 12. de salub. diat. n. 14. lib. 7. Epid. n. 30. lib. 2. de morb. n. 4. 12. 16. lib. 3. de morb. n. 2. Conf. Cels. l. 2. c. 8. p. 70.*

Capitis dolor ex impetu majore natus optime liberatur narium hæmorrhagia, quæ minuendo sanguinis copiam majorem, simul conpescit illum majorem impetum & inde natum dolorem. Sed circa finem morborum acutorum, si per metastasin ad caput delata est materia purulenta, aut quando in interioribus capitis fuerit exulceratio capitis dolorem inferens, sæpe observavi, puris evacuatione per aures homines fuisse liberatos, interdum etiam per os & nares: sed minus frequens per hæc emunctoria eliminatur pus. Humor autem serosus acris, capitis dolorem inferens, sine multo discrimine per tria hæc emunctoria eliminatur. *Gorter.*



## APHOR. II.

**Τ**οῖσι μελαγχολικοῖσι, καὶ τοῖς νεφριτικοῖσι  
αἰμορροΐδες ἐπιγινόμεναι, ἀγαθόν.

**M**elancholicis affectibus, & renum  
vitiis supervenientes hæmorrhoi-  
des bonum.

**I**isdem fere verbis aphorismus hic legitur in  
*lib. de Judicat. n. 10.* ubi interpretes Corna-  
rius & Foësius, contra textum græcum, pro  
nephriticis posuere phreniticos.

Melancholici sanguine spisso & atro vix meabili  
donantur, unde stases; nephritici fiunt a stasi vel  
congestionem sanguinis ad renes. Superveniens  
ergo hæmorrhoidum fluxus solvet morbum, quia  
tollit causam; derivando sanguinem deorsum,  
unde spasmus vasorum oppletotum solvuntur.  
Aphorismus non dicit fluentes, sed supervenien-  
tes vel *succedentes* hæmorrhoides: nam sufficit  
quandoque, etiam citra evacuationem, mutata di-  
rectio peccantis humoris. *Hecquet.* In melanco-  
lia attulit sæpe curationem superveniens tumen-  
tum valde hæmorrhoidum fluxus. *Boerb. aph.*  
**1110.** Nephritis sanatur hæmorrhoidibus ini-  
tium morbi large fluentibus. *Ibid.* 996. Hoc ita-  
que Naturæ consilium in avertendis his morbis  
Medici merito imitari debent, & vel hæmor-  
rhoïdes ad fluxum perducere, vel pedum venas  
aperire. *Hoffm. Med. rat. T. 3. p. 238.*

APHOR.

## APHOR. 12.

Αἱμορροΐδας ἰηθέντι χρονίας, ὡς μὴ μία φυ-  
λαχθῇ, κίνδυνος ὕδρωπα ἐπιγίνεσθαι,  
ἢ φθίγειν.

Hæmorrhoidas diuturnas fananti, nisi una fervetur, periculum est ne hydrops, aut tabes superveniat.

A Celso l. 2. c. 7. p. 62. hic aphorismus ita scribitur: *Si ora venarum, sanguinem fundere solita, subito suppressa sunt, aut aqua inter cutem, aut tabes sequitur.*

Ora venarum in ano, αἱμορροΐδας Græci vocant, si mediocriter & cum sanitate hominum sanguinem fundant, tantum abest, ut in morbis hæmorrhoides istæ ponendæ, multo minus suppressendæ sint, sed ut salutare potius quam plurimis reputari atque adeo naturæ vigori ac beneficiis accenseri debeant, quæ hac ratione sanguinem abundantem & noxium per intervalla e corpore expellit. Siquidem tum insigniter sæpe a variis noxis, cum primis malo hypochondriaco, melancholia, renum morbis, mania, podagra, asthma, ischiatico malo corpus levatur atque excitatur. Ubi vero nimis magna copia sanguinis ex his venis ex ano profluit, ita ut ægri vires amittant, periculum utique videtur, ne paulatim corpus cum egregio virium detrimento exhauriatur, vel hydrops inde sequatur: ita ut opportuna

tum curatio instituatur, ipsa renum necessitas postulat. Atque Veteres quidem, ubi medicamenta adstringentia parum proficiebant, escharotica imponebant; ferramentis candentibus urebant; capitula turgentia, si aderant, exigua cum basi tenui, lino adstringebant, atque sic eorum casum procurabant, vel, si essent illa majora cum basi latiori, paululum supra basin incidebant, loco qua capitulum incisum erat, acum immittebant, infraque eam lino id capitulum alligabant. Vid. *Hippocr. lib. de hæmorrhoid.* & *lib. de Vict. acut. n. 67. Cels. l. 6. c. 18. n. 9. & l. 7. c. 30. n. 3. Paulus l. 6. c. 79. Aëtius l. 14. c. 5.* Recentiores autem, vel ipsa experientia magistra, didicerunt, veterem hanc curandi rationem, præsertim quæ igne instituitur, non nimis tantum crudelem esse, sed & plerumque prorsus perniciosam; & rectius plerumque facere, qui aut nullam prorsus ad hæmorrhoides fluentes curationem adhibent, si præcipue mediocriter ipsæ fluunt; aut, si justo largius sanguis effunditur, saltem nonnisi ab internis, eisque non adstringentibus, cum primis fortioribus, sed temperantibus solum medicamentis sanitatis præsidia repetunt: non neglecta sanguinis abundantis per venas detractio. Si nihilo tamen minus operatio requiritur chirurgica ad sistendum largius sanguinis profluvium: tunc ante omnia sanguis multus per venam detrahitur; deinde alvus lenibus ac temperatis remediis ducitur, aliaque idonea remedia a Medico ordinantur, ac denique sex vel quatuor ante operationem horis, ad eluenda atque exhaurienda intestina, clyster sive lotio adhibetur: ac his factis, venæ hæmorrhoidales vel filo ligantur, vel forfice

fice rescinduntur, vel erodentibus applicatis exeduntur aut obturantur. Vid. *Heister. Chir. p. 1111 sq.* Quia vero magno beneficio sunt sanitati hæmorrhoides, prospiciendum, ne omnes abscendantur aut obturentur, sed saltem una servetur, quæ purganti se naturæ emissario sit, hoc enim penitus occluso, ad vasa majora remeans sanguis, creabit hydropem, aut tabem. *Hecquet.* Plura alia incommoda creari ab importuna hæmorrhoidum sanatione, memoratum legimus apud Hippocratem *lib. de humor. n. 11. lib. 6. Epidem. sect. 3. n. 65. l. 5. n. 10. & lib. 4. n. 31.* In præsentī tamen aphorismo duorum tantum meminit tanquam frequentiorum, hydropis inquam scirrhus in hepate, a crasso sanguine ibi conculcato, & tabis, sanguinis sputo intercedente. *Martian. p. 465.* Qui evacuabatur per vasa hæmorrhoidalīa & excerni ibi locorum cum euphoria debebat sanguis crassus, jam vero non excerni amplius potest, in hepar regurgitat, ibique ob languidiorem motum spissior factus, excitat infarctus, indurationes, & facile scirrhum producit, unde generatur hydrops. Ita Trajanus Imperator, ex retentione hæmorrhoidum asciticus factus & curatus, sed recidivam passus mortuus legitur apud Dion. Cassium. Vid. *Hoffm. Med. rat. T. 4. P. 4. p. 439.* Phthisis autem seu tabes creatur post suppressum hæmorrhoidum fluxum, a redundante sanguine vasa pulmonum infarciēte, distendente, rumpente, unde hæmoptoe, & hinc phthisis.



## APHOR. 13.

Τὸ πὸ λυγμῶν ἔχομένῳ παρμῶν ἐπιγενέμενοι,  
λύει τὸν λυγμόν.

**S**ingultu detento si sternutamenta accedant, singultum solvunt.

**C**elsus l. 2. c. 8. p. 69. ita habet: *Singultus sternutamento finitur.*

Ratio, quia motus singultus est stomachi elevatio, quem sternutatio aliquantum deprimat, alioque motum divertit. Primo enim ex ingesto nimium cibo oriri singultum videmus (præcipue in pueris) unde stomachi extensio. Acidus quoque cibus & potus vellicando stomachum eundem causatur, cessatque hic motus aut divertendo aut spiritum detinendo. Prius fit in sternutatione, alterum patet ex eo, quod spiritus detentus ex parte singultum tollit. Idem senties converso ad seria animo, uti vulgo fieri solet; & aceto naribus admoto aut gargarisato, qui adstringit motumque spirituum inhibet. *Baco H. N. §. 686. Videtis etiam Aristot. Probl. sect. 33. n. 1. & 8. Sternutatio est convulsio, & motus oppositus singultui. Hinc tollitur etiam cachinnis, terrore, & iracundia, quibus nervi quodammodo in tonum, & tensionem rediguntur. Brin. de spir. an. p. 348. Proxima singultus causa est materia lædens, a qua irritata ventriculi facultas, ut noxium expellat, motum illum facit, quæ quidem materia,*

ria, sternutatione superveniente ventriculum concutiente, ab ejus fibris discutitur, quibus inhærens singultum faciebat: sicque cessat singultus. Quæ quidem ratio omnibus singultus speciebus convenit. Nam & qui ab hepatis, aut ventriculi inflammatione dependet, proximam causam habet materiæ præsentiam, a qua facultas ventriculi irritatur: qua quidem per sternutationem discussa cessat singultus, etiamsi non in totum auferatur, remanet enim affectio, a qua nova materia genita singultum denuo movet. Quare summo artificio dixit Hippocrates *singultum solvunt*, ut indicaret, sternutationem quidem singultum quemlibet sedare, morbum autem, & causam illius non semper in totum auferre. *Martian. p. 465.*

Est singultus convulsio momentanea inter gulam & abdomen, sedem habens in parte ventriculi nervosissima, ubi nempe os ejus superius committitur diaphragmati, sub inspiratione contingens cum sonora aëris per os explosione. Vel: si violenter diaphragma contrahitur, & thorax dilatatur, aër magni vi, nec sine strepitu, in pulmones impellitur, singultus fit; juxta *Hoffm. Med. rat. T. I. p. 124.* Sternutatio fit convulsis musculis abdominalibus & intercostalibus omnibusque partibus expirationi dicatis, cum forti ac subita aëris inspiratione ejusque paulo post valida ac subita expiratione vehementer concutiente partes in thorace & abdomine contentas. Ergo ab vehementi concussionis motu in sternutatione fiet discussio materiæ, vel mutatio oscillationis, unde erat natus singultus.

Singultus a leviori causa exortus sine medicamentis sæpius feliciter sistitur, quando videlicet

licet sub motu thoracis magis voluntario ipsum diaphragma cogatur, adeo ut fibræ ejus motrices tendantur vel relaxentur. Illud fit fortiori inspiratione, per cursum, per saltum, per vehementem equitationem; hoc vero per expirationem fortiolem, per vociferationem, & si thorax fascia, seu zona constringatur; quod simplex & extemporaneum sæpe est remedium. Et hujus generis est sternuratio, quæ uti spontanea singultum tollit, ita Naturæ bene operantis minister, Medicus, arte eam provocare debet; & maxime, quando vel lenta & in flatus abiens materia ventriculi tunicis aut partibus proximis inhærescit, ad eam ipsam per vehementem expirationem, dum viscera abdominis & inprimis ventriculus vehementer conquatitur, dejiciendam: minime vero sternutatio arte producta locum habet, ubi inflammatio vel subtilis caustica virulenta materia, altius nervosis partibus sese insinuaverit *Hoffm. Med. rat. T. 4. P. 3. p. 437.*



APHOR.

## APHOR. 14.

Υπὸ ὕδρωπ<sup>Ⓢ</sup> ἐχομένῳ, τῇ κατὰ πᾶς φλέ-  
 βας εἰς τὴν κοιλίαν ὕδα<sup>Ⓢ</sup> ῥυέν<sup>Ⓢ</sup>,  
 λύσις.

**A**b hydropē detento, ubi aqua se-  
 cundum venas in ventrem fluxe-  
 rit, solutio fit.

**H**æc sententia legitur iisdem fere verbis in  
*Coac. sect. 3. n. 289. sed in lib. de Judicat.*  
*n. 11. h. m. In aqua intercute detentis, si aquosus*  
*humor per venas in alvum aut vesicam effluat, solutio*  
*contingit.*

Intelligi debet aphorismus de anasarca & leu-  
 cophlegmatia seu hydropē ad vasa aut secun-  
 dum venas apud Hippocratem dici solito, eo  
 nempe hydropis genere, ubi suis vasis serofus  
 latex adhuc continetur; qui *secundum venas* per  
 arterias lymphaticas *in alvum* effluens seu eructa-  
 tus & per anum evacuatus solvit morbum, jux-  
 ta 7 *aph. 29.* Oportet autem, uti non longe  
 a morbi principio id contingat ægroti bono an-  
 tequam partium tonus labefactatus sit, juxta  
 monitum Hippocratis l. 2. *de morb. n. 69.* Con-  
 ferantur annotata ad 7 *aph. 29.*

APHOR.

## APHOR. 15.

**Τ**ὸ διάρροιας ἐχομένῳ μακρῆς, ἀπὸ πτυπ-  
μάτης ἐμετῶ ἐπιγεγόμενῳ, λύει τὴν  
διάρροϊαν.

**L**ongo alvi profluvio detento, spon-  
tanea accedens vomitio, alvi pro-  
fluvium solvit.

**D**esumitur videtur aphorismus ex lib. 1. de  
morb. n. 6. ubi habetur: *Vehementi alvi  
profluvio detento, succedens vomitus bono est.* Cel-  
sus l. 2. c. 8. p. 69. ita reddidit: *Longas dejectiones  
supprimit vomitus.*

Fit revulsio materiæ morbificæ in contrariam  
partem; & illa revulsio ostendit naturam refi-  
ci, ac vires resumere. Ut enim Medicus eo-  
rum, quæ ad partem aliquam fluunt, retractio-  
nem molitur; ita natura, cum prævalere inci-  
pit, humoris ad partem affectam confluentis  
revulsionem facit, dum illa pars refici ac ro-  
borari incipit. *River. p. 283.* Itaque vomitus  
solvit diarrhœam mutato impetu, quo deorsum  
irrumpebant succi, non ineunte morbo, sed  
cum jam materia prava vacuata est. *Heurn.*  
Hinc magnum nomen meruit Ipecacuanha in  
inveteratis diarrhœis. *Hecquet.* Alvum coactam  
vomitio solvit, & plus æquo fluidam sistit, il-  
lam quidem humectando, hanc vero siccando.  
*Hippocr. l. 2. de diata n. 36.* Vomitus evacua-  
tionem sedat. *de loc. in hom. n. 45.* Hinc in in-  
tenso

tenso lumborum dolore & alvi subductione largiore, sumto veratro, spumoforum crebra vomitio prodest. *Coac. sect. 3. n. 7.* Cætero, aphorismi veritas non videtur universalis. Quod si enim alvi profluvium diuturnum nascatur ex humorum colliquatione per totum corpus, qui continuo deponuntur ad intestina, vel ex debilitate intestinorum, qua assumpta sponte permittuntur corrumpi in intestinis, vel a vitiata bile, quæ omnis ex vesica fellea evacuari nequit, vel per ductum hepaticum continuo deponitur, his omnibus in casibus & in multis aliis vomitus si accedat, augebit morbum: minuetur quidem quantitas dejectionis, sed totus ille compositus morbus fiet gravior. Si essent signa indicantia hanc vel illam latentem causam proritare diarrhœam diuturnam, aliquid certi ex superveniente vomitu hauriri posset; sed quoniam hæc signa admodum sunt ambigua, nihil certi ex vomitu superveniente deduci potest. *Gorter.*



APHOR.

## APHOR. 16.

**Υ**πὸ πλευρίτιδος, ἢ ὑπὸ περιπνευμονίης  
ἐχομένην διάρροια ἐπιγνομένη, κακόν.

**M**orbo laterali, aut pulmonum inflammatione conflictato, succedens alvi profluvium, malum.

**I**n lib. I. de morb. n. 6. eadem sententia legitur ita: *In morbo laterali aut pulmonis inflammatione detento, aut suppuratum thoracem habenti, alvus perturbata, malo est.*

Pleuritis & peripneumonia sanguinis sunt stases inflammatoriæ, pulmonibus & pleuræ insidentes, sputis solvi solitæ: diarrhœa vero superveniens subtrahit futura sputis pabula, unde pulmones arefcunt, & acribus succis depasti, necrosin concipiunt. *Hecquet.* Secedente enim per inferiora humore, superiora siccescunt, neque sputum per superiora repurgatur. *Hippocr. l. 3. de morb. n. 17.* Malum inquit aphorismus, non letale, ut significet aliquos servari eorum, qui non admodum graviter laborent, hæc est enim proprietas vocis malum, ut indicet, ægrotantis conditionem deteriorem reddi, quod quidem in diarrhœa superveniente duplici ratione contingit, primo quia sputum suppressit, quæ sola tuta via his morbis recte terminandis censetur: qua quidem ratione omnis inferna purgatio in hujusmodi affectibus a  
præ-

præceptore damnatur *lib. 3. de morb. n. 22.* quando morbus jam firmatus est, & sputum procedere incepit (*Jam vero biliosa expuenti, medicamentum ne exhibueris. Si enim exhibueris, sputum per superiora prodire minime poterit, &c.*); ex quo fit, etiamsi diarrhœa his morbis superveniens semper suspecta sit, eo tempore tamen, quo sputum nondum apparuit, non adeo malam censendam esse, imo aliquando observatum est, prædictis morbis per sputum sufficienter expurgatis, adhuc febrem perseverare, quæ tandem per supervenientem alvi subductionem in totum ablata sit. Nocet secundo diarrhœa superveniens antequam concoctus sit morbus, communi illa regula: nullam evacuationem a principio factam salutarem esse posse; quia talis evacuatio non a natura recte operante, sed a vi morbi naturam exagitante ortum ducit, unde, cum per eam nec tollatur nec minuat morbus, de hoc casu dici poterit: Critica non judicantia, partim letalia sunt, partim difficilis judicii. Non prætereundum est *lib. 1. de morb. n. 6.* ubi eadem sententia legitur, additum esse *aut suppuratum thoracem habenti*, & jure merito: quia præter causas relatas, quibus hæc evacuatio mala est, pessima est suppuratis, qui a superveniente alvi fluore frequenter e medio tolluntur. *Martian. p. 466.* Conf. *5 aph. 12.* Ergo mala hic diarrhœa ut causa, quia non juvat, symptomatrica enim est, vires debilitans; ut signum, quia notat, ventriculum & intestina esse in consensum tracta. *Sebiz. Exerc. Path. T. 1. p. 244.* Etenim, non qualia purgari oportet, purgantur, juxta *1 aph. 2.* Cæterum vero ignorari non debet, quod in recenti pleuritide & peripneumonia

*Vol. II.* P ali-



aliquando divertat materia ad intestina, nec tamen lædat hujusmodi alvi profluvium; imo judicet. *Holler. & Valles.* Quinimo ipse Hippocrates 3 de morb. n. 17. ita præcipit: Primis quidem quatuor aut quinque diebus, paulo magis alvum subducere oportet, quo febres retundantur, & dolores leniantur; & n. 22: Si æger natura biliosus fuerit, & minime purgatus morbo correptus sit, prius quam biliosum sputum exspuat, medicamento etiam bilem probe purgato. Observatum vero quoque est, alvi fluxus etiam tardius evenientes salutarem tulisse opem. Juvenis annorum viginti, affectus pleuritide, summa cum spirandi difficultate, valida pressus tussi, nihil exspuebat, febre interim indies augescente, extreme postremo imbecillis, dum moriturus credebatur, oborto citato alvi fluxu sub decimum quartum diem, sanitati restitutus est. Vid. *Valleriol. Obs. l. 1. obs. 4.* Puer octo annorum pleuritide gravi cum febre acutissima laborans, sine sputo ullo procedente, tussi validissima infestante, difficili ac præfocativo spiritu, & cum stertore emisso, tum etiam delirio, & clamoribus horrendis: & convulsione tandem secuta, summaque virium defectione, pro deplorato habitus, pro rogato in vigesimum diem morbo, profluvio alvi circa id tempus oborto, eoque copioso, incolumis evasit. *Ibid. obs. 5.*



APHOR.

## APHOR. 17.

Ὁ φθαλμιῶντες ὑπὸ διαρροΐης λεφθῶσαι,  
ἀγαθόν.

**L**ippitudine laborantem alvi proflu-  
vio corripere, bonum.

**E**xcerptus est hic aphorismus ex *lib. de Judi-  
cat. n. 12. & Coac. sect. 2. n. 133.* Celsus  
*l. 2. c. 8. p. 69.* eum ita expressit: *Omnis dejeccio  
lippienti prodest.*

Ratio est, quia fit revulsio a supernis deorsum  
materiæ sive humoris ophthalmiam facientis.  
Debet ergo Medicus naturam imitari, cum illa  
morbum sanat. *Cardan. p. 622. Conf. Duret. in  
Coac. p. 120.* Enim vero optime caput ab hu-  
morum affluxu liberant laxantia, vel etiam pro-  
circumstantiarum ratione purgantia. Et Gale-  
nus gravis testis est, nonnullos, quibus oculi  
inflammati, sola purgatione per alvum una die  
sanatos. *Hoffm. Med. rat. T. 4. P. 1. p. 525.  
Conf. 6 aph. 31.*



## APHOR. 18.

Κύστιν διακοπὴν, ἢ ἐγκέφαλον, ἢ καρδίαν,  
ἢ φρένας, ἢ τῶν ἐντέρων πὶ τῶν λεπίδων, ἢ  
κοιλίαν, ἢ ἥπαρ, θανατῶδες.

Cui vesica perfecta fuerit, aut cerebrum, aut cor, aut septum transversum, aut tenue quoddam intestinum, aut ventriculus, aut jecur, letale est.

In Coac. sect. 3. n. 387. scriptum est: Ex vulnere autem fere mors contingit, si cui vulneratum fuerit cerebrum, aut spinalis medulla, aut jecur, aut septum transversum, vel cor, aut vesica, aut quædam grandis vena. Eadem etiam habentur l. 1. de morb. n. 3. & ibid. n. 7. dicitur, quod nervus præcisus non coalescat, neque vesica, neque aliquod ex tenuibus intestinis, neque vena multum effundens sanguinem.

Letalia pronunciantur vulnera vesicæ, cerebri &c. partium organicarum. Sed hoc assertum magna restrictione eget: observatum enim, homines hisce vulneribus supervixisse. Hippocrates ipse lib. 2. Prædict. n. 19 sq. Vulnera autem, ait, fere quidem mortem afferunt, quæ magnas venas, quæ sunt in collo & inguinibus, læserunt, deinde quæ cerebrum & hepar, deinceps quæ in intestina & vesicam pertingunt. Quæ sane omnia magnam perniciem afferunt, non eam tamen, ut (quod quidam existimant) nemo ex bis servari possit. Nam & bis nominibus prædicti loci multum inter se differunt,

runt, atque ipsi modi. Nec parum etiam cujusque corporis constitutio differt. Incidit enim interdum, ut neque febre, neque inflammatione tentetur sauciatus, interdum etiam nulla ex causa febricitat, nec aliquam corporis partem inflammatio prorsus occupat. — Ex cujusvis generis vulneribus homines mori contingit. Multæ namque in corporibus venæ tum tenues tum crassæ, si eo sponte sua ferri contingat, sanguinis profusione interimunt, quæ si alio tempore pertundantur, utilitatem afferunt. Non pauca autem vulnera, quæ in contemnendis locis, ac nulla re formidabilia esse videntur, in iis tanto dolore plaga cruciat, ut ægri respirare nequeant. Quidam vero præ vulneris dolore, quod nullo merito terreat, spiritum quidem traxerunt, delirio tamen ac febre perierunt. Quibus enim aut corpus ad febrem est opportunum, aut mens prompte perturbatur, iis talia contingunt. Ex quibus arguere licet: vulnera, quæ in uno homine mortem adferunt, in alio sanari; &, vulnera letalia evadere posse, quæ ex sua natura talia non sunt, ex constitutione nempe corporis in sauciato, propter funesta symptomata, quæ superveniunt, & sanguinis profluvium. quare etiam concludit Hippocrates, quod ex cujusvis generis vulneribus contingat, ut homines moriantur. Sic v. g. parvum vulnus, quod nemo letale dixerit, mortem inferre potest in corpore per phthisin exhausto. Si itaque letale intelligas pro eo, ex quo moritur æger, nulla non essent vulnera vocanda letalia. Distinctionibus uti oportet ad dirigendum circa letalitatem vulnerum judicium. 1. Dicuntur vulnera *per se*, seu *simpliciter* & *absolute* letalia, quæ nulla arte sanari possunt, sed inevitabili necessitate mortem inferunt. Talia sunt: ubi læsum est tale vas, vel viscus, quod sine cir-

culatione sanguinis sublata lædi non potest, v. g. si aorta mox ex pericardio egrediens discissa fuerit, aut cor profundius vulneratum, &c. Quæ influxum nervosi liquidi a cerebello in cor intercipiunt; quo pertinent læsio medullæ oblongatæ, & compressio aut corruptio ejusdem a cruore intra cranium effuso, item læsio aut præcisio nervorum cardiacorum, &c. Quæ respirationem integre tollunt, abscissa arteria aspera, insigniter læsis bronchiis, perforatis thoracis cavitatibus cum admissu aëris, vulneratis item mediastino, atque diaphragmate; maxime in tendinea ejus parte, &c. Quæ chyli ex ventriculo & intestinis transitum ad cor tollunt, vulneratis ventriculo, intestino tenuiori, ductu thoracico, œsophago, &c. Quæ inflicta partibus, ex quibus emanans cruor, aliufve humor, bilis, urina, chylus &c. derivatur in loca, unde educi nequit.

2. Vulnera *per se* & *sibi relicta* letalia, arte vero curabilia, si Chirurgus in tempore adveniat: v. g. sunt vulnera encephali terebra levanda, vasorum majorum, ad quæ datur manui chirurgi accessus, &c.

3. Vulnera *casu* sive *per accidens* letalia; culpa Chirurgi, vel ægri, & temperie hujus seu naturali seu morbosa. Vid. Boerh. aph. 150--153. & 170--172. Heister Chir. p. 50 seq. Hebenstr. Anthrap. for. p. 344. 357. Sollet aliquando letalitas vulneris definiri per tempus, intra novem dies, & , si intra hunc terminum vulneratus moriatur, mors tunc fuisse dicitur effectus vulneris. Sed prudentiores in judiciis de ejusmodi rebus ferendis Medici, probe edocti, non semper ad letalitatem constituendam sufficere mortis celeritatem, nec ad eam tollendam, tarditatem, arbitrantur; neque

que letalitat̃is vulnerum rationem a tempore insequutæ mortis determinandam, sed ab ipsius partis læsæ nobilitate & vulneris conditione, aliarumque circumstantiarum diligenti pensitatione petendam esse pronunciant. Vid. *Hebenstr.* l. c. p. 362. Exempla vulnerum absolute letalium post sex septimanas demum mortem inferentium videri possunt in *Eph. N. C. vol 5. obs. 140. an. 6. obs. 123. Conf. Wolf. Obs. p. 8 seq.*

Nunc ostendendum est, cum quibus restrictionibus vulnera in præsentī aphorismo recensita, letalia appellari queant.

Sectio *vesicæ* letalis est, quæ fit in superiori ejus seu membranacea parte, quæ alias vocatur fundus vesicæ; nam tunc non modo intestina statim per vulnus exeunt, sed & urina in cavum abdominis influit, putrescit, & hominem sic interficit. Non autem esse letalem, si fundus vesicæ evitatur, inciso tantum vesicæ corpore, super ossibus pubis nimirum, in spatio quod est inter ossa pubis & peritonæum, monstrat lithotomiæ illa species, quæ vocatur methodus Franconica seu apparatus & sectio hypogastrica. Nec est letalis sectio in collo vesicæ, ut fit in lithotomiæ apparatu dicto magno, & in methodo laterali. Neque letalis est vesicæ punctura seu punctio non solum in perinæo sed etiam in hypogastrio instituta ad educendam in ischuria urinam. Vid. *Heister. Chir. p. 914. 925 sq. 942. 957. 984. 1006. & conf. Hebenstr. l. c. p. 562.* Miles plumbea glande ictus, cum effracto pubis osse, vesicam habuit summe dilaceratam; cujus tamen vulnus ad cicatricem perductum est. Vid. *Tulp. l. 4. c. 30.*

De Cerebro rarissime contingit, ut vel exiguo vulnere tactum mortis causam non adferat, corpore partim resoluta, partim convulso. *Cardan. p. 625.* Notabile tamen est, quod nulla cerebri vulnera, si modo stagnantibus humoribus exitus mature possit concedi, in se sint letalia, quod ingens clavus salva vita per caput & cerebrum canis, modo non sinus cerebri vel medulla oblongata tangatur, transfigi possit. *Hoffm. Med. rat. T. I. p. 466 §4.* Vulnera quidem Duræ matris haud vacant discrimine: & singulis diebus exempla ante oculos habemus, ubi minima punctio, in parte adeo exquisito sensu prædita, inflammationem, febrem, delirium, mortemque accersiverit. Quamobrem Albucasis magnopere caveri jubet, dum membrana hæc ab osse separatur, quod terebræ ope facile fieri posse inquit; & quo omnis ejus offensa vitetur, marginem quandam instrumento aptari imperat, quæ id nimis alte descendere prohibeat: quod inventum postea, alis instrumento adjunctis, Fabricius ab Aquapendente in melius mutavit: neque dubitari potest quin omnis ista circumscriptio in operatione perquam necessaria sit. Utcunque id est, haud modo vulnera in iis membranæ hujus partibus, quæ vasis sanguiferis paulo grandioribus vacant, facta novimus, sed membranæ quoque particulas ab ea separatas, ac materiam, quæ vel sub ea vel in duplicatura ejus jacet, eo pacto effusam, integritate postea ægris reddita. Quodque validius argumentum est, etiam cum aliquid ex ipsa cerebri substantia prodierit, homo aliquando ad sanitatem perductus est. *Freind. H. M. p. 260.* Ruptis meningibus, ut conspectui pateret cerebrum, cujus

cujus & dein portio non exigua exempta fuit, cum in putredinem tenderet, puer arte sanatus legitur in *Eph. N. C. Vol. 4. obs. 90.* Alia exempla sanatorum, quibus de substantia cerebri aliquid ablatum fuit, vid. apud *Blank. Coll. Cent. 3. obs. 43. & 72. Hildan. Cent. 1. obs. 13. Helw. Obs. p. 63.* Cardanus *l. c.* ex Brasavolo refert de quodam, cui in cerebro vulnerato tanta cerebri substantiæ quantitas exivit, quantum est gallinæ ovum, & tamen evasit: licet deinceps probe loqui & expedite non potuerit, stupidus quoque & ineptus reliquo vitæ spatio, quod tamen triennium non excessit, supervixit. Et de milite *ibid.* legitur, cui ferme capitis dimidium cum sua cerebri portione ablatum fuit, convaluitque: sed neque recordabatur, nec loqui poterat, sed stupidus nihil ad proposita respondebat, stercus & urinam demittebat in lecto, nec comedebat, nisi quæ in os imponerentur, infantis omnino mores habens. Conferri merentur scripta ab Ill. Ellero, in *Hist. ac. sc. Berol. 1752. p. 306 sq.* item *J. C. Teubeleri Diss. sub præsidio A. E. Buchneri, de vulneribus cerebri non semper letalibus. Halæ 1740. 4º.*

De Corde palam est, non plerumque solum, sed semper vulnera ejus mortem afferre. *Cardan. p. 624.* Si cordis substantia, præsertim ad cavitates penetrante vulnere, læsa sit, celerissime mortem inferri necesse est. *Hoffm. Med. rat. T. 2. p. 48.* Vulnera cordis mortalia sunt, non quia cor vulneratum est uti pars, & membrum vitalia principia producens, sed uti pars, quæ debebat fluida vitalia in gyrum impellere: dissoluta enim vasorum, cavitatumque cordis textura, quæ recipere, & repellere fluida vita-



lia debent, consequenter cessare etiam debet in ipsis fluidis motus, ac proinde vita. *Bagliv. p. 276. Conf. Hebenstr. Anthropol. for. p. 480. Sanatum cordis vulnus, ventriculos ejus non penetrans, vid. in Wolf. Obs. p. 90. Miles quidam, vulnere in cavitatem cordis penetrante, ut ex cadaveris dissectione patuit, cum insigni inflammatione dies novem superstes fuit. Alius vulnerato dextro ventriculo ad sextum diem spiravit. de quo Bartholinus H. A. Cent. 1. hist. 77. vid. Rhod. Cent. 2. obs. 39. De pericardii vulneribus non letalibus legatur idem Rhodius Cent. 1. obs. 38.*

*Septi transversæ* vulnera absolute letalia statuuntur, maxime si ea inflicta fuerint parti ipsius tendineæ; quia ejus actio requiritur ad respirationem, illoque agere cessante viscera abdominalia trudentur in thoracem, & sic expansionem pulmonum impediunt. Interim observatum est, hominem diaphragmate vulnerato, globo sclopetario, per octo annos incolumem vixisse, qui post strenuum in castris Veneris conflictum, dyspnœa laborans, materia purulenta rejecta, mortuus est. In ejus cadavere pulmones sani inventi, nisi quod alterius lobi margo tenerior justo, & carni maceratae similis diaphragmati adhæserit, & apertis ad sensum tubulis, in foramen diaphragmatis, pugnum fere admittens, hauerit, per quos materia illa purulenta pulmonibus ab aëre incumbente impacta & tussi rejecta fuit. A vulnere diaphragmati olim inflicto ulcus hic & vomica generata fuit, quæ foramen diaphragmatis tantisper occlusit, & aëri interno viam interceptit, donec a rupta vomica pureque rejecto foramen redintegratum spirandi effecit difficultatem.

tatem. *Valent. Polychr. exot. p. 78.* Diaphragma, ob vasorum, arteriarum, nervorum, ac venarum, quibus omnibus phrenicis nomen est, copiam, hinc ob summam suam, in qua semper est, tensionem motumque illum perpetuum, sine quo respiratio atque vita stare nequeunt, vulnera accipit periculosissima, & prout cadunt, absolute letalia. Posset vulnus inter infimas costas inflictum pulmones præterire, atque in carneo septi limbo subsistere; tali vulnere, si solum est, nisi a causa aliqua interveniente, nemo interit; quamvis enim summa respirandi difficultas tunc sit, & fere suffocatio; attamen, cum vasa ibi dissecta sanguinem copiosum haud fundant, nec tendo ibi sit, majorve nervus, ex symptomate magis, quam ex vulnere, si quis perit, moritur, paraphrenitide scilicet aut septi inflammatione, quam repetita solvere potuisset sectio venæ, cum aliis pharmacis gangrænam cohibentibus. Ast, si vel tendo diaphragmatis, vel, qui illum perforat, oesophagus in os ventriculi superius excurrans, simul læsus est, vel vasa, vena cava, quæ dextra parte per septum adscendit, vel aorta, inter crura diaphragmatis prope vertebrae lumborum descendens, vel nervi majores septo proprii, vulnerantur, sique propinqua viscera, hepar a dextris, lien a sinistris, læsa simul fuerunt, atque etiam, si solus diaphragmatis tendo læsus est, mors evitari haud potuit. Est etiam incruenta aliqua diaphragmatis læsio, quæ, ex tremore & convulsione occidere potuit, si, ob inflictum scrobiculo cordis, veluti dici solet, seu regioni epigastricæ, ictum, mors consecuta est, quæ de necessitate evenisse tunc dicitur. *Hebenstr. l. c. p. 496.*

*Intestina*

*Intestina tenuia* vulnerata mortem inferunt, quoniam tunc nec excrementa continere possunt: nec, si non contineant, consolidari, nec si transmittant, perpetuo supervivere homo potest. Ob id si quid horum ita vulneretur, interit homo ferme semper. *Cardan. p. 627.* De jejuni vulnere latiori, sola pulveris terebinthinæ coctæ adpersione, & strictiori diæta sanato, est observatio apud *Blegny Zod. an. 1. p. 6.* Ileus intestini insignes portiones ablatae mulieri superstiti; *ibid. an. 3. p. 57.* De vulnere ilei, cum hiato per inguen dextrum permanente, non letali, historia est in *Eph. N. C. vol. 3. obs. 71.* De ileo in hernia incarcerationa gangræna affecto, post integumenta cultello chirurgico dissecta, denudato, aperto, fundente interdum assumpta per vulneris aperturam, ægra tamen superstita, legi potest *ibid. vol. 9. obs. 3.* Equidem vulnera intestinorum tenuium, licet summe periculosa sint, curam quandoque recipiunt, si vulnus amplum est, ut consui intestinum possit, cum possibile est, vulnus dilatare & intestinum læsum ad oram vulneris externi adducere, inque illo glutinare. Hæc vero opportunitas ægroto non ubique favet, sed, etiamsi vulnus patens est, si intestinum totum præcisum fuit, & tubus ejus in abdomen hiât, atque sua contenta illuc dejicit, nisi Deus, nemo hoc vulnus sanabit. Omnis denique spes evanescit, si, cum intestino, membrana quoque, qua illud vincitur atque colligitur, mesenterium scilicet, vel mesocolon, fauciantur. Intestinum duodenum, quod ventriculi continuus tubus est, atque sese ab ejus ostio inferiore ad usque mesocolon exporrigit, a quo principium jejuni ducitur, ita absconditum

tum sub hepatis sinistro lobo ponitur, ipsiusque ventriculi fundo subjacet, ut, nisi his perfossis, fauciarum nequeat, adeoque absolutam, si læsum est, letalitatē adfert; deinde, in se spectatum, spem curæ aliquam facere propterea nequit, quoniam ex ejus vulnere & ventriculi liquida omnia & utraque bilis, tam, quæ ex hepate ipso, quam, quæ ex vesicula fellea descendit, & liquor ille, qui ex pancreas, mediante ductu pancreatico, ad duodenum tubum vehitur, in cavum abdominis effunduntur, ibidemque putrescunt letaliter. *Hebenstr. l. c. p. 345. 539.* Exemplum ilei intestini discissi, auxilio futuræ perfuncti legi potest in *Phil. Transf. vol. 50. p. 35.* Conf. *Franc. Mery Quæst. An tenuium intestinorum vulnus letale? Paris. 1734. 4º. Haen. Rat. Med. P. 7. p. 174 sqv.*

Vulnera ventriculo inflicta, alia sunt letalia, alia non; pro loco nempe illius, cui illata fuerint. Leve vulnus orificio ejus sinistro seu superiori inflictum solet esse letale, nam ibi est imprimis sensibilis ab insignes nervos circa illud intrantes. Ubi stomachus (summum scilicet ventriculi os) percussus est, singultus & bilis vomitus insequitur: si quid cibi vel potionis assumptum est, id redditur cito: venarum motus elanguescunt: sudores tenues oriuntur; per quos extremæ partes frigescent. *Cels. l. 5. c. 26. n. 15.* Letalia etiam sunt vulnera magna ventriculi, quæ efficiunt ut humores ejus in cavitatem abdominis effundantur; item si arteriæ ejus lædantur in forti ejus contractione, quæ tunc multum sanguinis in dictam eructant cavitatem. Sunt vero multæ annotatæ observationes, quæ testantur alia ventriculi vulnera non letalia. Sic de vulnere ventriculi ultra undecim

undecim annos aperto, superstitute viro, legi potest in *Eph. N. C. D. 2. a. 5. obs. 1.* Extat *Aug. Wenckeri Dissertatio inaug. sistens observationem rariorem de virgine, ventriculū per viginti tres annos perforatū, alente. Argentor. 1735. 4<sup>o</sup>.* Prodiit postea Pars Dissertationis hujus altera, quæ inscribitur: *Christiani Wencker Diss. inaug. sistens virginis per viginti septem annos ventriculū perforatū alentis historiam & sectionem. Argentor. 1743. 4<sup>o</sup>.* Nata erat perforatio ex rupto abscessu. De ulcere ventriculi, in regionis. epigastricæ latere sinistro patente, per quietem curato, est in *Eph. N. C. vol. 3. obs. 52.* A spica hordei deglutita perforatus ventriculus, illa per formatum in latere abscessum exitum sibi parante, vulnus vero sponte naturæ sanatum est. Vid. *Journ. Sav. 1688. P. 2. p. 343.* Alia exempla foraminum in ventriculo sponte naturæ consolidatorum, ex sectionibus cadaverum relata sunt *ibid. p. 360.* Ligula (instrumentum ferreum exacuendis cultris apud lanios destinatum) deglutita, perforato ventriculo prodiit per excitatum in hypochondrio dextro abscessum, & homo sanationem recepit: qui idem postmodum deglutiit cultrum vaginæ inclusum, quem hiatu facto paulo supra & ad latera vertebrarum lumborum, terram ligone versans, exclusit, sanusque iterum evasit. Vid. *Blegny Zod. an. 1. p. 87.* Jo. Jessenius *Relationem* dedit *de rustico Bohemo cultrivorace*, quæ extat cum *Dunc-Liddellii Arte Medica, Hamb. 1628. 8<sup>o</sup>.* excusa. Historia ibi describitur de deglutito cultro, qui applicatis ventriculo suppurantibus, post nonum mensem ex inguine egressus est. Dicitur vulgo rusticus ille cultrivorus Pragensis. Anno 1658. Moguntiae in Germania, ancilla qua-

quadraginta circiter annos habens, sub delirio melancholico-hypochondriaco mortem sibi consciscendi animo deglutivit cultrum octo transversos pollices longum, qui per decem hebdomadam & quinque dierum spatium in ventriculo delitescens, in latere sinistro per abscessum sponte naturæ factum extractus est, ægra perfectæ sanitati restituta. Vid. *Com. Litt.* 1743. p. 127. Est historia rustici Poloni, a filio D. Ericii Puteani visa. Agrestis homo tentaverat sibi anguinam in gutture aperire, brevi cultro, quem incautus deglutivit, eundemque tandem dextro abdominis latere, cum multo pure, postque multas anxietates reddidit, & incolumis supervixit. — Ambrosius Paræus refert de quodam, quem latrones coëgerant deglutire cultrum, quem dein fospes reddidit per apostema lateris. Vid. *Helmont.* p. 476 *sqv.* De cultro deglutito per apostema in abdomine factum protracto, in puero cultrivoro Halensi Saxonico, vid. *Eph. N. G. D.* 2. a. 10. o. 1. & p. 419. & *Wolfg. Christoph. Wefener der Hällische Messer-Schlucker.* Hal. 1692. fol. Præterea novimus cultros deglutitos e ventriculo exsectos, patientibus operationi chirurgicæ superstitibus. Duæ nempe extant historiæ, quæ utræque contigerunt in Prussia. Altera est de cultrivoro Prussiaco communiter appellato, quam descripsit Medicus qui operationem direxit, Daniel Beckher, hoc titulo: *De cultrivoro Prussiaco observatio & curatio singularis, decade positionum, variis variarum observationum historiis refertarum, illustrata.* Regiom. 1636. 4°. Recusus est libellus hicce *Lugd. Bat.* 1638. 8°. & iterum 1640. 8°. cui tertiæ editioni accesserunt testimonia, similesque aliquot admirandæ

randæ curationes. Relatio de hoc cultrivoro, sine dictis accessionibus, prodit etiam germanico idiomate, auctore eodem, cum hac epigraphæ: *Historische Beschreibung des Preussischen Messer-Schluckers. Regiomonti 1643. 4º. & extat in Cbr. Hartknochii Chronico Prussæ (vernacule Alt und Neues Preussen) Francof. & Lips. excuso 1684. fol. pag. 349--355. Conf. Eph. N. C. D. 2. a. 8. obs. 167. Altera historia concernit cultrivoram Warmiensem (in Prussia) an. 1720. a Medico Henr. Bernh. Hübnero feliciter curatam, qui de hoc casu edidit Relation von der Ermlandischen Messer-Schluckerin. Regiom. 1720. 4º. & de eodem legi possunt Bibl. German. T. 3. p. 260. Bresl. Samml. 1720. Jul. p. 96.*

Possunt ex vulnere ventriculi convalescere illi maxime, quibus plenus, cum vulnus acciperet, ventriculus fuit; nam vomitu facto, rejectisque contentis, in se contractus crispatusque, suum vulnus ille claudit. Hinc valida muscularis ventriculi tunica glutinari, clauso manente vulnere, atque applicari medicina ore infusa potest, imo vasa sanguiflua per planum superius ambulancia, etiam majuscula, si dissecta sunt, contracto in sese ventriculo, contineri possunt, ac vomitus, tanquam ejusmodi vulneris symptoma solemne, valida ventriculi contractione, ipsum vulnus magis claudere posse videtur. Præterea, si victus servatur tenuis, si vena aliquoties secatur, si emulsa, cum nitri particula, parvis haustibus, deglutiuntur, si colon ægri enemate repletur, sanari poterit, qui vulnus, intactis partibus aliis, solo accepit ventriculo, potestque, si in cura commissum aliquid est, quod vulnus exasperare potuit, vel ex neglectu, vel ex causa

causa aliqua alia interveniente, defunctus esse perhiberi, qui vulnus tale accepit. Sed, nisi cibo potuque repletus est ventriculus, attingi ille, a vulnere, visceribus aliis simul haud læsis, nequit, cum, si vacuus est, sub hepatis lobo sinistro, atque musculis abdominis rectis sternum attingentibus, alte sit reconditus. Nemo adeoque vellet excusare ventriculi vulnus, quod simul vel hepar, vel lienem, vel diaphragmatis carneam partem in alterutro latere transfodit. Opus etiam est, quo illi, qui ex vulnere ventriculi sanari potuisse dicitur, adfuerit euphoria & symptomatum remissio. Quod si autem nullo medicamine vomitus, singultus, cardialgiæ, motusque convulsivi impediri potuerunt, si ista symptomata a vulnere accepto ad mortem usque duraverunt, etiamsi vulnus in funere visum magnum non est, vasa magna dissecta haud sunt, sanguis in cavum abdominis haud confluit, mortem tamen necessitate absoluta attulisse læsio videbitur, quia causa mortis alia haud adest, symptomata letalia ex vulneris natura fluunt, & quoniam ex vulnere ventriculi, in cavum abdominis atque inter intestinorum circumvolutiones, alimenta ante assumpta effusa fuerunt, quæ sua putredine mortis causam simul attulerunt. *Hebenstr. l. c. p. 534 sq.* Denique allatis hactenus superaddamus casum rarum, qui doceat, vulnera ventriculi non omnia letalia esse, licet consolidationi non auscultent. Reperitur in *Diom. Cornarii bistor. admir. p. 37.* (quæ prodire cum *Ejusd. Consiliis Medicinalibus. Lips. 1599. 4º.*) his conceptus verbis: „An. 1566. in Bohemia „rusticus quidam in venatione ictus est ve- „nabulo lato in stomachum, sub *καρδια*, seu  
*Vol. II.* Q „ ejus



„ ejus orificio. Vulnus hoc letale & amplum,  
 „ nulla arte, vel consilio consolidari potuit,  
 „ paulatim vero labia vulneris tractu temporis  
 „ occalluere, ita quod vulneratus per annos  
 „ plures supervixerit. Hic vero tandem se-  
 „ cundum artem instrumentum quoddam vul-  
 „ neri applicavit, interdum drupis & pannicu-  
 „ lis lineis hiatum vulneris infarsit, & ita af-  
 „ fabre obturavit, ut, quum vellet, stoma-  
 „ chum per supernas partes elueret, & cibos  
 „ ac potus ingurgitatos ex stomacho per vul-  
 „ nus emitteret, quando liberet ”.

*Fecoris* vulnera, etiam magna, teste Galeno, non prorsus mortalia sunt, imo præcisa extrema parte effatu digna aliqui supervixerunt: quoniam in his neque præ dolore, neque ob aliud mors, quam ob sanguinis exitum, contingit. *Cardan. p. 626.* Vulnera hepatis inflicta ægerrime sunt sanabilia, quia non contingere possunt sine læsione vasorum sanguiferorum; gibba tamen ejus superficies vulnerata consolidari interdum patitur, si non alte penetraverit vulnus, & extravasatus sanguis deferatur per poros bilarios in ductum choledochum & ex hoc in intestinum duodenum, ut per anum evacuari queat: at cava hujus visceris pars, utpote majoribus & pluribus donata vasis, judicari solet letalis, quia sanguis in abdomen effusus putredinem induit; cui malo accedit, quod ibidem stagnans ægre educi queat. Vid. *Hebenstr. l. c. p. 546, 550. C. F. Kaltschmied Diss. de vulnere hepatis curato, cum disquisitione in letalitate vulnerum hepatis. Jenæ 1735. 4º.*

APHOR.

## APHOR. 19.

**Ε**'πὶ διακοπῇ ὁστέον, ἢ χόνδρον, ἢ νεῦρον,  
ἢ γνάθου τὸ λεπτόν, ἢ ἀκροποδίην, ὅτε  
αὐξεται, οὐκ ἐξυμφύεται.

**O**s cum perfectum fuerit, aut carti-  
lago, aut nervus, aut genæ tenuis  
particula, aut præputium, neque auge-  
tur, neque coalescit.

**P**aulo aliter hæc scribuntur in *Coac. sect. 3.*  
n. 381 sq. *Præcisus nervus, aut quod in gena  
est tenue, aut præputium, non coalescit. Neque cor-  
poris os quodcunque resectum, neque cartilago augetur.*  
Apud *Celsum* l. 5. c. 26. §. 3. malum dicitur  
vulnus, quodcunque musculum, aut nervum, aut ar-  
teriam, aut membranam, aut os, aut cartilaginem  
læsit.

Partes dictæ, quæ sat inconsulte vocari con-  
suerunt spermaticæ seu similes, nec augen-  
tur, nec coalescunt juxta hunc aphorismum.  
Vulnera illarum vel sociam habent propriæ sub-  
stantiæ deperditionem seu jacturam, dum ab  
illis aliquid abscissum; vel integra manente par-  
tium substantia, simplices continui sunt solu-  
tiones. Si jactura substantiæ facta fuerit, re-  
sarciri nisi cicatrice rudi, vel incomptâ nequit,  
interposita solum succorum quasi farragine, qui  
decurtatis vasorum extremitatibus adscititiæ  
appendices facti, legitimas quæ periire partes  
non restituunt, at suppleant spurias. Si facta  
fuerit

fuerit tantum textûs scissura, difficilis fiet co-  
 litus, hincque ulcera & fistulæ, nervosarum  
 partium adeo familiares. *Hecquet.* Si coalitus  
 disunitarum partium est difficilis, haud eas coa-  
 lescere, non dici potest. Quam ergo verita-  
 tem præsens nobis narrat aphorismus? Non-  
 ne vulnera illis inflicta partibus quotidiana fere  
 experientia consolidari constat, effuso nempe  
 ex vasis cuique parti propriis, vel ad illam de-  
 finentibus, humore illi in unitate solutæ rursus  
 connectendæ apto? *Ossa* fissa, fracta, dissecta,  
 coalescere rursus, docet *Heisterus* in *Chir.* p.  
 216 sq. Albucasis, scriptor Arabs, in errore  
 eos versari contendit, qui *cartilaginem* vulnere  
 divisam coire rursus non posse asserunt. Vid.  
*Freind. H. M.* p. 270. Vid. etiam *Heister Chir.*  
 p. 216 sq. & *Hebenstr. Anthrop. for.* p. 472. De ner-  
 vis dubitari potest an coalescant. „ Nam quo-  
 „ ties nervus aliquis præcisus fuit, rigidum pro-  
 „ tinus, amissoque sensu tabidum redditur illud  
 „ membrum, in quod nervus ille discissus exten-  
 „ ditur. Ut adeo mirum non sit, statim exspi-  
 „ rare illos, quibus nervi ad cor septumque  
 „ transversum transeuntes dirumpuntur. Pe-  
 „ riculofum quoque vulnus est, ubi nervus ali-  
 „ quis nonnisi ex parte fuerit incisus. Quic-  
 „ quid enim in fibrillis læsum est, retrahitur,  
 „ contra vero quicquid integrum in illis est,  
 „ nimium quantum distenditur: unde fieri haud  
 „ potest, quin acutissimi dolores & spasmi,  
 „ convulsiones item, inflammationes & gan-  
 „ græna, quin & ipsius quandoque mortis pe-  
 „ riculum suboriantur”. *Heister ibid.* p. 47.  
 Suturae forte beneficio nervi penitus discissi  
 coalitum promoveri, innuere videtur experi-  
 mentum in cane captum, quod est in *Sculptet.*  
*Armam.*

*Armam. p. 494. & aliud in homine, recensitum in Bresl. Samml. 1722. Decemb. p. 685. Conf. Eph. N. C. D. I. a. I. obs. 124. De genæ, & præputii ut partium cutanearum vulneribus consolidandis rescire volentem Scriptores Chirurgici non destituent.*

## APHOR. 20.

Ἡν ἐς τὸ κοιλίῳ αἷμα ἐκχυθῇ πρὸς φύ-  
σιν, ἀνάγκη ἐνπυθῆναι.

**S**i sanguis in ventrem præter naturam effusus fuerit, ut in pus vertatur necesse est.

**I**n lib. 1. de morb. n. 3. sententia hæc legitur in hunc modum: *Quod si sanguis ex vulnere aut vena in superiorem ventrem fluxerit, id in pus verti necesse est*: quæ quidem indicant, quid per ventrem intellexerit aphorismus, & quid hoc verbum *suppurari* significet. Non nego tamen eum, qui aphorismum collegit, longe clariorem & fideliorem sententiam transferre potuisse. *Martian. p. 467. Clarius loquitur Hippocrates lib. de flat. n. 17. Sanguis in alienum locum effusus, mora computrescens in pus vertitur. Ita etiam sanguis in pulmonem effusus, in eo putrescit, cumque putruerit, pus facit; l. I. de morb. n. 10. Vid. ibid. n. 12. & 15. De sanguine item, qui in utero quinque aut sex mensibus moratus fuerit, scribitur, quod ibi putrescens in pus vertatur; in lib. de nat. puer. n. 7. Celsus aphorismum ita red-*

didit *l. 2. c. 7. p. 62*: *Si in ventrem sanguis confluit, ibi in pus vertitur.*

Intellige, quod sanguis in ventrem seu cavitatem aliquam corporis ex vulneratis vasibus effusus putrescat; quod suppurare vocat Hippocrates ut videre est *l. 1. de morb. n. 11*. Hinc præceptum apud *Boerh. aph. 236*: Sanguis in cava corporis per vulnus delapsus inde occlusus educendus situ corporis, suctu per fistulam, si recens, vel dilutus primo, apertura vulneris dilatata, vel nova.

### APHOR. 21.

**Τ**οῖσι μαινομένοισι, κισσῶν, ἢ αἰμερροΐδων ἐπιγενομένων, τῆς μανίης λύσις.

**I**nsanientibus si varices, aut hæmorrhoides accesserint, insanientiæ solutio fit.

**A**pud *Celsum l. 2. c. 8. p. 69*. hic aphorismus ita scribitur: *Varix ortus, vel per ora venarum subita profusio sanguinis, vel tormina, insaniam tollunt.*

Omnes maniaci a supervenientibus varicibus, aut hæmorrhoidibus liberantur, facta revulsione humoris maniam facientis ad inferiores partes. *Martian. p. 467*. Intellige varices, i. e. venas ultra consuetum dilatatas & in tumorem elevatas, in cruribus. Nam hi varices indicant impetum sanguinis a capite ad crura & pedes conversum fuisse, atque uti adscensus violentus

tus sanguinis ad caput ejus venas distendit, easque varicosas reddit; ita si iidem humores ad inferiores partes se convertunt, iidem varices in iis generant, atque tunc varicibus internis & superiorum partium succedunt externi & inferiorum partium, quod bonum est, & insaniam solvit, translata humorum copia a partibus nobilioribus ad ignobiles. *Fric. Parad. med. p. 114.* Hæmorrhoides tanquam varices quoque sunt. *Lister.* Varices, aut hæmorrhoides, profunt etiam vacuando nihil; sed sufficit dum vel determinatio fuerit sanguinis facta mutata, & sanguinis stasis a parte nobiliori ad ignobiliorem translata. *Hecquet.* Phreniticis varices, vel hæmorrhoides fluentes profunt. *Boerb. aph. 779.* Maniæ frustra tentatæ per omnia remedia, varix, hæmorrhoids &c. accedentes, salutaria fuerunt. *ibid. 1124.* Conf. *Hoffm. Med. rat. T. 4. P. 4. p. 205.* Sideratis (apoplecticis) succedentes hæmorrhoides utiles. *Hippocr. Coac. sect. 3. n. 318.*

## APHOR. 22.

Ὅτι πάντα ῥήγματα ὅκ τῶ νύτῃ εἰς τὰς ἀγκύ-  
νας καταβαίνει, φλεβοτομὴ λύει.

Rupta, quæ ex dorso ad cubiti articulos descendunt, venæ sectio solvit.

Sive legas *ruptiones ῥήγματα*, sive *fluxiones ρεύματα*, sive etiam *dolores ἀλγήματα*, res eodem redit. Ruptiones hic significabunt toni-  
Q 4 partium

partium ruptas aut fractas resistentias, unde violatis vasorum diametris, inæqualis fit sanguinis circuitus, hinc Helmontio *inæquabile partium robur*, quod rumpi est partium æquilibrium. Quasi ergo diceret Hippocrates, quando sub rupto partium æquilibrio franguntur resistentiæ partium, quæ brachium protegebant ab humorum a dorso irrumpentium affluxu, aut ab oscillationum spasmodice undulantium eò descensu, unde stases humorum, spasfici dolores, molestiæ, aut ad motum difficultates, tunc venæ sectio auxilio est; duplici autem de causa, tum quod ad oppositas partes aversum sanguinis fluentum, materiæ minus sufficiat brachii molestiis, tum quod sic detumendo vasa in se concidant, ad proprios redeant diametros, nativamque recuperent soliti toni modulationem. Sic humorum ad brachium affluxus prohibetur, suæque circulationi restituitur æqualitas. *Hecquet.* Hæc in clariorem lucem ponuntur per ea, quæ *Hippocrates l. 1. de morb. n. 16.* docet: Quibusdam cum imbecilla in carnibus ac venis convulsa facta, non suppurant, sed diuturni sunt dolores, & ruptiones vocantur. Et quæ quidem in carne fiunt, ad hunc modum fiunt. Cum caro aut divulsa, aut ex plaga, aut aliquo modo affecta, dolorem aliquem habuerit, livida evadit, non sincero sanguine, sed tenui & aquoso, eoque paucior. Ubi vero plus solito resiccata fuerit, tum incalcescit, tum dolorem exhibet, & ad se ex venis & carnibus propinquis humiditatem trahit, ac ubi supra modum humectata fuerit, eaque humiditas a carne admodum incaluerit, per totum corpus, qualis attracta est dispergitur. Et magis sane in venas quam in carnes spargitur,

spargitur, cum hæ magis quam carnes trahant, quanquam etiam carnes trahunt. Cum vero ad copiosam corporis humiditatem pauca a carne attracta fuerit, obscura & doloris expers evadit, & pro morbosa temporis tractu sanescit. Quod si caro tum magis incaluerit, tum copiosam humiditatem traxerit, dolorem exhibet, & ad quamcunque corporis partem ab ipsa cum impetu delata fuerit ac incubuerit, dolorem gravem excitat, & quibusdam videtur ruptum transmutatum esse, quod tamen fieri non potest. Sed quæ sunt ejusmodi & alia prope ad ulcus accedunt. Humiditas autem de carne per venas prorumpit, cumque incaluerit, & crassior copiosiorque evaserit, dolorem exhibet, donec reliquo humori tenuitate & frigidityte similis extiterit. Quod autem attinet ad ea, quæ in venis fiunt, ipsa quidem vena in quantum convellitur, loco manet, cum vero convulsa fuerit (quod contentione & vi accidit) similis fit varici. Incalescit autem & ad se vaporem quendam humidum attrahit, qui ex bile & pituita provenit, cumque sanguis & humiditas de carne permixta fuerint, incrassescit sanguis, ipseque multis modis, qua parte venam convelli contingit, se ipso morbosior & longe stabilior evadit, cumque copiosior extiterit, plenitudo quolibet transfertur, ita ut quibusdam ruptum loco migrasse videatur. Quod si ad humerum transierit, gravitatem in manu & stuporem ac torporem inducit. Et si in venam incubuerit, aut ad humerum & dorsum tendat, confestim plerumque dolor sedatur. Ex hac Hippocratis doctrina elucet, quod duplex ipsi statuatur ruptionum genus, alterum in musculis, in ve-

Q 5

nis



nis alterum, ibi ecchymosis, hic varicosus tumor; utrumque excitatum a plaga, casu, contentione vel alio quopiam violento motu: unde spastici dolores, & in præsentē aphorismo a varicosis tumoribus ortæ in brachiis molestiæ venæ sectione solvendæ. Conf. *Gorr. de fin.* voce *πῦμα*.

Quotiescunque per causam aliquam distendentem solvitur vel membrana, vel fibra, vel caro musculosa, pars talis *rupta* dicitur. Si igitur in palæstra vehementi conatu membrorum quædam fibræ musculi vel tendinis in dorso fuerint ita ruptæ, ut dolor hujus læsionis usque ad cubitum protendatur, signum est, dolorem per consensum etiam partes remotiores afficere: Ut nunc illa doloris propagatio minuat, qui ex ruptione fuit natus, admodum conducit sanguinem mittere. Qualis vena autem sit aperienda, non indicat auctor; sed quia ad motum majorem compescendum optimum est proximas venas aperire, ut ita eo in loco maxima fiat depletio, non inconueniens videtur, venam istius cubiti esse aperiendam, ad quem dolor descensum fecit. Si vero esset humor tenuis & acris, qui ex dorso descendit ad cubitum, uti in morbis catarrhosis, minus conducere arbitrer venæ sectionem, quum humor acris non latitet in sanguine arterioso, qui rediturus est per ejusdem brachii venam, verum potius in succo nervoso, qui humor non facile evacuari potest sanguine evacuato ex aliqua vena. *Gortier.*

APHOR.

## APHOR. 23.

Ἡ φόβος, καὶ δυσθυμία πλὴν χρόνον δια-  
πλήν, μελαγχολικὸν τὸ ποιεῖν.

Metus, & tristitia si diu perseverent,  
melancholicum id ipsum.

Cellus l. 2. c. 7. p. 62. hunc aphorismum ita  
exponit: *Si longa tristitia cum longo tempore  
& vigilia est, atræ bilis morbus subest.*

Sub metu & tristitia stringuntur vasa, ar-  
ctantur diametri, segnescent oscillationes, tar-  
dantur fluida, spissescunt, stagnant, unde me-  
lancholicæ diatheses. *Hecquet.* Longa tristitia,  
animique angor solvit partium robur, vires  
depascit, circulum sanguinis lentiolem facit,  
adeoque obstructions vasorum, viscerumque  
infarctus gignit. Vid. *Hoffm. Idea fund. Med. cap. 7.*  
& *Med. rat. T. 2. p. 167.* In moerore & tri-  
stitia inprimis affici videntur ventriculi fibræ  
membranaceæ tenuissimæ inter diaphragma,  
ventriculum, hepar & lienem sitæ, quarum  
magna vis esse potest in comprimendis nervis,  
& mutandis diametris vasorum, hinc depræ-  
vandis secretionibus. Manifestior effectus de-  
prehenditur in ventriculo, de cujus languore  
primo conqueruntur moerentes, mox de in-  
appetentia, oris amaritie, & siti circa horas  
matutinas, cruditatibus acidis & nidorosis, fla-  
tibus & tensionibus hypochondriorum, aepsia.  
*Albrecht effect. Mus. §. 200.* Moerore & timo-  
re perspirat levius: ponderosius vero relinqui-  
tur.

tur. Hinc timentes & moerentes facile obstructions, partium duritiem, & affectus hypochondriacos patiuntur. *Sanct. Stat. Med. sect. 7. aph. 2. 3.* Sed potest etiam aphorismus noster intelligi, quod indicet, a perseverantia metus & tristitiæ jam præsentem denotari melancholiam. Equidem, ut ait *Aretæus l. 1. de caus. diut. c. 5.* inter notas melancholicorum evidentiores sunt, quod quieti aut tristes, abjecti torpentesque sint absque ratione. Adeo ut dicti magni affectus animi faciant humorem atrabilarium seu succum melancholicum, tum vero ab hoc, etiam aliunde nato, vicissim producantur, foveantur & veluti pabulum suum recipiant. Vid. *Boerb. aph. 1093 & 1094.* Moestitia & timor impediunt perspirationem crassorum excrementorum perspirabilia: & perspiratio impedita a quacunque causa moestitiam & timorem facit. *Sanct. l. c. aph. 8.* Quibus a sanguine crasso vasa magna distenduntur, minima vero in superficie inania coalescunt, cutis est strictior, illi sunt meticulosi. *Albrecht l. c. §. 209.* Qui laborant ventriculi debilitate, diarrhoeis, tensionibus hypochondriorum & obstructione hepatis & lienis, ad moestitiam, levissima, & sæpe nulla data occasione, sunt proclives, ut observatur in hypochondriacis & melancholicis. *ibid. §. 207.*

**APHOR.**

## APHOR. 24.

Εἰνέρων ὡς διακοπὴ τῶν λεπτῶν π, οὐ ξυμ-  
φύεται.

Ex tenuioribus intestinis si quod per-  
fectum fuerit, minime coalescit.

Desumptus est hic aphorismus ex *Coac. sect. 3.*  
*n. 379.* & explicatus habetur sub 6 *aph. 18.*

## APHOR. 25.

Εἰρυσίπελας ἔσωθεν μὲν εἰσω τρέπεσθαι, ἐκ  
ἀραθόν. ἔσωθεν δὲ ἔξω, ἀραθόν.

Erysipelas foras effusum intro verti,  
minime bonum: at ab interioribus  
foras, bonum.

Extat hic aphorismus in *l. i. de morb. n. 6.*

*Erysipelas* inflammatio est flavo-rubra, super-  
ficiaria, in ipsa quasi cute terminata, sedem  
suam habens in vasis serosis per dilatata oscula  
sua admissum etiam sanguinem rubrum conti-  
nentibus, nec illum per fines transmittere po-  
tentibus; quæ cum bonis ægri rebus per pro-  
curatam auctiorem transpirationem solvitur,  
juxta notata ad 5 *aph. 23.* Uti vero retrogra-  
dorum



dorum morborum quorumque pessima est ratio atque eventus; ita etiam erysipelatis ab exterioribus ad interiora conversio *minime bonum est*, ex eo, quod materia morbifica ad interiora relegata nervosas maxime partes obsideat, in quibus gravissima pathemata producit, nec tam facile ex iis rursus evelli potest. Quare oportet utique Medicum hos omnes morbos, qui facile ab exterioribus ad interiora revertuntur, cautissime tractare, & ab omnibus iis, quæ ullo modo repellendi facultate pollent, uti sunt externa constringentia, item purgantia, emetica, sanguinis missiones, ab ambitu corporis humores revocant, abstinere. Contra nihil præsentius est, quam ejusmodi in morbis corpora in perpetua leniori & æquabili transpiratione fervare, & omni modo a topicis sibi cavere. *Hoffm. Med. rat. T. 2. p. 145. T. 3. p. 187. T. 4. P. 1. p. 307. P. 3. p. 523.* Hinc in *Coac. sect. 3. n. 103 & 104. erysipelas foris quidem extare utile, intro autem vergere letale. cujus quidem rei indicium est, cum rubore evanescente pectus gravatur, & ægrius spiritum trahit æger.* Conf. l. 1. de morb. n. 13. Prænot. n. 23.

*Erysipelas ab interioribus foras verti, bonum, ut signum & causa: ac signo quidem, victricis naturæ quæ sponte sua deponit ad cutim capacem, materiam quæ sibi negotium facessebat: ut causa autem, vacuitate symptomatum intolerabilem, & restituta libertate spirandi & deglutendi: quæ duo sunt officia ad vitam tuendam necessaria. Foras vero effusum intro verti, minime bonum, ut signo & causa. Ac signo quidem, superstitis empyreumatis in foco unde prorupit humor, cujus etiam manet vis effera in tenui substantia, & qualitate acri, unde attractio*  
&

& impulsus: causa autem, quoniam humoris feritas, partis ipsius quò cursum inflectit substantiam labefactat. Sed in respirationis œconomia mortifera est talis palindrome: propter excellentiam præstantiamque partium spirabilium, quarum officio, pene dixerim, ad punctum temporis vita carere non potest. Talis palindrome respirationem adimit. Quicquid autem respirationem adimit, vitam tollit. *Durret. in Coac. p. 222.* Matrona annos nata 67. erysipelate pedis per hiemem totam vexata, vere primo disparente illo tumore convaluisset existimabatur: sed supervenit lethargus, obmutuitque illa, ac septimo die placidissime exspiravit. *At. Hafn. vol. I. obs. 14.*

Causa nimirum materialis Erysipelatis videtur causticæ, acris & putrefacientis indolis esse. vehemens enim ipsius in partes nervosas operatio, totius corporis œconomiam functionum illico graviter turbans. Longe gravior adhuc, quando expulsa materia retrocedit, quippe quæ tum haud secus ac venenum, cito deliria, inflammationem internam, asthma convulsivum & spasticas strictureas ciet sæpe letales. Ne dicam gangrænam & sphacelum, quæ erysipelas imprimis male tractatum facile excipiunt, virulentiam materiæ luculenter satis prodere ac indicare; quæ videtur ex bile variis ex causis vitiata & corrupta reddita, in duodeni flexura stagnante diutius, ibi cum succo pancreatico confermentata quasi & caustica facta, constari, inde successive ad sanguinem & cerebri spinalisque medullæ membranas ferri, universum nervosarum & vasculosarum partium systema male afficere, febrem efficere, donec demum ad externum corporis ambitum

ambitum pellatur. Elucescit ita veritas alterius in aphorismo effati, quod *bonum* sit, si *ab interioribus foras* vertatur erysipelas; idque eo magis, quod salubritatis plane notam quandoque ferat, quum observatum sit, alios morbos, præsertim asthma convulsivum, nec non colicam convulsivam, erysipelate superveniente, fuisse feliciter sublato. Vid. *Hoffm. Med. rat. T. 4. P. 1. p. 306 308.*

Id quod de erysipelate hic vidimus, idem etiam de omnibus inflammationibus valere observatur in praxi medica. Exemplo anginæ confirmatur doctrina hæc in *aph. 37. huj. sect.* Verum in reliquis etiam omnibus abscessibus, præcipue si in ipsis emunctoriis, aut circa eadem fuerint, idem ut plurimum observare licet. Emunctoria enim cum partes sint raræ, molles, laxæ, spongiosæ ac debiles, materia ab illis facile ad partes nobiles, quæ eis sunt proximæ, repellitur. Vid. *Hildani Cent. 3. obs. 77.* Sed nonne præsens aphorismus pugnat cum illo qui est 23. sect. 5. ubi de aquæ frigidæ usu externo, repellendi fine, dicitur, quod erysipelas quidem lædat exulceratum, juvet vero non ulceratum; ergo repellere licebit erysipelas quamdiu non fuerit ulceratum; juxta præsentem vero aphorismum minime bonum censeretur debet, si erysipelas intro vertatur? Conciliationem tentat Vesalius p. 1067. dicendo, in præsentem aphorismo sermonem esse de jam factæ erysipelate, in quo jam putruit materia, & propter putredinem acquisivit quodammodo naturam veneni, & ideo tunc malum esse ipsam intus propellere; in altero autem aphorismo materiam reperiendam præcipi principio fientis erysipelatis, seu primo insultu

insultu materiæ, ut tumoris generatio impediatur. Attamen neque sic omnino sublata esse videtur dicta textuum oppositio: nam identidem observatum est, quod, si nimis mature, ubi in expellendo noxio humore adhuc occupata est natura, tumores erysipelacei repulsi fuerint applicatis camphoratis, res infelicem sæpius habuerit successum; quum tamen eadem remedia conferant, ubi ad exitum prope- rat affectus, eo videl. fine, ut partibus per decubitus materiæ debilitatis pristinum reddatur robur. Vid. *Hoffm. Med. rat. T. 4. P. 3. p. 523.*

## APHOR. 26.

Ὅσοις ἐν τῇ πυρετῇ καὶ σιγῇ τρόμοι γίνονται, παρακοπή λύει.

Quibus in febribus ardentibus tremores contingunt, delirium solvit.

In *lib. de Judicat. n. 11.* legitur: Tremores in febribus delirium solvit; & in *Coac. sect. 1. n. 185.* ita: In febribus ardentibus tremores delirio solvuntur.

Tendinum subsultus in febribus ardentibus, malum; accedens delirium illos solvit, translata phlogosi ad cerebrum, sed extrema vitæ simul portendit. *Hecquet.* Febris ardens cum tremore abit in delirium, inde in mortem. *Boerb. aph. 741.* An per delirium ac febrim promptius extenuabuntur, & dissolventur humores nervorum fibras vellicantes, adeoque  
*Vol. II.* R simul



simul ab utrisque æger evadet? Juxta hunc sensum sententiam vertit *Celsus* l. 2. c. 8. p. 69: *Cui calor & tremor est, saluti delirium est.*

APHOR. 27.

Ο κόροι ἔμπυοι, ἢ ὑδρωπικοὶ καίονται, ἢ τέμνονται, ἐκρύνονται πῦ πύου ἢ πῦ ὕδατος ἀφ' ὧν, πάντως ἀπέρχονται.

Qui pus thorace colligunt, aut hydropici sunt, si uruntur, aut secantur, aut pus, aut aqua confer-  
tim effluerit, omnino intereunt.

Nam, siue aqua inter cutem quem implevit, siue in magno abscessu multum puris coit, simul id omne effudisse, æque mortiferum est, ac si quis sani corporis vulnere factus exsanguis est. *Cels.* l. 2. c. 8. p. 73. Quippe simultanea emissio humoris in magna copia alicubi hærentis, siue hydropici, siue suppurati, gangrænam sphacelumque adfectæ partis induxisse observatum est. Partes enim vicinæ, ab humore seroso (in hydropicis), vel purulento (in suppuratis), præternaturaliter collecto admodum pressæ tensæque, subitanea evacuatione vel educatione flaccidæ valde fiunt, magnamque liquidorum continuo allatorum copiam admittunt, quæ autem ob imminutam vasorum resistantiam eorumque elaterem libere avehi, vicinisque sanis tradi nequeunt, ideoque accumulata

mulata & stagnantia tandem corruptionem putrilaginosam subeunt, & sic gangrænam sphacelumque succedentem post se trahunt. Ubi tamen effusi humores in tali corporis loco hærent, ubi pro ratione factæ, vel fientis evacuationis partes fasciis inductis firmari iterum possunt, vel copiosæ evacuationes non adeo sunt reformidandæ. *Schulz. de abscess. §. 26.* Hinc & recentiori methodo per paracentesin abdominis in ascite educitur confertim, imo omnis aqua, observando ut abdomen a superioribus ad inferiora manibus fortiter comprimatur, dum aqua profluit, & postquam omnis effluxit, ut fasciis illud satis vehementer adstringatur. Vid. *Mead Monit. p. 145.*

## A P H O R. 28.

Εὐνᾶχοι ἔ ποδαγριῶσιν, οὐδὲ φалаκροὶ γίγνονται.

Eunuchi neque podagra laborant, neque calvi fiunt.

## A P H O R. 29.

Γυνή ἔ ποδαγριᾷ, ὡς μὴ τὰ κατὰ μῆτρα αὐτῆς ἐκλίπη.

Mulier podagra non laborat, nisi cum menstrua ipsi defecerint.

R. 2

Παῖς

## APHOR. 30.

Π αἷς ἔ ποδαγρίᾳ πρὸ τοῦ ἀφροδισιασμῦ.

Puer podagra non tentatur ante Veneris usum.

Hos aphorismos Celsus l. 4. c. 23. p. 237. ita reddidit: *Quæ in podagricis chiragricisve esse consueverunt (vitia), ea raro vel castratos, vel pueros ante fœminæ coitum, vel mulieres, nisi quibus menstrua suppressa sunt, tentant.*

Eadem causa, quæ Eunuchos a calvitie tuetur, eadem a podagra eos præservat, Hanc assignavit Aristoteles lib. 5. de generat. anim. c. 3. *quia in fœminam mutantur.* Eadem igitur censenda est causa, cur podagra non laborant, quia nec mulier podagra laborat, nisi menstrua defecerint. Sed adhuc dubitari potest, cur mulier podagra non laboret? Non quidem (ut multi credidere) quia in illis materia deficiat, quæ singulo mense per menstruas purgationes educitur; si enim hoc verum esset, sequeretur, mulieres non a podagra modo, sed ab aliis etiam morbis præcaveri, qui a materia dependent, quod experientiæ adversatur: præterea etiam pueri non laborant podagra, & tamen humoribus ob ingluviem abundant. Quare, cum nec pueri, nec mulieres, nec Eunuchi podagra laborent, causa indaganda est, his omnibus communis; hancque esse dicere[m] humorem quendam tenuem, & acrem, qui fan-

sanguini commixtus ad articulos confluit, in quibus sensim accumulatus corruptionem a bile, & pituita contrahit, sanguinemque simul corrumpit. Podagræ enim generationem describens *Hippocrates lib. de affection. sect. 2. n. 32. Et est quidem* (inquit) *hic morbus sanguinis in venulis a bile, & pituita corrupti.* Cum igitur hic humor potissima sit causa generationis podagræ, ideo evenit, ut nullum efficacius remedium excogitari possit pro præservatione ab hoc morbo, quam vini abstinencia, & eorum omnium, quæ acrimoniam in humoribus inducere possunt; sed vini loco, simplicis aquæ potu, cibisque omni acrimonia expertibus uti, quo quidem præsidio nonnullos in totum a podagra liberatos esse novi. Prædictus ergo humor in pueris, & eunuchis non generatur, propter humiditatem temperamenti; in mulieribus vero quibusdam etiamsi generari contingat, quia tamen per menstruas purgationes singulo mense educitur, podagram in illis inducere non potest, nisi menstrua deficient. Hac igitur ratione stante, perperam ex aphorismo 28. colligunt, coitum maxime ad podagricas affectiones disponere, præterquam quod experientia hanc opinionem evidenter damnat, cum videamus maximam partem eorum, qui in monasteriis degunt, a podagra vexari, cum tamen castitatem observent. Hanc igitur istius aphorismi veram rationem esse existimo, cujus veritati non statim detrahendum est, si mulier, aut eunuchus articulorum doloribus vexari conspiciatur. Nam dolor ille non erit podagra, sed arthritidis: quorum affectuum non levis est inter eos differentia. Nam, ut lib. cit. Hippocrates testatur, arthritidis juvenum peculiaris est, & tam mulieribus, quam viris commu-

nis, uti experientia demonstrat. Podagra vero potius senibus convenit. Quæ non animadvertens Galenus, in hac materia sibi parum constans, arthritidem podagræ confectariam facit; unde in commento ait, arthriticos fere omnes prius podagricos fieri, cum tamen in subsequenti commentario a rei veritate compulsus, arthritidis naturam a podagra distinctam olfecerit. *Martian. p. 467 sq.*

Hippocrates in libro cit. *de affection. n. 31. 32.* arthritidis genesin adscribit bili & pituitæ, cum agitata ad articulos decubuerint; podagram esse vult morbum sanguinis in venis a bile & pituita corrupti, a quo magis tenues venu- las corporique plurimum necessarias nervosque & ossa multa ac crebra subeunte morbus fit stabilior & ægerrime profligatur: ab arthritide ait corripri alium atque alium articulum, morbumque eum junioribus magis quam senioribus contingere; ex omnibus autem ejuscemodi circa articulos morbis, podagram existere violentiorem, & maxime diuturnum, ægerrimeque solvendum: utrique tamen morbo præscribit remedia eadem. Haud vero solis senibus esse infestam podagram, innuit textus in *lib. 2. Præviât. n. 15.* ubi de podagra hæc docemur: *Qui in senectute topbos aut callos in articulis induratos habent, aut laboriose vitam tolerant, cum alvo sicca, ii sane omnes humana arte sanari nequeunt. — Qui vero juvenis est, necdum circum articulos callos induratos habet, — is sane prudentem nactus Medicum, sanus evadet.* Neque illud prætereundum esse arbitrer, quod ipsemet *Martianus p. 215.* ubi secundum Hippocratem dolorum articularium quatuor recenset species (quæ sunt ischias seu coxendicum morbus; arthritidis seu articularis morbus per excellentiam dictus;

dictus; podagra, quasi dicas pedum ægritudo; & *κέρματα* seu articularum dolores diuturni, non admodum vehementes;) quod, inquam, ad podagram referat non solummodo dolores, qui pedem infestant, sed æque podagram esse censeat dolorem, qui manum, aut cubitum, aut quemlibet alium articulum occupat, dummodo podagræ essentia ei competat; quam ut ab arthritide distinguat, multa satis subtiliter disputat. Sed vereor, ut omnium assensu hæc dicta sint: videntur enim eo pertinere, ut evincatur non esse podagram, sed arthritidem, qui observatur morbus articularis in mulieribus ante quam menstrua defecerint, in eunuchis, & in pueris, atque sic aphorismorum præsentium veritas veniat in lucem.

Hodie communiter Arthritis dicitur articularum dolor profundus, pungens, vellicans, tensivus, distendens, sæpe cum tumore, rubore, itemque ardore & febre, ac interdum cum tophis aut nodis affligens; sedesque ejus statuuntur articularum ligamenta, & tendines musculorum, qui motibus eorum inserviunt, cum periosteo seu membrana ossa circumvestiente. A parte affecta denominatur, & in quatuor species distinguitur, ita ut in manu vel carpo dicatur *chiragra*, in genu *gonagra*, in coxa *ischias*, in pede *podagra*. Sed habet etiam alia nomina pro parte affecta, qualia sunt v. g. *onagra* in cubito, *omagra* in scapula, *dentagra* in dentibus, &c. Causam mali proximam constituit liquidi nervosas partes alluentis acrimonia & major tenacitas, nimiaque vasculorum minimorum angustia & rigiditas. Supponit illa interdum labem hæreditariam, vel & contagium; sed frequentius perversum rerum non naturalium usum, ex quo generatur nervorum labefactatio,



ut non homines solum, sed pueri, puellæ, eunuchique, & mulieres eo morbo laborarent; quæ item in caprarum greges ita gravis irrepfit, ut vix tertia earum pars non infestaretur. Annon aëris inclementia, quæ Moris inimica extitit, etiam pedum morbos producere potuit? Vid. *Mercur. Var. Lect. l. I. c. 24.*

Nunc, his præmissis, amplius aphorismi nostri singulatim excutiendi sunt.

*AD APHOR. 28.*

**E**unuchorum alii sunt, qui Castrati dicuntur; alii Spadones; alii Thlasæ, aut etiam Thladiæ; & alii Thlibiæ appellati. *Castrati* dicuntur, quibus ante pubertatem non solum testes, sed etiam virile membrum exsectum est, ut apud Turcas fieri consuevit; vel etiam tales sunt, qui sine testibus progeniti, vel ab ipso primo ortu exsecti nil virile habent. Atque hi proprie Eunuchi appellantur. *Thlasæ* & *Thladiæ* sunt, quibus testes solummodo in prima ætate fracti fuere (dicti a *θλάσιν* *contumdere*); *Thlibiæ* (a *θλίβειν*, *atterere*, *elidere*), qui attritos habent testes, quemadmodum fit in juvenis, ut in opera campestria facilius ducantur. *Spadones* sunt illi, quibus meatus pudendorum, per quos vel materia seminis, vel semen emittitur; propter impedimentum aliquod, fortasse in ipsa eorundum conformatione, angusti, vel obstructi sunt, adeoque fit, vel ut semen nullum fiat, vel inefficax, & minime prolificum; vel etiam quod extra vasa ejaculari non possit, quam ob rem ex istis nonnulli sunt, qui nequeunt generare, non quod

10180

R 5

semen



semen fœcundum minime gignant, sed quod propter aliquod impedimentum, v. g. propter vinculum, quod ad virgam habent, semen effundere nequeant, eo quod in suis cavitatibus, aut flexuris hæreat; unde σπαδωνες & υποσπασιαῖσι dicuntur ἀπὸ τοῦ σπάειν vel σπᾶν, h. e. convellendo, quod scilicet vinculum, quod ad virgam habent, pudendum sic convellat, ut meatus ejus contortus semen intus retineat, nec extra ferri sinat. Sed & alii licet semen emittant, infœcundum tamen illud est. Spadonibus quoque adnumerantur ex Alciato, qui cum uno tantum teste nati sunt, aut qui altero duntaxat sunt exfecti. Qui dicuntur ab Hippocrate Eunuchi non laborare podagra, illi proprie intelligendi erunt Castrati, & quidem ii, qui in ætate puerili, ante quam pubescere & semen progignere cœperint, testium resectionem passi sunt. Nam Thlasia, Thlibia, & Spadones, plane possunt podagra corripi, cum, licet semen non efficiant, bene tamen concumbere possunt. Tozzi. Fuchs. Thlasias & Spadones, Spadones potissimum, Reginis olim, & aliis mulieribus, quæ iniri volebant, non parere, in deliciis erant. Nam perpetuo fere arrigunt, neque mentula sunt emortua, quod nihil unquam emittant, sed tantum arrigant. Hinc Juvenalis 6 sat. 365 sq.

*Sunt quas eunuchi imbelles, ac mollia semper  
Oscula delectent, & desperatio barbæ,  
Et quod abortivo non est opus.*

Conf. Fritsch. Gesch. P. I. p. 373 sq. Ictis evirati dicuntur vel Spadones vel Eunuchi; inter quos hanc ponunt differentiam, ut Spado dicatur

catur qui unius est testiculi vir seu monorchis, altero exciso, quique generare potest: ast Eunuchus vel castratus utroque testiculo destituitur, qui illi per vim exemptus fuit. Adeoque Spadonibus, ab evulso testiculorum altero dictis, matrimonium contrahendi libertas Romæ concessa fuit, qua Eunuchi carebant. Ad hos pertinent *ελαθιαί* & *θλιβιαί*, a *θλάω* frango dicti, quibus vel compressi & paulatim elisi, didymi sunt vel confracti aut manibus attriti, ut mulierem imprægnare porro non possint. Vid. *Hebenstr. Anthropol. for. p. 619 seq.*

Castrandi modum duplicem Veteribus usitatum, quorum alter contusione, alter excisione perficitur, Paulus *l. 6. c. 68.* ita describit:  
 „ Prior quidem in hunc modum. Pueri ac-  
 „ huc infantes in aquæ calidæ solium collocan-  
 „ tur: deinde ubi (corpora) eodem folio fue-  
 „ rint relaxata, digitis testiculi premuntur,  
 „ usque dum aboleantur & evanescant, & dis-  
 „ soluti non amplius ad tactum occurrant. Ex-  
 „ cisione hac ratione perficitur. Resupinatur  
 „ in sedili qui eunuchus fieri debet, & scro-  
 „ tum cum testiculis, sinistræ manus digitis  
 „ premitur: quo facto duas lineas rectas (ita  
 „ ut ad singulos testes una fiat) scalpello in-  
 „ cides: ubi exilierint testiculi (a darto sepa-  
 „ rati) exsecabuntur, ita ut tenuissimum so-  
 „ lum naturale vasorum commercium relin-  
 „ quatur: atque hic modus eo qui per contu-  
 „ sionem fit magis probatur. Nam qui contu-  
 „ sionem testiculorum sunt experti, nonnun-  
 „ quam Venerem appetunt, parte aliqua ut  
 „ verisimile est testiculorum inter contunden-  
 „ dum delitescente ”.

Cur Eunuchi non calvescant, Hippocrates

*lib.*

*lib. de nat. puer. n. 18. 19. causam hanc adfert: quod neque vehementius moveantur, neque phlegma in coitu incalescens, pilorum radices exurat: nam qui calvescunt, ii sane phlegmate redundant, quod per coitum in eorum capite agitaturn & incalescens, in summam cuticulam illapsum, pilorum radices exurit, ita ut pili effluant.* Calvities a siccitate cerebri fit; nec potest adeo exsiccari cerebrum sine Venere, ut calvitiei causa sit: at Eunuchi Veneris expertes: Ergo. Quod vero a siccitate cerebri sit calvities, docuit Hippocrates 6 *Epidem. sect. 3. in princ. Cerebri consumptio, unde & calvitium.* Consumpto enim cerebro, ut in senectute, abscedit ab osse & cute, decidunt capilli. hoc ergo cum ob humidum abundans neque mulieribus, neque pueris, nec eunuchis accadat, merito nulli horum calvities contingit. *Cardan.* Juxta Aristotelem deficient ac defluunt per ætatem maxime primique pili capitis, non tamen omnes, sed tantum priores: quam lævitatem appellamus: non tamen prius, quam coeptus coitus Venereus sit, id accidit, scilicet iis qui sua natura eo sunt propensiores; cum enim cerebrum frigidissimum omnium corporis partium sit, tum rei venereæ usus refrigerat: caloris nempe sinceri, naturalisque secretio est: itaque cerebrum sentit merito prius; enim quæ imbecilla, vitiosaque sunt, causa parva, exiguoque momento immutantur: Calvitiæ mulieres esse immunes, & pueros, & spadones, apertum est: pili post geniti, iis, qui ante pubertatem castrati sunt, non exeunt; & post pubertatem excisis, soli decidunt, præterquam pubis. Vid. *Aristot. Hist. Anim. l. 3. c. 11. de generat. anim. l. 5. c. 3.* Id dici posse existimem, calvitiem oriri a labascente virtute humorum

morum per vasa sua motorum, nec sufficiente ad peragendas consuetas excretiones, & ab obstructis cutis poris. Quare senibus, & in magnis morbis pili defluunt: in cicatricibus non proveniunt, quod ibi locorum omnes meatus obcæcantur, uti ait *Aristoteles* 9. *Probl.* 13. Quum fœminæ humidiores sint ac frigidiores viris, ideo non solum minus capillatæ, sed etiam minus pilosæ sunt. Quicquid novo pilorum proventui ansam dat, id eo redit, ut pori relaxentur ac simul fibris & tubulis pilorum robur quoddam ad expulsionem necessarium suppeditetur, & denique sufficiens regeneretur succus, cujus motus versus caput est determinandus. Hinc ætas juvenilis gaudet pilorum proventu; & viri pilosiores censentur robustiores. Contra, quicquid debilitat vires vitæ, obliterat poros cutis, calvitium inducere potest.

Constat jam, rationi non repugnare, Eunuchos posse laborare podagra, posse & calvos fieri, etiam extra Veneris usum; præter hanc enim, plures alias causas existere, ex quibus generetur causa proxima podagræ, vidimus in antecedentibus. Quid, si ex parentibus podagricis sati & nati fuerint? Nonne in ultima senectute patientur podagram, a defectu virium & rigiditate texturæ fibrosæ in vasis ultimis, ab imminuta humorum ventilatione per transpirationem, maxime si non rectam servarint victus rationem tam in quantitate, quam in qualitate? Calvitium etiam experiri poterunt, a quacunque causa, quæ apta nata est sistere motus excretorios per cutim. Ex hæreditate certe paterna possunt obtinuisse calvitium. Quid vero impedit, quo minus calvescant ob senectutem, quemadmodum mulieres? Ergo  
haud

haud simpliciter verus dicendus est aphorismus noster? Enimvero probant hoc exempla Eunuchorum & podagricorum & calvorum. Vid. *Laur. Exerc. p. 147 seq.*

Medicus Veronensis, Bernardinus Plumatius, qui obiit an. 1506. Hippocratem ita excusavit: quod illius tempestate, non suâ, homines temperatissime vivebant, atque ita exsecti podagram evitabant. Sobrietatem itaque commendans, inculcavit, hanc unam morborum omnium medicinam esse, nec arte alia Priscos usos cum Romæ Medici deerant, quam hâc ipsâ in proverbio *semel* repetito quater contentâ, nimirum: *semel in die cibum sumere*; *semel hebdomade cum uxore Venere uti*; *semel in mense vomere*; *semel in anno sanguinem mittere*. Vid. *Papadop. T. 2. p. 284. Freher p. 1217. Conf. Barthol. Herm. de Moor Diss. in aphorismum Hippocraticum 28. sect. 6. Lugd. Bat. 1736. 4°.*

### AD APHOR. 29.

**H**ippocratis observatio est *l. 5. Epidem. n. 33. & l. 7. n. 49.* Polemarchi uxori articularibus doloribus vexatæ, vehementem quandam coxendicis dolorẽ contigisse, cujus causa fuere minime profluentes menses. Iterum (*ibid. l. 6. sect. 8. n. 100.*) ait, Phaëthusæ Pythæi conjugii diu menses defecisse, ex quo postea dolores & rubores ad articulos exorti sint. In *l. 1. de morb. mul. n. 13.* docet, quod a retentis mensibus subinde corpus dolor occupet, præcipueque lumbos & spinam, & inguina, manuumque & pedum articulos. Atque ex hisce locis fortasse formatus est præsens apho-

aporismus; qui verus fuisse videtur Hippocratis ævo & in Græcia, quod mulieres Græcæ summæ castitatis & temperantiæ exempla fuerunt. At apud nos hic aphorismus minus verus est, cum innumeræ instantiæ occurrunt podagricarum mulierum, etiam quibus menstrua bene respondent. Non mutata (inquit *Seneca epist. 95.*) fœminarum natura, sed vita est. nam cum virorum licentiam æquaverint, corporum quoque vitia æquaverunt. — Quid ergo mirandum est, maximum Medicorum, ac Naturæ peritissimum, in mendacio prehendi, cum tot fœminæ podagricæ calvæque sint? Beneficium sexus sui vitiis perdiderunt, & quia fœminam exuerunt, damnatæ sunt morbis virilibus. *H. J.* Illud tamen concedendum est, illas multo rarius affici hoc morbo, quam viri, ob menstruorum excretionem, per quæ liberantur a redundantia humorum, unde stagnationes, decubitus, obstructiones fierent. Deinde etiam, ex consuetudine vitæque ratione minus replente, causis hujus morbi procatarcticis seu antecedentibus minus obnoxia sunt. Notante Aretæo *de caus. diut. l. 2. c. 12.* „Viri facilius, in hunc morbum incidunt, & ex mulieribus agiliores. Mulieres autem licet rarius, quam viri, difficilius tamen hoc vitio laborant. Quod enim neque usitatum, neque familiare est, id si aliqua urgente causa potentius evaserit, violentum cum sit, majorem calamitatem infert”. Menstruorum defectus in textu non simpliciter intelligendus tantummodo est de omnimoda illorum suppressione, sed de quacunque etiam eorundem evacuatione depravata, diminuta, retardata, anticipata, aliave, ut propterea

tunc

tunc foeminas liceat existimare a podagricis doloribus immunes, cum non solum menstruæ expurgationes debito tempore, debitaque quantitate scatuerint, sed etiam ejus conditionis & qualitatis, ut in omnibus respondeant earundem constitutioni, ætati, habitudini, victui, exercitiis, aliisque, quoniam secus, corpore non debite repurgato, præsto est causa materialis arthritidis, ab humoribus evacuari solitis, nunc intus detentis, in artus decumbentibus. Quare *Galenus lib. de Venæ sect. advers. Erasistratum*, „ Si mulier (ait) „ per excretionem menstruam probe expurgetur, nec podagricis, nec articulorum doloribus, nec pleuritide, nec peripneumonia, „ nec aliis denique ex plenitudine affectibus infestabitur “. Unde patet ratio magni emolumenti, quod confert ad prophylaxin morbi, per evacuationes instituta humorum immunitio. At quæ vetulæ amplius non experiuntur menstruas evacuationes, retento in vasis qui antea redundans excerni solebat humor, ab arthriticis affectibus vexantur, eo maxime, quod, ætatis causa, perspirationem Sanctorianam habeant quam olim impeditiorem, & cæterum copia victus utantur solita. Interdum etiam bene menstruatis contingit arthritis a parentibus arthriticis, ex vicio hæreditario. vid. *Lister. ad hunc aph. & in Exerc. medic. p. 106. Tozzi.*

Exempla foeminarum, tum ob dispositionem hæreditariam, tum ob intemperantiam & luxum a podagra infestatarum videri possunt apud *Laur. Exerc. p. 170 sq.* Nimirum laborant foeminae podagra, etiam ante quam menses deficiunt, quando earum vita ad luxum & libidinem convertitur, quia ita natura mirum debilitatur atque impuritates sanguini & lymphæ nimium in;

ingenerantur. *Hoffm. de morb. incongr. §. II.* Equidem constat jam, obnoxias esse mulieres podagricis doloribus citra menstruorum vitium, suppressam tamen vel vitiatam illorum excretionem causam existere materiale arthritico-rum affectuum, quemadmodum contra iisdem bene procedentibus avertitur humorum ad artus decubitus. An licet hinc arguere, quod defectum menstruorum semper sequantur arthritica mala? Cave id asseras, quum repugnet quotidiana experientia. Observatum namque est, præter artuum dolores, esse plura alia mala, quæ suppressam illam aut diminutam evacuationem excipere solent; v. g. sunt cardiacæ præcordiorum oppressiones, faucium strangulationes, tensivæ hypochondriorum inflationes, phlogoses, universi corporis languores; (vid. *Hoffm. morb. ex hep. vit. §. 20.*) Apoplexia, apud *Boerb. aph. 1017.* Catalepsis, *ibid. 1040.* Paralysis, *ibid. 1060.* Epilepsia, 1075. Hæmoptoë, 1198. Scirrhus, 485. 495. & alia. vid. *Laur. l. c. p. 180 sq.* Præterea vero experientia attestatur, in emaciatís quandoque menstrua in totum suppressi, illas tamen secunda frui valetudine: quemadmodum iis quoque evenire consuevit, quibus aliqua continua evacuatio sanguinem coacervari prohibet, quod aliquibus fonticulorum gestatione contingit; Hippocratesque in filia Præfecti annonæ annotavit 4 *Epidem. n. 14.* quæ per duos annos non est purgata, eo quod hæmorrhoides continuo fluentes habebat. Quid? quod reperiantur etiam mulieres, quæ absque ullo sanitatis, aut fœcunditatis incommodo nunquam purgatæ sunt, aliæ per plures annos sine menstruorum periodo degerunt; & nonnullæ viragines

Vol. II. S



gines a natura sine mensibus sunt. Vid. *Martian.* p. 295. *Laur. l. c. p. 178.*

AD APHOR. 30.

Videtur hic aphorismus desumptus ex *Conc. sect. 3. n. 395.* ubi inter alios morbos, qui non sunt ante pubertatem, recensetur etiam podagra.

Ratio procul dubio hæc est, quod habeant pueri, quam ætate provectiores, vasa magis laxa, facileque dilatabilia, & minus obnoxia obstructionibus; & si quid redundat humoris a repletionibus, id in corporis augmentum impenditur. Post Veneris usum vero, seu potius abusum, labefactati nervi, stomachus non bene concoquens, unde accumulatio cruditarum, causæ ad morbum prædisponentes censendæ sunt. Quod si autem puer ante usum Veneris prolabatur in talem affectum, merito dicitur incongruus, & indicat magnam acredinem humorum & imbecillitatem nervearum partium, quæ vel a parentibus vel ab ingenti vitio ob errata commissa ipsi fuit ingenerata. *Hoffm. de morb. incongr. §. 2.* Patet hinc, quod aphorismus præsens non sit absolute verus: idque confirmant exempla puerorum ante Veneris usum podagra laborantium, quæ videri possunt apud *Laur. Exerc. p. 138 sq. & in Eph. N. C. D. 1. a. 8. obs. 12.* Enimvero ut jam pridem sceminæ privilegio adversus arthritidem Hippocratico exciderunt, sic pariter infantes. Prioris generis hominum, si non utriusque, luxuries bonum illum senem Coum fecit falsiloquum, per se nihil mentitum. Imo fit, ut infantes,

**fantes, etiam vix semestres, arthritide corripiantur;** cujus cruciatibus vexati non solum ita tabescunt, vix ut ossibus hæreat cutis; sed sæpe quoque morti fiunt præda: tunc præsertim, ubi non tam metastasi quadam, quam quodam quasi hæreditatis jure in talem inciderint labem. Prodit enim velut a fato quodam arthritidis nonnunquam, ex nativis nempe & inevitabilibus principiis, dum vel ex primæva articulorum molliore, ac laxiore structura, materiam morbi facile excipiente, vel ex ipso parentum semine oritur. Cujus quidem seminis in isthoc propagando morbo vis tam est nonnunquam mirabilis, ut illa diu durare possit sæpius, ante quam erumpat in artus. Plusque quam uno compertum est exemplo, filium, ab arthritico susceptum parente, hæredem mali non esse factum: contra in nepotibus hunc avi demum morbum provenisse. *Heucher p. 2 sq.*



## APHOR. 31.

Ὅτινας ὀφθαλμῶν ἀκρητοποίη, ἢ λατρίον,  
ἢ πυρίην, ἢ φλεβοτομίην, ἢ φαρμακείην  
λύει.

**O**culorum dolores meri potio, aut  
balneum, aut fomentum, aut ve-  
næ sectio, aut medicamentum purgans  
exhibitum solvit.

**R**emedia ad oculos hic proposita non omnia  
omnibus prosunt; sed eligenda diversa,  
pro diversa medendi indicatione: *meri potus*,  
ubi intendi debet languens vasorum systaltica  
vis, promovendaque perspiratio: *balneum &*  
*fomentum*, ubi crispaturæ & spasmi fibrarum re-  
laxari debent: *venæ sectio* ad sanguinis minuen-  
dam vim atque copiam: *purgatio*, quando lym-  
pha superabundans evacuanda est. Animad-  
versio, in hunc aphorismum, Celsi l. 6. c. 6.  
p. 348. est hæc: *Curari oculos sanguinis detractiōe,*  
*medicamento, balneo, fotu, vino, vetustissimus*  
*Auctor Hippocrates memoriæ prodidit. Sed eorum*  
*tempora & causas parum explicuit: in quibus Medici-*  
*næ summa est. Neque minus in abstinentia & alvi*  
*ductiōe sæpe auxilii est.* Quo in loco Celsus non  
necesse habuisset monere de alvi ductiōe, si  
vocem *φαρμακείην* sumisset pro medicina purgan-  
te, ceu nostri Interpretes in præsentī textu.  
Conf. 7 *aph.* 46. Constantinus jubet dari vi-  
num in ophthalmia pituitosa: tundi venam in  
san-

sanguinea: & in biliosa balneo uti: atque in melancholia, cacochymiaque, purgatione: licet in aliis opus etiam cathartico sit. *Taranta* p. 140.

## APHOR. 32.

**Τ**ραυλοὶ ὑπὸ διάρροίης μάλιστα ἀλίσκονται μακρῆς.

**B**albi longo alvi profluvio maxime corripiuntur.

**B**albi hic intelliguntur lingua titubantes, qui cunctanter verba proferunt, & laborant nimia humiditate, pituitæ confluxu in ore, propter laxitatem glandularum; quæ si in intestina ruat, diarrhœam faciet longam. *Lister.* Nam quoties e capite feri prolapsus excipitur a ventriculo, inde profluvium alvi cietur. *Duret. in Coac. p. 113.* Inde intelligitur, cur *Hippocrates lib. de Veratr. us.* in iis, quos præcipue in medicamentorum purgantium potionibus vitare oportet, reponat balbos.



## APHOR. 33.

Οἱ ὀξύρεγμοῖδες ἔ πάνυ ἡ πλευριτικοὶ γίνονται.

Qui acidum eructant, non admodum pleuritici fiunt.

Qui acidis ructibus obnoxii sunt, in iis arguitur laxitas fibrarum, propter quam in primis viis ingestorum coctio non bene perficitur: tales vero, propter vasa debilia, sanguinem tenuem nec facilem inflammari, minus proclives sunt in morbos inflammatorios, cujusmodi est pleuritis. Hinc *Cardanus* p. 665. *Ructus acidus*, ait, *eorum est qui sunt in defectu: lateralis autem morbus eorum, qui sunt in excessu coctionis*. Pueri & foeminae raro pleuritide afficiuntur; eructant vero saepe acidum, & sanguinem habent dissolutum, tenuem, adeoque remotum ab inflammatione. Conf. *H. B. Kaecks Dissertatio sistens aphorismum Hippocratis 33. sect. 6. Lugd. Bat. 1738. 4°.*



APHOR.

## APHOR. 34.

Ο κόροι φαλακροί, τῆτοις κισοὶ μεγάλοι ἔ  
 γίνονται· ὁκόσις δὲ ἂν φαλακροῖσιν ἔσσι  
 κισοὶ ἐπὶ γίνονται, πάλιν ἔσοι γίνονται δασεῖς.

Qui calvi sunt, iis varices magni non  
 fiunt: at quibus calvis existentibus  
 varices succedunt, iis rursus ca-  
 pillitium gignitur.

Unde, quod calvis varices magni non fiunt?  
 An calvities signat, quod humores pravi,  
 qui creare varices debent, impendantur pro-  
 creando, fovendo, calvitio? Hoc quidem  
 suadere videtur altera aphorismi pars, quæ,  
 exponente *Hollerio*, observatio est, quod qui-  
 busdam calvis seu capillorum defluvio laboran-  
 tibus, quum orti essent varices, repullula-  
 rint pili; scilicet si orta fuerit calvities ab hu-  
 morum vitio, & ii conversi fuerint ad crura  
 atque tibias, ut fiant magni varices, poterit  
 pilus renasci. Oportet utique ut magni sint  
 varices, quoniam juxta textum *l. 2. Epidem.*  
*sect. 5. n. 40.* qui in calvis apparent, nisi magni  
 fuerint, furorem in iis portendunt. Quid au-  
 tem opus erat dicere, quibus calvis existentibus  
 varices succedunt. iis rursus capillitium gignitur, si  
 calvis varices magni non fiunt, qui tamen requi-  
 runtur, si solvere debent capillitium, quia alias  
 furorem portendunt? *Cardanus p. 667.* apho-  
 rismum sua luce radiare existimat, si legatur

§ 4

cum

cum addita particula *ἢ* vel, in hunc modum:  
*Quicumque calvi sunt, his magni varices non fiunt:*  
*vel, si calvis magni varices fiunt, capilli renascun-*  
*tur.*

## APHOR. 35.

**T** αἰσιν ὑδρωπικῶσι βῆξ ἐπιγενομένη, κακόν.

**H**ydropicis tussis accedens, malum.

**I**n lib. 2. *Prædict. n. 11.* in eo qui aqua inter cutem detentus, *neque tussim neque sitim adesse convenit*, Apud Celsum l. 2. c. 8. p. 72: *In aqua inter cutem tussis spem tollit.*

Hydropicum tussire duplici modo contingit, vel a principio, idque proprium est hydropis pulmonum; vel hydropes jam confirmato ad ventrem inferiorem spectante, quæ tussis ea ratione excitatur, quia, cum venter ad summum aqua repletus est, per compressionem illius exiguum per septum transversum exudando ad pulmones pervenit, unde ægrum tussire necesse est, quod symptoma casum desperatum facit. Cæterum etsi verum est semper dicere, tussim supervenientem hydropicis, malam esse, non tamen verum est semper asserere: hydropicos tussire, malum est; eo quod ex pulmone hydropici semper tussiant, non tamen moriuntur omnes. Quare Hippocrates l. 2. *Epidem. sect. 5. n. 28.* summa cum ratione addit *cum crurum tumoribus*; quod confirmati hydropis indicium est. Nam etsi in hydropes pulmonis statim in principio,

principio, dum etiam vitæ spes adest, pedes tumeant; cum tamen tumor ad crura pervenit, casus omnino desperatus redditur, unde universaliter semper vera est hæc sententia: Hydropicus si tumorem in cruribus habens tus-  
 fiat, malum. *Martian. p. 316.* Tussis quando  
 asciti supervenit, nihil boni portendit, quod  
 Hippocrates recte notavit. Non tamen de tussi  
 ista leviori, quæ etiam inter initia plerumque  
 adparet, hoc intellectum volumus. *Hoffm. Med.*  
*rat. T. 4. P. 4. p. 443.*

Tussis arguit humorem acrem irritantem la-  
 ryrngem. Scimus ergo ex tussi superveniente,  
 humorem hydropis jam aliquam suscepisse acrimo-  
 niam, qua vix pejus in hydropse expectari  
 potest: adest enim humoris abundantia in cor-  
 pore debilitato, qui nunc suscepit acrimoniam;  
 hæc autem acrimonia, a spontanea corruptio-  
 ne nata, a debili hac actione emendari non po-  
 tuit, unde hujus acrimoniæ majorem progres-  
 sum expectamus. Tussis insuper validissime  
 concutit corpus ita liquore repletum, cujus  
 vasa macerata vix ferunt aliquem impetum:  
 periculum igitur est, ne conqussatione hac ali-  
 quod vas rumpatur, & ita latex, hucusque va-  
 sculis coërcitus, in corporis cava effundatur,  
 & ita augeat morbi periculum. Neque pulmo  
 est organum excretorium, quo eliminari possit  
 illa aqua hydropica: nam tussunt sine memo-  
 rabili excreatione, atque edunt ægri frustra-  
 nea conamina, quibus magis debilitantur. De-  
 nique signum est, pulmones ab eo latice obrui,  
 unde intercipitur istius organi actio, quod  
 preparare debebat humores, & libera in re-  
 spiratione agitari, nunc vero multitudine lati-  
 cis acrioris obfessi pulmones, defectu præpara-  
 tionis,



tionis, majorem generant laticis copiam, & tandem totius pulmonis oppressio & corrosio est expectanda. Propterea meretur tussis superveniens maxime damnari, imprimis cum præcipuam curandi indicationem intercipiat: tussis enim laxantia & mucilaginosa exigeret ad leniendum, quæ hydropicis sunt vetita. *Gorter.*

*APHOR. 36.*

Δ υσγρίδω φλεβοτομή λύει πέμνει δὲ τὰς εἴσω.

**U**rinæ difficultatem venæ sectio solvit: secundæ autem sunt interiores.

**O**mnis sanguinis missio remedio est spasticis solidorum contractionibus tollendis, & inflammatoriæ diathesi. Ergo, ubi retentio urinæ ei debetur causæ, constrictioni nempe fibrosæ compagis in collo vesicæ, venæ sectio juvabit. Internæ autem venæ secari jubentur, h. e. quæ penitius cum vesica respondent, cujusmodi est saphæna in malleolo. *Hecquet.* Quid per internas venas intelligendum sit, declaratur *lib de ossium nat. n. 12. & de nat. hom. §. 20.* quibus in locis venarum distributionem describens Hippocrates, secundum par a capite juxta aures per cervicem, jugulares appellatæ, quæ parte inferiore secundum spinam, ad lumbos utraque ex parte in testes & femora tendunt, & poplites interiores, deinde per tibias ad malleolos & pedes inferiore ex parte; subjungit:

jungit : *Ad lumborum igitur & testium dolores ex poplitibus & malleolis interioribus venæ sectiones facere oportet.* Quapropter non possum satis mirari Galenum, & plerosque expositorum, qui in tanta claritate caligantes, auctoritatem aphorismo partim detrahunt, partim, ut ejus veritatem tueantur, novas, & improprias vocum significationes sibi ipsis fingunt, cum Hippocrates aperte loquatur, & doctrinam proponat rationabilem, propriisque principiis omnino convenientem. Nec audiendus est idem Galenus, dum contra præceptoris mentem, experientiamque ipsam asserit, nihil referre, an interior vena, an exterior secetur in cruribus, quia omnes ab eadem vena ortum ducunt: hoc enim prætextu, venarum nullus habendus esset in phlebotomia delectus, quando omnes ab eadem vena magna ortum ducunt. Adnotari hic meretur summum Hippocratis artificium, qui cognoscens venas a capite descendentes, dum jugulares venas ingrediuntur, & inde inferius procedentes in novas propagines disperguntur, nihil habere ad invicem, nisi ramificatio ab eadem venæ parte procedat, ideo in constituendis quatuor paribus venarum præpostero ordine procedens a capite in partes inferiores, quæ inferne ascenderant in caput, singulas ramificationes in proprium par disperfit, prout ab eadem venæ parte exortum habent, quæ singula venarum paria ea ratione consortium habent ad invicem, quia iis fibris constant, quibus mediantibus omnia naturæ opera perficiuntur; ex hacque venarum distributione colligit, quam rationabiles sint morborum curationes per sectionem venarum, quæ juxta allatam venarum distributionem sunt, de

de quibus alioqui probabilis ratio afferti non potest. Ex earundem venarum participatione evenit, ut exterior vena cubiti promptius evacuet a capite, quam interior: quia venæ ascendentes in caput ab eadem parte venæ axillaris exoriuntur, a qua vena exterior cubiti, & ex consequenti ex iisdem fibris omnino constat. *Martian. p. 408 & 21.* Quod si ex nimia sanguinis copia, vegetæ naturæ senibus præsertim, qui vitam diu sine sufficienti corporis motu egerunt, hic morbus vel ingruit vel saltem verendus est; omnino maxima præsidii & auxilii spes, in tempestita & sufficienti sanguinis missione, erit reponenda. Idque eo magis, quando ex subsistente mensium vel hæmorrhoidum fluxu, aut omissa & diutius assueta venæ sectione vel scarificatione, mali causa suborta creditur. *Hoffm. Med. rat. T. 4. P. 2. p. 407.* Si dysuria sit ab infarctu renum a sanguine, item in inflammatione vesicæ, primum incidenda est vena brachii, deinde etiam statim subjungenda saphæna in malleolo, aut poplite. *Hoffm. ibid. T. 3. p. 612.*

Stranguria, Dysuria, & Ischuria in causis tam parum differunt, ut non mereantur distinctis titulis describi; nam quæ causa urinæ difficultatem inferre potest, si major fiat, integram suppressionem producere potest; si autem simul guttatim exit urina, Stranguria vocatur. Propterea in his speciebus omnibus videndum erit, num vena sit secanda. Multi dubitant, num hic sit genuinus Hippocratis aphorismus, quia putant, venæ sectionem nunquam conducere posse, quia frequens sit dysuria senibus (3 aph. 31.) catarrhosis, calculosis, quibus non conducit venam secare. His auctoribus  
omnino

omnino est concedendum, venæ sectionem non conducere; sed observavit etiam noster Auctor ex intestino recto vel utero inflammato (5 aph. 58.) stranguriam seu dysuriam generari. in istis utique casibus quam maxime conduceret mittere sanguinem. Atque post eum etiam Riverius, Sydenham & nos observavimus, frustra tentatis omnibus auxiliis, urinæ suppressionem & difficultatem curatam fuisse sanguinis missione. Ut nunc sciat junior Medicus, quali in specie dysuriæ mittendus sit sanguis, debet signa inflammationis applicare ad vaginam, intestinum rectum, vel & urethram: ea signa satis definient, sanguinem esse mittendum. Quod autem suadeat, internas venas esse secandas, hoc facile condonari potest, quia tunc temporis ex ignorata circulatione, pluris quam par erat fecerunt delectum venarum, quæ aperiendæ erant. Si autem dixisset, *venæ inferiores*, scilicet in pedibus, *sunt aperiendæ*, non ita recederet a communi observatione, neque oppugnaret circulationi inventæ, ex cujus doctrina patet, venas proximas esse aperiendas, quales sunt venæ in pedibus ab iliatis provenientes. *Gorter.*



## APHOR. 37.

**Τ**ὸ πυνάγχης ἔχομένῃ οἴδημα γενέσθαι ἐν τῇ τραχήλῃ, ἀγαθόν· ἔξω γὰρ τρέπεται τὸ νόσημα.

**A**b angina detento si tumor in collo oriatur, bonum: foras enim morbus vertitur.

**D**esumptus videtur aphorismus ex *Prognost.* n. 23. ubi hæc leguntur: *Angina gravissima quidem est & celerrime interimit, quæ neque in faucibus, neque in cervice quicquam conspicuum facit, plurimum vero dolorem exhibet, & difficultatem spirandi, quæ erecta cervice obitur, inducit. — At securius est tumorem & ruborem ad externa converti.*

Quando enim suffocatio strangulatoria remittit, tumor, dolor & rubor magis extrorsum vergit sensimque evanescit, felicem solutionem nunciant. Sin secus, in apostema aut mortem fit transitus. Si in apostema, ac pus in bronchia & pulmones effunditur, anceps admodum eventus. Si in mortem, nunciant hanc spuma ante os, lingua valde tumida, purpureo-nigra, extremorum rigor, summa præcordiorum angustia atque anxietas, cum pulsu duro, convulsivo & intermittente. *Hoffm. Med. rat. T. 4. P. 1. p. 395.* Si angina cum coincidentia occupet (in qua nullus tumor), ab interioribus  
ex-

**extrorsum omnia evocanda sunt, & humores, & caliditas, & omnis caro, ut totum foras extumeat.** *Aret. Curat. Acut. l. 1. c. 7.* Etenim ii præ cæteris maxime servantur, quorum col-  
lum in tumores attollitur, aut exanthemata in  
eo oboriuntur. *Actuar. Meth. med. l. 2. c. 10.*

In textu habetur *κνέδων* seu ea anginæ species, quæ tunc dicitur præsens, si causa hæreat in interioribus laryngis, sine signis externis, difficilem & suffocatam respirationem inducens. Periculosissimus est morbus; nam si augeatur tumor in membrana interna laryngis, suffocatur homo; si abeat in suppurationem, generatur pulmo purulentus. In hoc morbo observavit auctor, si externe in collo tumor oboritur, bonum esse. Hæc autem observatio non est constans: potest enim tumor membranæ internæ laryngis latius dispergi etiam ad exteriores partes, sine diminutione partis interioris; quando designatur morbi augmentum. Sed si interiores partes deponunt ad exteriora colli materiem morbi, valde bonum est, quum partes exteriores tumentes non inferant mortis periculum, satis enim magnum conceditur spatium tumori. Constat ergo, duo adesse debere requisita, ut talis apparens in collo tumor sit bonus. Primo, ut sit talis morbi materia, quæ metastasin facere potest, uti materia catarrhosa, & erysipelatoſa; nam inflammatio & œdema harum partium non tam facile locum mutat, sed potius, si partes exteriores simul tumere incipiunt, designant morbi augmentum. Alterum, ut sit perfecta metastasis, quam conjicimus, si unà cum intumescencia externa liberior fieri incipiat respiratio: nam nisi respiratio simul fiat liberior, signum est, im-  
per-

perfectam fieri translationem, quæ semper mala est. Neque bonum erit signum, si novus accedat tumor, manente priore. *Gorter.*

APHOR. 38.

Οἱ πόσοις κρυπτοὶ καρκῖνοι γίνονται, μὴ θεραπεύειν βέλτιον. Θεραπεύομενοι γὰρ ἀπόλλυνται ταχέως· μὴ θεραπευόμενοι δὲ πολλὸν χρόνον διαπλῆσι.

Quibus canceri occulti oriuntur, eos non curare præstat: curati namque cito pereunt; non curati vero diutius perdurant.

Quid per *occultos cancras* intelligat Hippocrates, ipse lib. 2. *Prædict.* n. 18. nobis manifestavit. Enumerans enim quosdam morbos singulis ætatibus familiares dicit: *Viris autem id genus tubercula non admodum sunt, verum favi formidabiles & canceri occulti, demersi, quasi unum, & idem sit occultum esse, & intimius in carne submersum; quam quidem significationem clarius confirmat paulo infra, dum inquit, at canceri latentes, quique summa corporis infestant, sunt, duas cancrorum differentias proponens: cum alii sint, qui ad corporis superficiem extimam magis vergunt, & hos ἀκρόπαθες, h. e. elevatos vocat, alii intimius latitant, quos ὑποβρύχινες, id est, submersos, & κρυπτοὺς i. e. occultos*

*occultos* vocat. Quare vanum est, vocis etymologiam respicientes credere, per occultos canculos Hippocratem intelligere eos, qui interna viscera occupantes, nec oculis, nec tactui subjiciuntur. Nam in partibus exterioribus fieri canculos occultos ipsemet testatur *lib. 2. de morb. mul. n. 23.* de quorum generatione ita ad verbum loquitur: *Et in mammis tubercula fiunt dura, partim majora, partim minora; hæc autem minime suppurant, sed semper duriora fiunt, ex his deinde occulti cancri pullulant.* Quare, cum marmæ sint partes exteriores, & in iis cancri occulti nascantur, argumentum est evidentissimum occultos non dici illos, qui intimas corporis partes occupant. Dum vero cancrorum occultorum curationem prohibet, intelligendus est de propria & vera cancrorum curatione, quæ & igne, & amputatione fieri consuevit. Nam *lib. 7. Epidem. n. 53.* ipsemet cancrum in faucibus curasse profitetur per inustionem. Cur vero canculos submersos, & ad superficiem parum elevatos curare non expediat, ratio est, quia, cum ejus curatio in amputatione consistat, hæc in submersis fieri non potest, & ideo satius est eos non attingere, quam aut igne, aut ferro exacerbare. Verum, si præfata curatione eos attingere non licet, licebitne aliis curationum modis ipsos tractare? Certe, quando casus est desperatus, melius est, eos derelinquere, ne impossibilitas curationis arti imputetur; & ideo loco citato de curatione ne verbum quidem fecit. Quod si provinciam dimittere omnino non liceat, chirurgica curatione dimissa, pharmacia curationem tentare poterit, qua si æger sanari non possit, vitam tamen minus molestam protrahere possit.

Vol. II.

T

sit.



fit. Nam & ipse Hippocrates *lib. 2. de morb. mul. n. 48.* cancrosum uteri affectum phar-  
 macis mulcere tentavit. *Martian. p. 469.* De in-  
 fausta occulti cancri per amputationem cura-  
 tione videri possunt *Eph. N. G. D. I. a. 8.*  
*obs. 21. & D. 3. a. 3. obs. 163.*

Cancer, Celso *l. 5. c. 28. n. 2. Carcinoma*  
 dictus (cui *cancer* audit morbus quem Græci  
 gangrænam, seu sphacelum appellarunt) in  
 quacunque fere corporis parte oritur, & est  
 nihil aliud, quam scirrhus malignus factus, su-  
 perficie aspera, scabra, ad cujus margines vasa  
 vicina inflamari incipiunt, & varicosa inter-  
 dum sunt. Nomen habet a figura, quam, ad  
 ἀκμήν progressus, adumbrat; exulceratus enim  
 habet cavitatem rotundam, & in ambitu vasa  
 sanguifera turgida: *occultus* vocatur, quamdiu  
 suis continetur pellibus, quibus ulcere ruptis  
*manifestus* vel *ulcerosus* seu apertus dicitur. *Boerb.*  
*aph. 994.* Ita vero oriri & succrescere solet  
 cancer: Primo nodulus sentitur duriusculus, sa-  
 tis exiguus, vix pisi, aut avellanæ nucis ma-  
 gnitudinem superans, qui ob spasticam fibra-  
 rum adjacentium nervearum stricturam subinde  
 puncturas, ardentes & lancinantes dolores,  
 per intervalla recrudescentes, inferre solet,  
 satisque diu in hoc statu persistere potest; do-  
 nec majori humoris visceri & impuri accessu,  
 factaque ibi collectione, canaliculi obstruuntur,  
 & demum nimium infarcti rumpuntur. Unde  
 tumor non solum in ingentem sæpius molem  
 attollitur, sed & sanguine in vasis coagulato  
 per cutim transparente, colorem prorsus livi-  
 dum & plumbeum induit, vasaque circumja-  
 centia in varicosam turgescientiam explicantur.  
 Quæ omnia si ita sunt certisque signis depre-  
 hen-

henduntur, cancer adesse dicitur occultus: qui in euchymis seu bonos humores habentibus per plures annos tolerari potest, si modo omnia motum sanguinis nimis augmentia provide caveantur. Quod si vero, vel propter improvidam emollientium & acrium irritantium applicationem, vel ob majorem massæ sanguineæ orgasum, major tenuium humorum affluxus proritatur, tunc circumjacentes, & dein etiam profundius sitæ partes, sub atrocium dolorum concursu, putrida corruptione depascuntur, saniesque & ichor subcruentus foetidissimi ac vere cadaverosi odoris funditur; imò quandoque larga sanguinis sinceri ex vasis erosis contingit emanatio. Atque talia ulcera canceri exulcerati nomine insigniuntur. *Hoffm. Med. rat. T. 5. P. 5. p. 249 sq. Conf. Hildan. Cent. 3. obs. 87.* Quia vero plurima medicamenta plus irritant cancerum, cum etiam lenissima in hoc sensibili morbo affluxum augment humorum & eo citius corruptionem putredinosam accelerant, hinc ab illis, irritantibus nimirum, abstinere utique consultius est, quia per irritantia curatus citius abit ex occulto in apertum. Sed si datur medicamentum, quod affluxum non auget, non irritat, verum potius discutit, resolvit, dolores sedat, corruptioni resistit, acredinem infringit? de talibus non accipiendus est aphorismus. Vid. *Mich. Alberti Diff. de Belladonna, tanquam specifico in cancro, in primis occulto. Halæ 1739. 4°.*

## APHOR. 39.

Σπασμὸς γίνεται ἢ ὑπὸ πληρώσεως, ἢ κενώσεως. ἄτω δὲ καὶ λυγμός.

**C**onvulsio ex repletione, aut vacuatione oritur. ita vero etiam singultus.

**Q**uid sit *Convulsio*, dictum est ad 5 *aph.* 17. Oriri eam a repletionem, manifestant convulsiones foeminarum a menstruis retentis. Ab inanitione convulsionis exemplum extat in 5 *aph.* 3. Tertia potest addi causa, scilicet omne id, quod irritare valet nervos. vid. 4 *aph.* 16. & 5 *aph.* 1. 4. Dum inquit Hippocrates, convulsionem a repletionem, aut ab inanitionem fieri, intelligit corporis, non nervorum, ut est fere communis opinio. Nam si hos repleti contingat, paralylin potius excitari, quam convulsionem, est rationabile, quia si concedatur, adeo repleti nervorum corpus, sive id secundum porositates contingat, sive secundum substantiam, ut brevior solito fiat, impossibile est, spirituum transitum non impediri, aut compressis, aut obstructis nervorum porositatibus. Repletio autem corporis, aut ejusdem inanitio convulsionem facere dicitur, quatenus inde materia producitur, quæ spiritus per nervorum porositates, ad motum naturaliter efficiendum concurrentes, ad eundem præter naturam excitandum irritat. Cum enim  
in

in convulsione membra continuo moveantur, necesse est causam motus immediatam concurrere, quæ sunt animales spiritus, & instrumenta motus, quæ non sunt alia, quam musculi. Non enim differunt motus hi convulsione, a motibus voluntariis, & naturalibus, nisi quatenus in his spiritus animales voluntatis imperio moventur: in convulsione autem a re quapiam irritati concitantur ad motum. Quæ quidem causa irritans duplex esse potest, copia scilicet humorum, & eorundem acrimonia, hæcque comprehendit fere in præsentī aphorismo, dum inquit, *Convulsio fit ab inanitione, aut a repletionē*; repletio enim humorum copiam inducit, inanitio autem eosdem acriores reddit. Dixi *fere*, quia non omnis causa irritans nervorum facultatem a repletionē, aut ab inanitionē dependet. Nam si nervo sauciato, aut aliqua alia particula, quæ cum nervoso genere consortium habeat, convulsio fiat, hæc neque ad inanitionem, neque ad repletionem reduci potest, fit enim eo casu convulsio, quia in vulnerata parte acris quidam humor produci-  
tur, a quo irritata nervi facultas, convulsivum motum facit. Frustra igitur laborant expositores, dum quamlibet convulsionem ad alteram dictarum causarum reducere student, quia hoc non fuit Hippocratis consilium, qui tantummodo causas referre voluit, a quibus frequentissime excitatur convulsio, ex quo non universaliter, sed indefinite sententiam protulit, quæ hoc in loco æquipollet particulari. Ab iisdem vero causis, inanitionē inquam, & repletionē, ea significatione, qua a nobis expositum est, singultum fieri demonstravimus in

explicatione 13 aphorismi præsentis sectionis.  
*Martian. p. 469. Conf. Bellin de urin. p. 539 sq.*

Ad tutelam secundæ valetudinis proportio humorum in vasis, quæ nec excedat, nec nimium deficiat, semper necessaria est, alias statim proportio & æquilibrium motuum læditur; nam ex nimia copia æque ac ex inopia, si est supra modum, oriuntur stagnationes, quæ in locis valde nervosis naturam promte ac expedite ad spasmos sollicitant. Et quamvis in infirmioribus & elanguidis nimia humorum & sanguinis copia stagnans viscerum & partium totum plane resolvat & morbos chronicos potissimum accersat, tamen in vegetioribus, sensibilibioris texturæ & juvenilis ætatis hominibus fibras potius ad validissimas & spasticas constrictiones armat, quibus efficitur, ut magnæ in sanguinis circuitu inæqualitates & infensæ ad alia loca humorum translationes & congestiones fiant. *Hoffm. Med. rat. T. 2. p. 99. 446. Adietiam Aëtium l. 9. c. 5. & Tralles de opio sect. 3. p. 3.*



**APHOR.**

## APHOR. 40.

Ὅσοι περὶ τὸ ὑποχόνδριον πόνει γίνονται  
 ἀπὲρ φλεγμονῆς, ταῖσι πυρετὸς ἐπιγενό-  
 μεν. λυεὶ τὸν πόνον.

Quibus ad hypocondrium dolores  
 citra inflammationem oriuntur,  
 iis febris superveniens dolorem  
 solvit.

Celsus l. 2. c. 8. p. 70. hunc aphorismum ita  
 expressit: *Febris præcordiorum dolores, si sine  
 inflammatione sunt, finit.*

Per hypocondrium (seu subcartilagineum  
 ab ὑπὸ *sub* & χόνδρος *cartilago*) denotatur superior  
 abdominis pars, quæ sub mucronata ossis ster-  
 ni cartilagine & costis spuriis ad ilia usque utrin-  
 que protenditur, & quicquid comprehenditur  
 tota ea regione, quæ est inter septum transver-  
 sum & umbilicum, ac intra cartilagines costa-  
 rum inferiorum usque ad lumbos. Distinguitur  
 in dextrum & sinistrum. In illo sunt hepar,  
 vesicula fellea, pylorus cum superiore parte  
 intestini duodeni, & pancreas. In sinistro sunt:  
 maxima pars ventriculi, totus fere splen, ma-  
 gna pars superior mesenterii, pars quædam  
 intestini coli, ubi maxime solent contineri fla-  
 tus. Est hypocondrium idem quod ἐπιγαστρῖον.  
 Celsus vocat *præcordia*, & Hippocrates, quando  
 simpliciter hypocondrium nominat, per præ-  
 rogativam intelligit dextrum. Hinc verisimile

T 4

est,

est, præsentem aphorismum desumptum esse ex *Coac. sect. 3. n. 272* ubi hæc leguntur: *Quibus jecur derepente vebementer dolet, iis febris succedens remedio est.* Si dolor ad hypochondria sine inflammatione, sed vel ab obstructione, vel a spiritu flatulento vel ab intemperie inæquali frigida est, febris superveniens dolorem solvit. Perpetuum hoc est apud Hippocratem, quod, quicumque morbi ab obstructionibus & viscida amurca nec non viscerum infartu proveniunt, commode solvantur febre, quoniam motus in febre tam intestinus quam progressivus major attenuat, incidit, resolvit materiam immobilem, fixam, stagnantem, ad evacuationem disponit ac præparat. Et si rem paulo accuratius pensitamus, isti insultus spasmodici & febriles, qui hypochondriacis perquam familiares sunt, præsertim autumnali & hiemali tempore, egregie inserviunt sordibus excrementitiis in massa sanguinis & humorum coacervatis per emunctoria ex corporis sphaera eliminandis. *Huffm. de sal febr. §. 33.* Ergo, si sine inflammatione dolor est, nihil imponendum est. hunc enim statim ipsa febris solvet. At, si neque inflammatio, neque febris, sed tantum præcordiorum dolor est; protinus calidis & siccis fomentis uti licet. *Cels. l. 3. c. 10. p. 139.*



APHOR.

APHOR. 41.

Οἱ πόσι διὰ πόνον ἢ ἐν τῷ σώματι μὴ  
διασημαίνει, τῆτοι διὰ πυχύτητα τῆ  
πύς, ἢ τῆ τόπυ, ἐκ ἀποσημαίνει.

Quibus suppuratum aliquod in cor-  
pore existit, neque de se signifi-  
cationem edit, iis ob puris, aut  
loci crassitudinem sui indicium non ex-  
hibet.

Suppuratio fere quælibet dolore aut febre  
deprehenditur, juxta 2 aph. 47. Hic au-  
tem dicitur non innotescere aut non apparere,  
seu non conspicuam fieri suppurationem sive  
fluctuatione sive tumefactione, sive exitu per  
vias urinæ, per alvum, aliave emunctoria cor-  
poris. quæ intelligenda sunt inprimis de sup-  
puratione in imo ventre. Tozzi. Puris crassi-  
tudinem & loci coarctationem, quæ a reple-  
tione provenit, ejus præsentiam obscurare ait  
Hippocrates; idque verificatur non modo in  
suppurationibus exterioribus, & quæ tactu ju-  
dicantur, sed etiam in illis, quæ interius la-  
tent, & potissimum, quæ in thorace consistunt,  
quarum cognitio per concussionem habetur.  
Fluctuat enim in cavitate pus, ut auribus ma-  
nifeste persentiat; cujus concussionis modum  
nos docuit Hippocrates in lib. 2. de morb. n. 45.  
Admonet tamen ibi Hippocrates in confirma-  
tionem præsentis doctrinæ, aliquando ob puris  
T 5 crassitu-



crassitudinem, aut multitudinem, quæ loci crassitudinem, coarctationem facit, non posse persentiri, an in thorace pus exultat, nec ne. *Martian. p. 470.*

APHOR. 42.

Εν τοῖσιν ὑπερικοῖσι τὸ ἥπαρ σκληρὸν γένεσθαι, πνηρόν.

Morbo regio laborantibus jecur durum fieri, malum.

Apud *Celsum l. 2. c. 8. p. 74 in morbo arquato durum fieri jecur, perniciosissimum est. Ratio?* Quia durities hepatis est ab inflammatione, & scirrho. Conf. Notata ad 4 aph. 64.



APHOR.

APHOR. 43.

**Ο** κόσοι σπλωσίδες ὑπὸ δυσεντερίης ἀλί-  
σκονται, τετίοζιν, ἐπιγενομένης μακρῆς τῆς  
δυσεντερίης, ὕδρωψ ἐπγίνεται, ἢ λειεντερή,  
καὶ ἀπόλλυνται.

**L**ienosi, qui difficultate intestinorum  
corripiuntur, iis longa superveniente  
intestinorum difficultate hydrops,  
aut lævitas intestinorum accidit, & moriuntur.

**C**ellus l. 2. c. 8. p. 74. ita habet: Quos lienes male habent, si tormina prehenderunt, deinde conversa sunt vel in aquam inter cutem, vel in intestinorum lævitatē, vix ulla medicina periculo subtrahit.

Lienosi, vel splenetici, dicuntur a lienis tumore & inflatione. Ipsi tumores autem vocantur ab Hippocrate magni splenes. Qui magnum habent lienem, qui quidem biliosi sunt, male colorati evadunt, prava ulcera contrahunt, os graviter olet, graciles sunt, lien durus est, semperque æqualis magnitudinis, neque ciborum reliquæ per alvum demittuntur. Qui vero pituitosi sunt, hæc iis minus contingunt, & lien alias major, alias minor redditur. His confert, si quidem minime purgati videantur, caput & reliquum corpus purgare, &c. lib. de affect. n. 21. Si itaque hoc morbo laborantibus dysenteria superveniat, neque maxima, neque longissima, bona esse solet, & morbum solvere,  
evacuata

evacuata causa: id quod confirmatur 6 aph. 48. Lienosi qui sunt ejusmodi lienis duritate quam peperit diuturna humoris melancholici infarctura, dysenteria superveniente sanescunt, secessu, translatione, & vacuatione infarctorum lienis humorum melancholicorum, crassorumque. *Duret. in Coac. p. 37.* Si tamen dysenteria diu protrahatur, exulcerationem intestinorum significat, unde hydrops, aut lienteria. *Valles.* Exulcerata enim ora vasculorum in intestina hiantium, exitum præbent humori seroso hydropem constituenti: labefactata autem intestina, cum dimittunt ingesta vix vel nihil mutata, lienteriam sistunt. Hinc dysenteria lienosa diu permanens facit hydropem. *Boerb. aph. 1229.* Lienosis difficultas intestinorum non longa, utilis: longa vero mala. Ubi enim desinit, si aquæ inter cutem, aut intestinorum lævitates oriuntur, mortem afferunt. *Hippocr. Coac. sect. 3. n. 295.* Quoniam nulla redintegratio esse potest in magnis symptomatis quæ a pessimis ortum habent; tum aliàs, tum si naturæ vires languent effoetæ. Hic autem lienteria, ex imbecillitate orta virtutis, ipsam quoque denuo infirmiolem facit. *Duret. in Coac. p. 333.* Hippocrates, ubi *lib. de affect. n. 23.* de hydropse ex liene verba fecit, ita concludit: *In morbis ubi alter alteri succedit, is plerumque interficit. Corpus enim ex præsentis morbo imbecillum redditum, si alter morbus, accesserit, ex imbecillitate prius perit, quam alter qui posterior accessit morbus desinat.*

APHOR.

## APHOR. 44.

Ὅκοιοιζιν ἐκ τραγγυρίας εἰλὸς ἐπιγίνεταί,  
 ἐν ἐπὶ ἡμέρηζιν ἀπόλλυνται, ἐὰν μὴ πυ-  
 ρετὰ ἐπιγενομένη αἷλις τὸ ἔρον ρυῖ.

**Q**uibus ex stranguria volvulus succe-  
 dit, intra septem dies moriuntur,  
 nisi febre accedente copiosa urina  
 effluat.

**H**æc eadem sententia extat in *Coac. sect. 3.*  
*n. 314. & apud Cels. l. 2. c. 8. p. 74. & 70.*

*Stranguria* seu stillicidium urinæ est a collo ve-  
 sicæ spasmodice affecto. Conf. not. ad 5 *aph. 58.*  
*Volvulus* seu iliaca passio est morbus in intestino  
 ileo, quando ex ingestis nihil descendit deor-  
 sum in intestina crassa, sed adest pertinax alvi  
 suppressio cum horrendo fæcum alvinarum vo-  
 mitu vid. not. ad 3 *aph. 22.* Si spasmi vesicæ  
 eousque invaluerint, ut volvulum faciant, ob-  
 servatio docuit Hippocratem, ægrotum intra  
 septem dies occidi, nisi superveniens febris  
 referet vias, laxatisque ad inferiora vesicæ spa-  
 smis urinam acervatim profluere faciat. Conf.  
*Eph. N C. Cent. 3. obs. 185.* Ad veritatem præ-  
 sentis aphorismi demonstrandam, non est, cur  
 eos volvulos excipiamus, easque strangurias,  
 quæ ab inflammatione dependent, quando in  
 ipsomet contextu satis artificiose excipiuntur,  
 per illa verba, *nisi febre accedente.* Cum enim  
 hi morbi ab inflammatione dependere non pos-  
 sint,

sint, quin febris concomitetur, eamque excludat, dum inquit: *non accedente febre*, signum est, eos morbos intellexisse, qui sine febre & inflammatione fiunt. Quare & stranguria, & volvulus, de quibus agitur in aphorismo, necessario a crudis succis dependent, qui in alvo constipati, utrumque symptoma excitare possunt, & mortem etiam tandem inducere suppressa alvo, nisi a calore febrili attenuati ad urinæ vias deriventur. Cæterum cave, ne præsentis aphorismi doctrina febris volvulo succedens te decipiat, nam *lib. 3. de morb. n. 15.* adnotavit Hippocrates, si volvulo amoto febris ægrum corripit, desperatus est; quia, ut febris morbum tollat, necesse est ante quam volvulus removeatur eam accedere, & urinæ copiosam excretionem subsequi, ut in hoc aphorismo specialiter adnotatur. *Martian. p. 470.* Commentarius ad hunc aphorismum habetur in *Linden Sel. Med. p. 148 sq.*

Non ita est absurdum, ut, si acrimonia succi nervorum feratur per nervos in vias urinæ, idem ille humor in eodem plexu nervi formatus etiam feratur per alium nervi ramum ad mesenterium & intestina, in quibus etiam & ventriculo naturalem motum peristalticum irritando invertat, quo omnia intestinorum contenta trudentur sursum versus ventriculum, qui dein eadem vomitu ejicit. Sed quoniam causa non est levis, quæ valet intestinis non solum inferre vehementes dolores, verum etiam motum inversum; igitur si volvulus supervenit, scimus, magnam copiam humoris acrioris esse in corpore, qui nunc etiam ruit ad intestina, ubi evacuari non potest, & in viis urinæ, per quas erat evacuandus, parit evacuationis

tionis difficultatem. Igitur retentus ille humor sensim fit acrior, concitans ingentem motum inversum per totum tractum intestinorum & per ventriculum, quo motu valido perturbato, cum ejectione omnium quæ per os ingeruntur, & in intestina atque ventriculum confluent, summa nascitur debilitas exhaustis spiritibus, & defectus humorum continua violenta illa evacuatione. Igitur mirum non est, si homo sit impar ferendo hæc omnia per septem integros dies, ut prius succumbat violentiæ morbi. Hinc non dicit auctor, septimo die perire, sed *in septem diebus*, id est, raro persistere possunt ultra septem dies. Eum tamen morbum periculosissimum, qui *intra septem dies* mortem minabatur, observavit curatum fuisse a febre superveniente & urina abunde fluente. Illa autem febris accedens, si simul non faciat copiosam urinæ evacuationem, non curaret dirissimum illum morbum, sed tunc esset solummodo signum, Volvulum non fuisse natum ex inflammatione intestinorum, cui ab initio adfuisset febris, sed ex materia alia acri, quæ irritando tandem febrem excitat, Volvulum & Stranguriam producta fuisse. Si igitur motus vitalis instigatus hunc succum nervosum acrem commoveat, eumque ducat ad renes, & sub urinæ copiosæ forma eliminet, certe spes est, talem hominem liberari posse ab illa irritante acrimonia. Si Medicus tali in casu vocaretur ante quam urina fluere incipit, admodum difficile foret veram invenire indicationem curativam. Puto tamen nos imitari debere monstratam a natura viam, nempe dare medicamenta diuretica calefacientia, quibus concitatur febris & promovetur urinæ fluxus.

Id

Id autem observamus, nos non semper idem medicamentis posse præstare, quod natura facit ad conservationem suam; nam quamvis promoveamus urinæ fluxum, non tamen certo sequitur, eum humorem acrem per urinæ vias eliminari, quod tamen fit, si sponte talem evacuationem molietur. Hoc autem verum est, nos non posse propius accedere ad veram curationem, etiamsi semper non ex voto bonum effectum sortiatur. *Gorter.*

APHOR. 45.

Ἐλκεα ὁκόσαι ἐνιαύσια γίνονται, ἢ μακρότερον χρόνον ἰσχυρίζιν, ἀνάγκη ἐστὶν ἀφίστασθαι, καὶ πᾶς ἕλκεος κοίλας γίνεσθαι.

Ulcera annua quæcunque fuerint, aut longius tempus habuerint, os abscedere est necesse, & cicatrices cavas fieri.

Ab ichore ulcerum inveteratorum subjectæ non solum corrumpuntur carnes, sed latus etiam usque ad ossa serpit, quæ erosa evadunt atque cariosa: unde sanatio, propter ablata substantiam osseam, quæ abscessit, non procedit nisi cum cicatrice cava. Quæcunque autem ex parte os aut ustum, aut sectum, aut quavis alia ratione secesserit, in hujusmodi ulceribus cicatrices cavæ fiunt. *Hippocr. de ulcer. n. 5.* Sed videmus etiam ulcera multorum annorum, in quibus os incorruptum mansit: quare

quare non ita absolute pronunciare possumus, os adjacens esse corruptum, si ulcus habeatur vetustum. Periculum tamen est, os corrumpi posse ab adjacente ulcere vetusto. Humor enim ille acris consolidationem impediens facile potest simul corrodere periostrium, quo os privatum cariem contrahit: potest etiam ille humor corruptus ossi communicari, & ita inficere ejus medullam, ut os corrumpatur. Sed si os subjacens corruptum sit, tale ulcus tarde ad curationem deducitur, quum os in suis cellulis rigidis humore corrupto impletum, non facile possit eum evacuare humorem; rigiditas enim illarum partium extrusionem & expulsionem materiæ corruptæ impedit, quæ facilius fieri potest in partibus mollioribus. *Gorter.*

## A P H O R. 46.

Οἱ κρίσοι ὑβροὶ ἐξ ἀσθματικῶ, ἢ βηχὸς γίνονται  
πρὸ τῆς ἡβῆς, ἀπόλλυνται.

Qui gibbosi ex asthmate, aut tussi fiunt  
ante pubertatem, moriuntur.

Gibbosi, ὕβρωι, dicuntur, quibus dorsum foras eminet. Quibus adhuc pueris ante perfectum corporis augmentum spina in gibbum attollitur, his quidem corpus ad spinam augeri non solet. *Hippocr. de artic. n. 37.* In ætate puerili ex asthmate & tussi gibbi fieri possunt; quia dum vehementer & frequenter tussire coguntur magna cum thoracis commotione, &  
Vol. II. V quidem



quidem variis modis, antrorsum, retrorsum, & in alterum latus contorquendo, articulationes vertebrarum laxæ & molliores facile luxantur. Ubi vero adolefcunt pueri, partesque interiores augentur ac ampliantur, thoraci interim, ob vertebrarum luxationem, cedere nesciente, hinc fit, ut cor & pulmones constringantur. *Sebiz. Exerc. Path. T. I. p. 324.* Ego plurimos tales vidi, ut etiam Gradus fatetur, nunquam curatos; licet etiam cum magna diligentia tractarentur. *Forest. Obs. Med. l. 16. obs. 9. schol.* Plerumque & fere omnes, quos ego vidi, macie confecti fuerunt. *Barthol. Cent. 3. epist. 78. p. 330.* Pereunt phthisici ut plurimum, a pulmonibus per pressionem labefactatis. *Hecquet.* Ante pubertatem ossa cedere possunt ipsa adhuc minus rigida, & cartilagine articulationum minus duræ; ex asthmate igitur, ac tussi proveniens gibbositas arguit aliquid intra pectus molestum, & valide premens, atque ossa extrorsum movens; duratis igitur ossibus premens illud locum sibifacere extrorsum ulterius non poterit, quare premet introrsum vasa sanguinis & cor, unde subita mors. *Bellin. de urin. &c. p. 663.*

Circa hunc aphorismum multum laborarunt interpretes. Eorum tamen sententia propinquior vero videtur, qui hæc Coi verba de iis pronunciata esse existimant, quibus ex metastasi pravi humoris ad interiora thoracis facta, tumores, seu tubercula formata fuerunt. Dum enim ejusmodi tumores sub vertebrarum ligamenti, earumque periostio, ipsi ossi inhærescunt, illa vincula ea parte attolluntur, & violentius adducuntur, quibus sic spina inclinata in contrariam partem projicitur, & gibba redditur.

redditur. Hæc tubercula, quamdiu adhuc in inflammatione consistunt, narium hæmorrhagia quandoque solvi, Hippocrates animadvertit in *Coac. sect. 3. n. 8.* Si vero illa magis nocenter adulescunt, ad suppurationem spectant, tandemque maturescunt, per se aperiuntur, & pus effundunt. Hujus puris si magna vis est, pulmo comprimitur, & homo, intercepto spiritu, perit. Si vero non multum puris ejectum fuit, illud in pulmones, qui tumori non raro inhærescunt, destillat, hos exest, ex qua exulceratione frequens tussis, purisque exscretio, accedit, & vera phthisis, quæ tandem hominem tollit. Disertis verbis hanc rem alio loco indicare videtur Hippocrates, ubi tubercula, circa pulmones orta, gibberis & distentionis nervorum (per τὰ νεύρα ligamenta intelligit) causam esse pronunciat *lib. de artic. n. 37.* Vid. *Platner Opusc. T. I. p. 130. 204.*

## APHOR. 47.

Ὅσοισι φλεβοπμία, ἢ φαρμακίη συμφέ-  
ρει, τῆς πρὸς προσῆκον τῆ ἡρᾶ φλεβο-  
μίας, ἢ φαρμάκιδεν.

Quibus venæ sectio, aut medicamen-  
tum purgans confert, iis venam  
vere secare, aut medicamentum  
purgans exhibere convenit.

Vere oriri vel excitari solent morbi varii ab  
accumulatis in corpore, propter impeditam  
hieme perspirationem, cruditatibus. vid. 3 aph.

20. Ad eos igitur præcavendos evacuatio institui debet vel venæ sectione, vel catharticiis. Venæ sectio enim nimiam sanguinis quantitatem, purgationes vero feri vitiosi copiam corpori detrahunt. *Hoffm. Med. rat. T. 1. p. 653.* Magna autem animadversione particula illa disjunctiva digna est: Practicorum enim non pauci magnum piaculum committere sibi videntur, si purgationem verno tempore instituentes venam simul non tunderent. Ast quam longe a divini Præceptoris vestigiis aberrant nemo non videt. Est ubi tantum sanguinem mittere oporteat, est ubi solum purgare liceat, est ubi utrumque remedium conveniat. *Ramaz. Oper. p. 118.* Temperamenta biliosa & sanguine fervida, pléthorica, venæ sectione indigebunt magis. Si humorum qualitas est vitiosa, cathartica conveniunt. Si vero peccet & pléthora & qualitas humorum, fiat primo venæ sectio, tum detur catharticum.

## APHOR. 48.

Τοῖσι σπληνώδεσι δυσεντερῇ ἐπιγενομένη, ἀγαθόν.

Lienosis accedens intestinorum difficultas, bonum.

Celsus l. 2. c. 8. p. 70. sententiam hanc in his expressit: *Lienosis bono tormina sunt.* Explicationem vide ad 6 aph. 43.

APHOR.

## APHOR. 49.

Ὅλα ποδαγρικὰ νασήματα γίνονται, πῦ-  
τα ἀποφλεγμύναντα ἐν πεσάραιοντι ἡμέ-  
ρησιν, ἀποκαθίζονται.

Podagrici morbi intra quadraginta dies,  
deposita inflammatione, decedunt.

Hujus sententiæ sedes est in *lib. de judicat.*  
*n. 6. Dolorem & inflammationem se remittere*  
*intra triginta dies, nisi vitium hominis accessit, li-*  
*teris mandavit Celsus l. 4. c. 24. p. 240.*

Præsens textus morbi naturam per se desi-  
nentis explicat, terminumque ponit ultimum:  
nam bonis medicamentis sæpe viginti diebus,  
citiusque multo finitur. At nostri homines  
podagram frequenter trimestrem, & fere an-  
nuam exhibent: quod ideo præter naturam  
morbi accidere videtur, a remediis aliquando  
perperam & temerarie sumtis. (adde victum  
incongruum, reliquumque regimen, quibus  
causæ mali redintegrantur). *Lister.*



## APHOR. 50.

Ὅσοις ἂν ὁ ἐγκέφαλος διακοπῇ, ταῦτοι-  
 σιν ἀνάγκη πυρετὸν, καὶ χολῆς ἔμετον ἐπι-  
 γίνεσθαι.

Quibus perfectum fuerit cerebrum,  
 iis febrem, & bilis vomitionem  
 supervenire necesse est.

Vulnerato cerebro & febris, & bilis vomitus supervenire plerumque solet. Verum quia aliquando accedit febris, quæ non ex vulnere dependet, cognoscere expedit, quando hæc vulneris accidens sit, & quando non. Hoc autem nos docuit Hippocrates lib. de loc. in hom. n. 48. his verbis: *Ex rupto febris non ultra tres aut quatuor dies prebendit. Quod si prebendat, rarus quis ex rupto ea detineri, alia quapiam ex causa corripuit, neque ea veluti ex rupto tractanda.* Hæc Hippocrates, ex quibus videtur colligi posse, febrem ex vulnere die tertia, aut quarta, non citius invadere, & ratio est, quia febris excitatur, quando in vulnere oritur inflammatio: de qua re lib. 4. de morb. n. 22. *ulcera die impari inflammari* ait, & dierum imparium primus, est tertia dies. Unde apparet recte dictum fuisse, non ante tertium diem febrem vulneribus supervenire. Ex adverso idem Hippocrates lib. 7. Epid. n. 19. inquit: *Quibus ossa fracta fuerint, eos septimo die febris invadit, tempore vero calidior*

*salidiorē etiam citius. Quod si magis contracta fuerint, etiam illico.* Hæc loca invicem conciliantur, si dicamus libro *de loc. in hom.* auctorem intelligere de ruptionibus, quæ in carne fiunt, quæ citius inflammantur ob sanguinis præsentiam, & loci caliditatem, quam quæ in osse fiunt. Quod si aliquando in ossium ruptione febris statim superveniat, id non ex inflammatione provenit, sed ob læsionis vehementiam, cujus gratia maxima fit in corpore perturbatio, & agitatio in humoribus, ex quibus febris oritur, & ideo in ossium fracturis, & ruptionibus minus malum est statim, aut paulo post febrem supervenire, quam die quarta, aut septima, unde Hippocrates de capitis vulneribus tractans lib. 2. *Prædict. n. 22.* habet: *Præstat igitur eum qui capitis ulcere laborat, neque febricitare, neque insuper sanguinis profusionem, aut inflammationem, aut simul dolorem aliquem accedere: aut si eorum quippiam appareat, circa initia tutissimum est fieri, paucoque tempore perseverare.* Et paulo inferius subjungit: *At febris in capitis vulnere die quarto, aut septimo, aut undecimo exorta, valde exitialis est.* Hic aphorismus ex lib. 1. *de morb. n. 3.* absque dubio desumptus est, quo in loco legitur hoc modo: *Si vero vulneratum fuerit (cerebrum scilicet), necesse est febrem, & bilis vomitum succedere, corporisque partem aliquam resolutam fieri ac perire;* quæ quidem postrema verba omisit aphorismorum auctor, ea superflua ratus, vel etiam fortasse suspecta, cum verissima sint, & rationabilia. Necessitatem tamen eventus non videtur recepisse auctor *Coacarum Prænotionum*, nam *sect. 3. n. 371.* hanc referens sententiam, quod hoc in loco legitur, *necesse est, febrem & bilis vomitum succedere*, ibi inquit,

*febris ut plurimum, ac bilis vomitus succedit.* De qua quidem sententiarum diversitate notandum est: Quotiescunque vulnus cerebri notabilis est magnitudinis, non minimum, & fere imperceptibile, ægerque a communi hominum conditione, & natura non recedat, præfata omnia necessario eveniunt. Aliquando tamen non omnia superveniunt, vel quia mors ea prævenit, vel quia vulnus levissimum, & superficiale est, in eaque cerebri parte, quæ minus periculosa est. Similiter vulneratus peculiari virtute a prædictis malis non facile corripitur. Hæc enim omnia considerans Hippocrates *lib. 2. Prædict. n. 19.* hæc ait: *Sunt autem hæc perniciofa valde, non tamen ita, ut nemo ex his evadat, velut putatur, &c.* Aliquando enim neque febricitat, neque inflammatur sauciatus. Quod respiciens in *Coac. l. c.* addidit *ut plurimum*, idque universalitatem propositionis non tollit, quia rarissimum est, ut hæc vulneribus cerebri non superveniant, & extra naturalem partis, & hominis dispositionem, ita ut si quis evadat, necesse sit id evenire, quia vulnus in ea parte cerebri inflictum est, in qua minus affligitur, v. g. pars posterior; vulnusque omnino exiguum est. Similiter, si aliquando observatum est, ex vulnere cerebri nullius partis resolutionem subsecutam esse, id evenire potuit, quia per illam cerebri partem vulneratam, particulari structura, nulla arteria disseminata fuerit, ex cujus sectione sensus & motus intercipitur. Si denique aliquando cerebri vulnus non subsecuta est febris, id particulari hominis complexionem imputandum est; sunt enim quidam, qui difficulter ex propria natura febres incurrunt, quemadmodum alios ex simplicissimo

mo vulnere febrem incurrere observamus: quare cum hæc a particulari, individualique hominis proprietate eveniant, & admodum raro, universalitatem propositionis tollere non possunt. Unde summa cum ratione *lib. 1. de morb. n. 3.* necessitas eventus apposita est, *febrem necesse est supervenire, & bilis vomitum, &c. Martian. p. 471. & 163.* Si cerebrum membranae ejus vulnus accepit, sanguis per nares, quibusdam etiam per aures exit; fereque bilis vomitus insequitur: &c. *Cels. l. 5. c. 26. §. 14.* Febris accidit ab sanguine effuso & in pus converso, tum etiam a meningibus per vulnationem inflammationem recipientibus. Sed febris non semper statim inter initia vulneris accenditur, sed plerumque tertia demum aut quarta die. At vomitus statim supervenit vulnere cerebri propter vulneratas meninges, nam sunt hæc nervosissimæ ac cæteros nervos in consensum trahunt, & ob nervum sextæ conjugationis bilis exprimitur. *Tozzi.* Notum est unicuique Chirurgorum, capitis ac cerebri, hujusque membranarum, inflammationes, vulnera graviora atque contusiones, vomitum sequi, per consensum, quem ventriculus vi, parvis nervorum vagi, cum capite fovet. *Hoffm. Med. rat. T. 4. P. 3. p. 498.*





## APHOR. 51.

**Ο** κόσσιον ὑγαίνουσιν ὀδύνας γίνονται ἰξαι-  
φνης ἐν τῇ κεφαλῇ, καὶ ποραχρῆμα  
ἄφῳνοι γίνονται, καὶ ῥέγχουσιν, ἀπόλλυνται ἐν  
ἑπτα ἡμέρῃσιν, ὥστε μὴ πυρετὸς ἐπιλάβῃ.

**Q**uibus bene valentibus capitis dolo-  
res derepente contingunt, statim-  
que voce deficiunt, & stertunt,  
intra dies septem pereunt, nisi febris  
eos prehenderit.

**E**adem sententia legitur in *lib. de Judicat.*  
*n. 12.* & *lib. 2. de morb. n. 6.* & apud  
*Celsum l. 2. c. 8. p. 72.*

Apoplectica notatur affectio, quæ ex pera-  
cutarum est classe. Febris accedens solvere  
interdum potest compressum nervorum princi-  
pium: quæ si corripuerit, plerumque homo  
sanus evadit, juxta *Hippocr. lib. 2. de morb. n.*  
*21. Conf. 5 aph. 5.* Subitus ille insultus doloris  
cum vocis suppressione, & stertore indicat co-  
piam ingentem materiæ comprimentis cere-  
brum, quæ nisi trajiciatur in vasa sanguinis,  
ita ipsum premet, ut spirituum influxus impe-  
diat, unde mors; traducta autem in vasa san-  
guinis febrem excitat, & per eam absimitur, vel  
tenuatur, & per excrementa redditur, quare  
patet pronunciati ratio. Vid. *Bellin. de urin.*  
*&c. p. 580.*

**APHOR.**

## APHOR. 52.

Σκεπεῖν δὲ χρὴ καὶ τὰς ὑποφάσας τῶν  
ὀφθαλμῶν ἐν πῖσιν ὕπνοισιν. ὡς γάρ τι  
ὑποφαίνεται, (μὴ) ἑμβλαλλομένων τῶν βλεφάρων,  
τῇ λευκῇ, μὴ ἐκ διαρροῆς ἐόντι, ἢ ἐκ φαρμα-  
κοποσίας, φλαῦρον τὸ σημεῖον, καὶ θανατῶδες  
σφοδρά.

Spectare vero oportet quæ etiam ex  
oculis per somnum subapparent.  
Etenim si quid ex albo, (non) com-  
missis palpebris, subappareat, neque id  
ex alvi profluvio, aut medicamenti po-  
tione contingat, pravum signum est, &  
letale admodum.

Mutilatus hic aphorismus etiam est apud  
Celsum l. 2. c. 6. p. 54. & c. 8. p. 72.  
Integer habetur in Prognost. n. 3. ita: *Quin etiam  
per somnum, an ex oculis aliquid subappareat, spectare  
oportet. Ubi namque non commissis palpebris ex albo  
quid subappareat, id si neque alvi profluvium, neque  
medicamentum purgans expressit, neque ita dormire con-  
sueverit æger, pravum est indicium & letale admodum.*

Subapparentia ista in oculis semiclausis notat  
convulsionem, quæ si a vehementi medicatio-  
ne, aut diarrhoea fiat, ipso somno levare po-  
test. Sin autem morbi alicujus acuti, apople-  
xiæ puta, symptoma est, letale. *Lister.* Ob-  
servavit

fervavit Auctor in ægris, quando propter debilitatem videbantur dormire, si palpebræ non bene commissæ servantur, ut in somno naturali fieri solet, istum somnum non esse somnum naturalem, sed abolitionem sensuum defectu spirituum, & inde ægros plerumque mori: adeo ut palpebræ ita conniventes arguant tantam debilitatem, quæ a morte non multum distat. Hæc autem debilitas inducta si fuit per copiosorem evacuationem, non est tanti periculi, quam si fiat a degeneratione humorum, subito enim facta evacuatio valet ita minuere sanguinis fluxum ad cerebrum, ut homo sensibus privetur, sed sensim contractis magis vasis iterum ducitur sanguis ad cerebrum, & homines servantur, quod fieri non potest, si ex degeneratis spiritibus illa debilitas inducta fuerit. Inde oculi ita in dormientibus conniventes post quamcunque largiorem evacuationem, non magnum periculum portendunt, ut inde mortis præsagium faciant. Quod autem auctor dixerit post alvi fluxum & alvi ductionem, non vero post quamcunque evacuationem, inde est, quia, quod observavit, posteritati reliquit, & quia forsan non ita detexit oculos conniventes in ægris post alias evacuationes. Ego autem in præxi detexi hoc etiam post hæmorrhagias largiores, & inde magis generalem regulam de oculis conniventibus formare possumus. *Gorter.*



**APHOR.**

## APHOR. 53.

**Α**ἱ παραφροσύναι, αἱ μὲν μετὰ γέλωτι γινόμεναι, ἀσφαλέςτραι· αἱ δὲ μετὰ σπασμῶδους, ἐπισφαλέςτραι.

**D**eliria, quæ cum risu fiunt, tutiora:  
at quæ cum studio, periculosiora.

**C**elsus l. 3. c. 18. p. 154. in hunc modum expressit: *Neque ignorare oportet, levioresse morbum cum risu, quam serio insipientium.*

Deliria cum risu temporarias notant & transitorias sanguinis æstuantis turbas: cum studio autem seu sollicitudine magis fixum & penitius infarctum vasis sanguinem spissiore quam ut transferri queat. Conf. 2 aph. 2. Παραφροσύνας merito dixit, non phrenitides, in quibus fortasse hæc sententia non verificatur, propter phrenitides ex septo inflammato contingentes, quæ plerumque cum risu fiunt, & tamen omnium sunt perniciosissimæ. Hoc expertus est Silenus, qui lib. 1. Epidem. sect. 3. ægr. 2. cum risu, & cantu delirans mortuus est, & Tychon, qui in obsidione circa Datum a catapultâ percussus in pectus, paulo post risus erat circa ipsum tumultuosus, cujus rationem assignavit Hippocrates, quia Medicus eximens lignum aliquod, de spiculo reliquerit in septo transverso: ut in illius historia videre est lib. 5. Epidem. n. 34. Deliria autem in hujusmodi affectibus cum risu fiunt, non ex benignitate humoris,

ris, sed partis affectæ natura, quæ est septum transversum, quod præcipuum risus instrumentum censetur. *Martian. p. 471.* Nisi fallor, Hippocrates festinationem (μετὰ σπουδῆς) significare voluit, quod genus delirii frequentissimum & plerumque exitiosum esse novimus. *Platner Opusc. T. 2. p. 103.*

## APHOR. 54.

Εἰν πῖσιν ὀξείσι πάθεισι πῖσι μετὰ πυρετῆ, αἱ  
κλαυθμώδεις ἀναπνοαὶ, κακαί.

In affectionibus acutis cum febre, gemebundæ spirationes, malæ.

Respirationes hic notantur interruptæ, & convulsionibus. Vid. 4 aph. 68.

## APHOR. 55.

Τὰ ποδαγρικὰ πῦρ ἔρῃ, καὶ τοῦ φθινοπώρου  
κινείται ὡς ἐπὶ τὸ πλὺ.

Podagræ vitia vere, & autumnno moventur ut plurimum.

Eadem habet Celsus *l. 4. c. 24. p. 238.* Inter morbos vernaes recensentur articulorum dolores, in 3 aph. 20; autumnno coxendicum dolores oriri dicuntur 3 aph. 22.

Non vult textus, quod non aliis anni temporibus etiam podagra timeri possit, aut obtingat, sed quod ver & autumnus ei producendæ

dæ magis opportuna sint : nam morbi alii ad alias anni tempestates bene, vel male habere consuevere, juxta 3 aph. 3. Sub vere novis elateribus catuliens aër, sanguinem movet, pandit, evolvit, qui sic animatus quæ sinu condebat morborum semina fundit. Autumno adveniente, propter inæqualitatem aëris mox frigidum mox calidum, transpiratio læditur: unde articulus morbus a retropulso evaporabili. *Hecquet.* Dignissimus quondam Professor in Academia Petropolitana, Gmelinus, Materia, inquit, dolores arthriticos creans, est certe mihi mucilago, nulla quidem qualitate, nimia tantum abundantia peccans. Diuturnitate vero temporis lentor, forte & acredo illi induci potest, quod utrumque ex hac ratione, tanquam effectus morbi, considerandum est. Causæ, nimiam hujus mucilaginis abundantiam efficientes, non quærendæ sunt in natura sanguinis, particulis mucilaginosi abundantis; sed in vasis eam secernentibus nimium laxis, vel a quacunque causa alia dilatatis. Ex hac sola consideratione explicari potest quæstio, *cur podagrici & arthritici periodos suas patiuntur verno plerumque & autumnali tempore?* Aëris nimirum humiditas fibras natura debiles relaxare facile potest, ut tum vasa, quæ ex iis contextuntur, majorem diametrum nacta, nimiam transmittant mucilaginem. Vid. *Com. Litt.* 1733. p. 68 sq.



APHOR.

## APHOR. 56.

**Τ**ῶν μελαγχολικῶσι νεσθήμασιν ἐς τὰδε ἐπικίνδυνοι αἱ ἀποσκήψεις, ἢ ἀπωληξαί τῶ σώματι, ἢ σπασμὸν, ἢ μανίαν, ἢ τύφλασιν σημαίνουσι.

**M**orborum melancholicorum periculosi decubitus, aut corporis siderationem, aut convulsionem, aut furorem, aut cæcitatem significant.

**H**umor melancholicus (sanguis spissus, ater, ) qua parte decumbit, creat morbum. Vid. 4 aph. 22. In præsentī aphorismo notantur periculosa humoris atrabilarii ad cerebrum metastases, quas apoplexia, epilepsia, cæcitas, aut ipsa mania sequitur: quare omnis cura adhibenda est, ut ne perversi ejusmodi motus translatorii seu feræ sanguinis ad caput congestiones procurentur, quale quid fieri maxime solet ab acerbis animi perturbationibus, aut largiori vini potentis inter dies caniculares potatione, vel denique omni medela, quæ liquida nimium exagitando vires deprimere valet. Hoffm. Med. rat. T. 4. P. 4. p. 213. Per *apoplexiam corporis* ne credas Hippocratem intelligere apoplexiam proprie dictam, in qua corpus universum & sensu, & motu privatur, quia frustra appositæ fuisset illa particula, *corporis*, quod Hippocratis stylo, & aphoristica phrasi penitus repugnat. Verum intellige affectionem

fectionem illam, quam alibi paraplegiam vocat, nosque paralyfin communiter dicimus. Cum enim eadem sit affectio paraplegia cujusdam partis corporis, quæ est apoplexia totius, non improprie paraplegia, sive paralyfis, apoplexia particularis dicitur, quod in præsentî sententia Hippocratem fecisse, ex eo persuaderi potest: quia *lib. 1. de morb. n. 3.* ubi eadem sententia registrata est, quod in aphorismo habetur, *aut apoplexiam corporis, ibi paraplegia legitur*, cujus vocis interpretatio adhuc confirmatur ex *Coac. sect. 3. n. 371.* ubi hæc legimus: *Quibus cerebrum vulneratur, febris plerumque ac bilis vomitus accedit, & corporis apoplexia, ac tales perniciose habent.* Nam eandem referens sententiam, quod in Coacis habet, *& corporis apoplexia, lib. 1. de morb. n. 35.* ait, *& aliquid corporis apoplecticum fieri necesse est, ac perire.* Quapropter nulli dubium esse potest, quin hoc in loco per apoplexiam corporis, paraplegiam proprie dictam intelligat. Ex quo percipere licet, quantum ab Hippocratis mente, & a veritate ipsa recedant illi, qui paralyfin, quam dicunt, ab humore melancholico fieri posse negant, aut saltem raro, ea promoti ratione, quia ipsis non videtur fieri posse, ut humor, qualis est melancholicus, crassus, & tenax, angustissimos nervorum poros pervadat: quod si tandem contingeret, non paralyfis, quæ mollities quædam & laxitas nervorum existit, sed convulsio potius excitaretur. Quod nervorum affectiones ut plurimum a melancholico succo oriantur, id plurimæ Coacarum Prænotionum sententiæ palam faciunt. Quare cum Hippocrates experientia edoctus asserat, atrabilarios morbos in paralyfin, & convulsionem

Vol. II. X trans.



transmutari frequenter, ratioque evidens id confirmet, temerarium est ab Hippocrate recedentes, novas opiniones inani ratiocinatione venari, nec est necesse in paralyfi nervos humectari, dummodo spirituum transitus impediatur: & quia in eodem errore versantur etiam plurimi eorum, qui Hippocratis doctrinam profitentur, ut in posterum excusari non possint, nonnulla loca adnotare volui, ex quibus constat, apoplecticos affectus, sive totius, sive partis alicujus, ab humore melancholico, non a pituitoso & frigido ortum habere. Primo autem *lib. de gland. n. 9.* apoplexiam ab acri fluxione in caput firmata generari testatur, quæ certe a pituita esse non potest, nisi hæc falsa esset, quare nec frigida & humida erit. Præterea *lib. 2. de morb. n. 6.* apoplexiæ speciem describit, quam ab atræ bilis affluxu, sanguine refrigerato fieri testatur, & *lib. de vict. acut. n. 37.* ex atræ bilis, & acrium humorum influxu apoplecticos & paralyticos fieri testatur. Unde *7 aph. 40.* Si lingua, inquit, *derepente impotens fiat, aut aliqua corporis pars apoplectica, melancholicum tale existit.* Qua hujus morbi causa supposita, mirum non est, si (quod in *Coac. sect. 3. n. 318.* legimus) apoplecticis hæmorrhoides supervenire sit utile, humore melancholico per eas expurgato. *Martian. p. 472.*



APHOR.

## APHOR. 57.

**Α**πόληκτοι δὲ μάλιστα γίνονται ἡλικίῃ τῇ  
ἀπὸ πεσσαράκοντα ἐπίων ἄχρῃς ἐξήκοντα.

**A**t apoplectici fiunt ea ætate maxi-  
me, quæ est ab anno quadragesi-  
mo ad sexagesimum.

**Æ**tas ad senilem vergens in stases proclivis  
est, propter rigiditatem fibrarum, quæ  
valide strictæ sanguinis serum exprimunt & col-  
luviam ferosam creant, unde compressio cere-  
bri. Vide Notata ad 2 *aph.* 42. & 3 *aph.* 31.  
& *Boerb. aph.* 1010. n. 2. γ. Ab anno quadrage-  
simo usque ad sexagesimum, confecto corporis  
augmento, succi in vasis plus justo non modo  
accumulantur, sed & densiores fiunt. Hinc  
porro fit, quod qui temperamenti sic dicti  
sunt sanguinei, nec non obesi, cum iis, qui  
lautam, otiosam & sedentariam vitam sectan-  
tur somnoque indulgent, huic affectui admo-  
dum sint obnoxii. *Hoffm. Med. rat. T. 4. P. 2.*  
*p. 167.* Apoplexia corripitur solent plethorici  
vel ferosioris qui sunt naturæ, facilius enim in  
hac ætate sanguis nimis densus, spirituascentia  
orbatus, propter cerebri imbecillitatem ac to-  
ni relaxationem ibi hæret, stagnat, vasaque  
disrumpit, vel secessionem feri parat. *Hoffm.*  
*de morb. incongr. §. 4.*

## APHOR. 58.

**H**ν ἐπίωλον ἐκπίση, ἀνάγκη ἀποπνῦαι.

**U**bi omentum exciderit, ut putrescat necesse est.

**E**adem sententia exarata est in *lib. 1. de morb. n. 3. & Coac. sect. 3. n. 378.*

*Omentum* per vulnus foras excidens strangulatur a spastica peritonæi constrictione; in intercepto autem arctantur vasorum ejus diametri, unde humorum circuitus impeditus: sed hoc proximus ad sphacelum gradus est. Præterea vero omentum multa pinguedine donatur, paucissimis sanguiferis arteriis, contra lymphaticis numerosis, quæ facilius compressioni subjacent quam vasa sanguine rubro repleta. Ergo. *Hecquet.* Cur putrescat e vulnere propendens rationes datæ valent. Sed identidem observatum est, quod prolapsa omenti portio rursus debite in abdomen introducta seu reposita fuerit, bonis cum vulnerati rebus; si nempe statim antequam livorem contrahat aut nigrescat, calidum adhuc atque humidum, iterum reponatur. Vid. *Heister Chir. p. 111 sqv.* ubi etiam discere licet, quid cum corrupta portione factu opus sit. Non ergo absolute positum absolute verum esse aphorismum, contenditur in *Laur. Exerc. p. 308 sq.* Verum aphorismi effatum erat in Thracia & Thessalia, quia aer ibi est corruptioni magis obnoxius. *Cardan. p. 731. Conf. 5 aph. 46.*

APHOR.

## APHOR. 59.

Ὀχύοσις ὑπὸ ἰσχιάδος ἐνοχλαμένοις χρόνις  
ἐξίσταται τὸ ἰσχίον, καὶ πάλιν ἐμπίπτει,  
τεπίοις μύξαι ἐπιγίνονται.

Quibus diuturno coxendicis dolore  
conflictatis coxendicis articulus  
suo loco excidit, ac rursus recipi-  
tur, iis mucrores innascuntur.

Ἰσχιάς, *passio ischiadica, coxarius dolor, coxendicus*  
*dolor, coxagra, ischiagra, Barbaris Sciatica*, ar-  
thritidis est species (vid. not. ad 6 aph. 28.),  
eaeque omnium saevissima, arthritis coxendicis,  
dolore occupante dearticulationem magni os-  
sis femoris capitis cum cavitate ossis ischii, quæ  
acetabulum dicitur. Os ischium etiam coxa, &  
coxendix, dicitur, unde denominationes mor-  
bi intelliguntur. Antecedit & quasi auspicatur  
hoc malum aliquando vicinorum musculorum  
dolor, & maxime lumborum; aliquando vero  
ab ipsa junctura initium fit affectionis. Dolor  
ischiadicus hoc proprii habet, quod latius,  
quam in aliis articulis, & sæpe ad vicina loca  
diffunditur. Vertebrae dorsii, cervicisque do-  
lent, & in summo sacri ossis dolor inhærescit.  
Vid. *Aëtius l. 12. c. 1.* In coxendicum morbo,  
dolor coxæ connexionem invadit, & extre-  
mas nates, & protuberantem in summa femo-  
ris parte carnem quæ γλυτός dicitur. Ad ex-  
tremum vero per totum etiam crus dolor de-  
errat.

errat. *Hippocr. lib. de affect. n. 30.* Æger articulos præ dolore, qui in eis est, inflectere ac movere non potest, & eo quod spinæ vertebræ constrictæ sunt. Dolor autem magis est ad lumbos & vertebrae, quæ ex obliquo coxendicum sitæ sunt, & ad genua. Dolor autem acutus & æstuosus plurimo tempore in inguinibus, sed etiam in coxendicibus insitit, & si quis eum erigat, non transmovetur, ingemiscit autem quam maxime potest præ dolore. Interdum vero etiam convulsio, & rigor, & febris supervenit. *lib. de dieb. judic. n. 6. & de intern. affect. n. 54.* Hoc morbo diu detentis si os (caput) femoris ex suo articulo decidit (seu luxatum est) & rursus incidit (h. e. rursus repositum), his ibi loci humor pituitosus seu mucus, e glandulis copiose effluens, coacervatur: nam inde arguitur ligamentorum laxitas, propter quam luxatio & repositio fieri potuerunt. *Conf. Heister Chir. p. 255.*



APHOR.

## APHOR. 60.

**Ο**κόπισιν ὑπὸ ἰσχυιάδος ἰνοχλαμένοις χρενίης  
 πὲρ ἰσχίον ἰξίζεται, τρεπείσκει τήκεται πὲρ  
 σκέλος, καὶ χωλῶνται, λυὸ μὴ καυθῶσιν.

**Q**uibus diuturno coxendicis morbo  
 conflictatis femoris caput suo lo-  
 co excidit, iis crus tabescit, &  
 claudicant, nisi urantur.

**C**ohæret hic aphorismus cum præcedente;  
 & docemur in eo, tabem seu atrophiam  
 cruris, atque claudicationem contingere, ubi  
 nempe ischiadicum malum inveteraverit & lu-  
 xatio capitis femoris facta fuerit: illa autem  
 mala præcaveri uisione. Et tabes quidem  
 oritur a compressione arteriosorum, unde nul-  
 lum alimentum in partes inferiores influit; clau-  
 dicatio autem fit, quia crus ob atrophiam ro-  
 bore destituitur & ob luxationem fit brevius,  
 & ob ligamentorum laxitatem os femoris non  
 firmiter stabilitur. *Ubi ossa suis sedibus non inte-  
 gre restituuntur, sed aliqua ex parte deficiunt, tem-  
 poris lapsu coxa, femur & tibia emacrescunt. Ac  
 si quidem intro luxatio facta est, exteriori parte, si  
 extra, interiori parte extenuatio fieri solet. Plerum-  
 que tamen intro excidunt. Hippocr. de fract. n. 17.  
 Si vero intus cartilago coaluerit, & articuli concreti  
 fuerint, omnino hominem claudicare necesse est. de  
 intern. affect. n. 58. Ad hos præcavendos ma-  
 los morbi exitus, uisionem commendat Hip-  
 CRATES. X 4* po-

pocrates. *Post purgationem - - si æger non juvetur, ei multas & altas crustas, in ossibus quidem partibus per fungos, in carnosissimis vero per ferramenta, inurito. ibid. n. 56. Quod si in uno aliquo loco firmiter constiterit dolor, neque medicamentis expellatur, quocunque loco dolor forte extiterit, eum lino crudo inurito. lib. de affection. n. 30. Ultimum est, tribus aut quatuor locis super coxam, cutem candentibus ferramentis exulcerare. Cels. l. 4. c. 22. p. 236. Quemadmodum humerus, ita etiam coxa propter humiditatis copiam nonnullis excidens, unctionem postulat. Convenit igitur tunc illum præsertim locum adurere, e quo articulus excidit; sic enim humor redundans desiccabitur, & locus cicatrice densatus non amplius os suscipiet, quare etiam penitus illic unctionem moliri convenit. Paulus l. 6. c. 76.*



**HIPPOCRATIS**

**HIPPOCRATIS**  
**APHORISMORUM**  
**SECTIO SEPTIMA.**





AMITABH O. . . . .

३४

# HIPPOCRATIS

## APHORISMORUM

### SECTIO SEPTIMA.

#### APHOR I.

Εν πικρῇ ὀξείᾳ νοσήματι ψύξις ἀκρωτηρίων,  
κακόν.

In acutis morbis extremorum refrigeratio, malum.

Extat hæc sententia apud *Celsum* l. 2. c. 4. p. 51. Tantum vero differt extremorum refrigeratio, de qua in præsentī aphorismo agitur, ab exteriorum refrigeratione, de qua 4 *aph.* 48. quantum differt signum malum a le-  
tali. *Martian.* p. 473.

Per *extrema*, sive partes extremas, intelliguntur manus & pedes cum suis digitis, tota etiam membra, atque nares & aures, quæ nempe partes remotissimæ sunt a corde, & ipsum truncum corporis non constituunt: hæ partes quoniam magis expositæ sunt aëri externo, citius refrigerantur quam truncus ipse, si causa naturalis calefaciens, id est, motus vitalis sit debilis. Omnes morbi acuti febriles habent vehementem circulationem per totum corpus; quare omnes partes inveniuntur calidissimæ seu urentes. Tali ergo in motu vitali aucto per totum

totum corpus frigus extremorum fieri nequit, nisi istis in partibus diminuatur vitalis actio ultra modum: nam si minuatur causa morbi acuti, extrema quidem magis temperatum calorem acquirunt, sed nunquam ille eo usque minuitur, ut dici possit frigus; atque in hoc casu calor totius corporis simul minuitur, quando non dicitur frigus extremorum. Hæc igitur phrasis notat, extrema fieri frigida non cessante calore in trunco, & frigus fieri sine diminutione morbi. Hoc est periculosissimum: nam si maneat morbi causa, & minuatur circulatio in extremis, quod ex refrigeratione cognoscitur, signum est vires vitæ, a morbi materia validissime irritatas, tam debiles esse, ut non valeant in partibus extremis proportionatam servare circulationem, quod fieri nequit sine virium summa debilitate. Si nunc hæc duo inter se conferantur, morbus nempe validus, & vires corporis debiles, rarum erit, si æger emergat; ergo hoc signum satis magnum periculum portendit. *Gorter.*

## APHOR. 2.

**Ε**πὶ ὁσέῳ νοσέοντι πᾶρξ πελιδνὴ, κακόν.

**C**aro livida ex osse ægrotante, malum.

**O**s carie infectum esse, demonstrat caro superincumbens livida, mollis, flaccida, &c. Vid. *Boerb. aph. 553.* Cum os corrumpitur, cutis & caro livescunt aut separantur. *Cardan.* Carnis autem naturalis color in livorem

rem commutatur, si sanguis ruber in vasis contentis concresecat. Hoc experimur etiam in tubulis minimis vitreis sanguine calente impletis; nam si sanguis ille diu hæsit in illo tubulo, donec globuli rubri sanguinis soluti in massam concreverint, dimittentes liquorem pellucidum non concresecibilem, color antea ruber in livorem commutabitur sponte. Carnis quoque color ruber livefcit, imo tandem nigrescit, si superveniente putredine corrumpatur. Ergo livor in adjacente carne signum est, sanguinem stagnantem esse concretum, & ita esse ineptum circulationi: talis autem fieri nequit, nisi tantus sit defectus in circulatione, ut sanguis fluidus servari nequeat. Itaque livor est signum defectus virium vitalium, & concretionis sanguinis. Verum talis status diu durare nequit, quin pars ea moriatur, & in putrilaginem abeat, unde tunc formatur ulcus sordidum cacoëthes. Neque minoris momenti est, si livor oriatur ex sanguine corrupto, quia nunquam corrumpitur, nisi partis vitalis actio sit extincta aut nimis debilitata. Igitur si ex osse ægrotante talis fiat caro, sive quod os corruptum ita inficiat carnem, sive quod caro adjacens ita sponte moriatur, in utroque casu malum est, nempe generabitur ulcus sordidum cacoëthes ex carne corrupta, & osse mortificato, vel carioso, qualia ulcera difficulter curari possunt. Ipsa caro livida facile prælagire potest etiam ossis corruptionem; nam quia significat, ea in parte subsistere circulationem, periosteum, ex carne accipiens vasa circulatoria, privabitur etiam motu vitali, quare os subjectum, quod ex periosteo hoc vitales humores accipit, defectu ejus morietur, & ita lenta carie consumetur. *Gorter.*

APHOR.

## APHOR. 3.

Εἰς ἐμέτω λυγξ, καὶ ὀφθαλμοὶ ἐρυθροὶ, κακόν.

Ex vomitione singultus, & oculi rubentes, malum.

Hic aphorismus in *Coac. sect. 2. n. 20.* legitur ita: *Ex sinceris vomitionibus singultus malus est; & apud Celsum l. 2. c. 4. p. 51. mali morbi signum est, post vomitum singultum esse, vel rubere oculos.*

*Oculi rubentes* significant ab vehementi concussionē sanguinem rubrum in adnatæ oculorum tunicæ vasa lymphatica impulsū esse. Singultus notat vel inanitionem, vel materiam acrem, rodentem, stimulantem, inflammantem. Vid. notata ad 5 *aph. 3 & 4.* *Singultus & oculorum rubor* si vomitui superveniant in morbis acutis, & ad aliquod tempus perseverent, letalia signa sunt, quia inflammationem cerebri, aut ventriculi denunciant: quæ inflammatio non modo ipsius singultus ac ruboris oculorum causa fit, sed etiam vomitus. Cerebrum enim inflammatum, sanguinem ad oculorum venulas exprimit præ copia, & in extimam oculi tunicam effundit; unde oculorum rubor, cui ventriculus consentiens, per nervos sextæ conjugationis admodum insignes, ab ea cerebri inflammatione facile in vomitum ac singultum impellitur.

litur. Ventriculus quoque inflammatus vomitum, & a vomitu singultum, & una cum singultu ruborem oculorum invehit, facto concursu sanguinis fervidioris ad oculos, propter maximum consensum, qui inter istas partes intercedit: quem facile ostendunt suffusionum initia, imaginumque ante oculos apparitiones, quæ plerumque vitiato ventriculo contingunt. *River. p. 280.*

APHOR. 4.

Εἰς ἰδρώϊα φρίκη, ἔχρησόν.

Ex sudore horror, non bonum.

*Cellus l. 2. c. 4. p. 51. mali morbi signum dicit, post sudorem inhorrescere.*

Horror motus est naturæ conantis expellere quod molestat, per excitatos spasmos cum sensu frigoris. Vid. not. ad 5 aph. 17. Si ergo sudorem exceperit horror, signum est, quod non levaverit morbum, partibus humorum tenuioribus, sudore mediante, excretis, crassioribus relictis, quæ morbum saltem diuturnum faciunt; unde hoc respiciens Hippocrates dixit *non bonum*, quia salvo homine diuturnum fieri morbum, nec bonum simpliciter, nec malum dici potest. *Martian. p. 473.* Si omnis materia morbi non sit eliminata, subsequente sudore eliminari potest; ergo non valde magnum malum. Sed si ex colliquatione sudor fiat, horror subsequens absolute malus esset dicendus.

*Gorter.* *APHOR.*

## APHOR. 5.

**Ε**πὶ μανίῃ δυσεντερία, ἢ ὕδρωψ, ἢ ἔκσπαισις,  
ἀγαθόν.

**E**x furore intestinorum difficultas, aut  
hydrops, aut vehemens mentis emo-  
tio, bonum.

**U**t Melancholiæ sæpe curationem attulit su-  
pervenienti atræ bilis per inferiora reje-  
ctio, juxta Boerb. *aph.* 1110; ita Maniæ, quæ  
Melancholiæ est proles, frustra tentatæ per  
omnia remedia, salutaria fuerunt dysenteria,  
hydrops; *ibid.* 1124. Dysenteria quidem si ab  
atra bile inceperit, letalis est, secundum 4 *aph.*  
24. quia symptomatica est, non decretoria;  
sed ad finem & jam concocto morbo superve-  
niens salutaris sæpe est, quia educitur materia  
peccans, atra bilis: imo etiamsi per dysente-  
riam non evacuetur atra bilis, utilis tamen erit  
facta humorum, & vaporum revulsione, quæ  
morbum mitiorem saltem facere solent, &  
ideo Hippocrates, ut universaliorem faceret  
sententiam, non dixit, *dysenteria ex atra bile  
solvit morbum*, sed: dixit, *dysenteria simpliciter,  
bonum*, ut comprehenderet tam eam, quæ mor-  
bum solvit, quam, quæ illum mitiorem reddit.  
Nam *alvus ducta sæpe superiores partes resolvit.*  
Cels. l. 4. c. 3. p. 195. Hydrops pariter huic  
morbo superveniens bonus dicitur, quia hume-  
tato per hydropem corpore humor atrabila-  
rius mitescit, indeque furoris solutio, aut re-  
missio

missio saltem subsequitur. Ecstasis tandem superveniens furori est utilis, quia in ecstasi motus, & agitatio vehemens spirituum naturalium compescitur, in quo furoris essentia consistere videtur. Per ecstasin enim delirii genus quoddam intelligimus, in quo ægrotantes mentem adeo alienatam habent, ut si vocentur, oculos ad vocantem aliquando convertant quidem, verum nihil respondent, si pungantur, sentiunt, & membrum punctum retrahunt, non tamen conqueruntur, nihilque agunt, aut dicunt, quod rationis speciem habeat: perpetuoque intra se loquentes, delirare diligenter attendenti fit manifestum. Provenit autem hujusmodi delirium, quotiescunque species sensibiles operationibus interioribus animæ non communicantur, idque duplici modo evenit, vicio scilicet imaginationis, vel sensus communis. Primo modo fit ecstasis in iis, qui ob vehementem imaginationem mentem alienant ab omnibus aliis objectis. Nam spiritus speciebus sensibilibus imbuti in locum sensus communis ferri a præsentia fortis imaginationis prohibentur: eo quod species, quibus infixæ imaginatio est, id vetant, ea ratione propter quam (ut dicunt) intus existens prohibet extraneum. Hujus naturæ est ea ecstasis, quam frequenter incurrunt viri sancti, dum intente contemplationibus se tradunt, & aliquando amantes, & quicumque aliquod intensius imaginantur. Vicio autem in sensu communi existente fit ecstasis, quando animales spiritus, interioribus operationibus inservientes, adeo vitiantur, ut analogiam nullam habeant cum exterioribus, cujus defectu non possunt species a sensibus exterioribus perceptæ interioribus communicari, unde actio interioris

Vol. II. Y sensus



sensus cessat, qui sensus communis dicitur. Hanc vero labem contrahunt spiritus ab intemperie æquali, & (ut dicunt) in habitu ipsius cerebri: propter quam spiritus illi actioni inservientes a naturali dispositione penitus diversi producuntur; ita ut a naturali actione cerebri cessante fiat mentis alienatio. Esto autem ecstasis sine febre, non in vel cum phrenitide, qualis ab Hippocrate in *Coac. sect. 1. n. 96.* ut signum inflammationis (quæ phrenitidem facit) in sphacelum tendentis mala pronuntiatur, dum inquit: *In febribus vehementes mentis emotiones cum taciturnitate* (ἐκστάσεις σιγῶσαι), *in eo qui voce defectus non est, perniciem minantur.* Hujusmodi vero affectionis principium nullo alio signo melius distinguitur, quam silentio, unde phrenitici si post verborum garrulitatem in silentium incidunt, tunc phrenitidem in ecstasin transmutari indicium erit; in qua quoniam inflammationis fervor remissus jam est, & humor quodam modo (ut ita dicam) in cineres redactus, ideo ecstatici non cum furore, & garrulitate delirant, sed tacite, ut dubitari possit, an delirent, nec ne. Quotiescunque igitur ægri in silentium incidunt, vel id erit ex aphonia, vel a delirio ecstático, & quamvis vocis privatio in febribus maximum metum communiter incutiat, aliquando tamen non est letalis; cum sæpe in gravissimis morbis abscessus fiant ad eas partes, ex quarum affectione vox interceptitur, a quibus tamen ægri sublevantur, & denique judicantur perfecte. At ecstasis semper letalis est, eo quod affectionem dictam cerebri consequitur, quæ raro ad naturalem dispositionem reducit. Merito igitur Hippocrates inquit ecstasin, quam eo devenient, ut silentium inducat, neque id proveniat ex aphonia,

nia, perniciosam esse. Et quia eam febris perpetuo comitatur, etiamsi lenta admodum, hinc addidit, *in febribus*, ut eam ecstasin excluderet, quæ superveniens furori utilis censetur in aphorismo nostro. At neque hæc semper halcyonia tempora ægrum in tuto collocant. Nam, ut docet Hippocrates *Coac sect. 1. n. 138. si vehementer mente emotis febris acuta superveniat* (οἱ ἐκείναις, ὁξύς ἐπιπυρέξαι), *phrenitici evadunt*: h. e. si atra bilis alio humore accedente rursus putrescat, & denuo inflammationem in cerebro excitet, phrenitis denuo insurgit; nam pro taciturnitate, garrulitas, pro immobilitate, jactatio, & pro mansuetudine furor accedit, aliaque omnia symptomata, quæ ad veram phrenitidem concurrunt. Hanc vero novam putredinem humores contraxisse indicat febris superveniens acuta, quæ ante mitis erat, nam putredine, & inflammatione in cerebro consistente, non potest non excitari febris acuta, & hoc est, quod ait Hippocrates in hac Coaca, ecstasi correptos, acute insuper febrientes, phreniticos fieri. Sed ecce alium ecstasios funestum exitum. *Vehementes mentis emotiones silentes* (σιγᾶσαι ἐκείναις), absque quiete, oculis quoquoque intuentes, spiritum efflantes, perniciem minantur. diurnas autem faciunt partium resolutiones (παραπληκτικά). Quin etiam vehementer insaniunt hoc modo affecti. Quibus autem cum ventris perturbatione hujusmodi affectus ingravescent, iis nigra per alvum circa judicationem prodeunt. Quæ verba intelligenda sunt de ægrotantibus, qui etiamsi taciturni sint, huc, & illuc tamen moveantur, oculis fixis circumspicientes, respiratioque his potius magna est, & rara, qualis delirantibus esse solet; a præsentia  
Y 2 nimirum

nimirum humoris nigri, qui a cerebro ad nervos metastasin facit, unde pars aliqua corporis, & motu, & sensu privatur. Aliquando etiam evenit materiam præfatam in cerebro agitari, quæ inde vehementius incalescens ægrotantem in furorem adducit: in qua quidem agitatione, si alvus turbetur, eo quod pars ejusdem humoris tenuioris, aut materia pituitosa a capite inferius descendat, diarrhœa excitatur, quæ morituris in nigrorum excretionem transmutatur: quo tempore natura morbo succumbens materiam morbificam destituit, quæ propria gravitate deorsum ruens per eandem viam prorumpit ad alvum, hoc est enim, quod ait Hippocrates *iis circa judicationem nigra prodeunt*. Locus illustris ad confirmandam Hippocraticam denominationem hujus vocis *judicari* aliquando ad intentum usurpari. Cum non sit rationabile, morbum adeo letalem ad salutem terminari per excretionem nigrorum; quam diarrhœa præcellerit. Vid. *Martian.* p. 473. 527. 533. 588.

## APHOR. 6.

Εἰς πῖ νύσση πολυχρονίῃ ἀποσιτή, καὶ ἄκρητοι  
ὑποχωρήσεις, κακόν.

In morbo diuturno ciborum fastidium, & sinceræ dejectiones, malum.

A pud Celsum l. 2. c. 4. p. 51: *Post cupiditatem cibi, postve longas febres hunc fastidire, mali morbi signum est; & ibid. p. 53. malum est*  
(alvi

(alvi excrementum), quod post febres longas sincerum est.

In morbis longis seu chronicis (qui nempe spatium 40 dierum transiliunt & ulterius progrediuntur) humores sunt crassi, lenti. Si jam accedat ciborum fastidium, notatur tonus primarum viarum dejectus, unde metus est, ne natura ex prostratis viribus succumbat. Supervenientes *dejectiones* meracæ seu *sincerae*, quæ uniformes sunt & impermixtæ, seu flavæ, seu virides, seu pallidæ, malæ esse æstimantur, quia nihil cum illis evacuatur eorum, quæ morbi sunt causa. Cujuscunque fuerint coloris aut consistentiæ, malas pronunciat Hippocrates in morbis dejectiones sincere. Vid. *Coac. sect. 6. n. 11. 44. 46.*

*Fastidium ciborum* ἀναστροφή, ut signum & causa malum portendit, denotat enim corruptos esse humores in corpore, qui in ventriculum confluentes appetitum naturalem extinguunt, & inde, licet ingerantur alimenta, ea corruptis mista non commutantur in bonum chylum: & quia debita quantitas alimentorum requiritur, ut sustententur vires in longo morbo, illa quantitas suppeditari nequit, propter inappetentiam vel fastidium; aut si ægri ingerant, ingesta non convertuntur in bonum succum. Itaque in convalescentibus & morbis chronicis tuti non sumus, quamdiu appetitus naturalis non redeat, quia est cacochyliæ signum (4 aph. 17.) Duo hæc symptomata, fastidium ciborum & dejectiones meracæ, & separatim & conjunctim præsagiunt malum: sed ex generali regula majus malum est, si duo mala signa jungantur, quam si unicum habeatur. Hippocrates passim inculcat, meracas dejectiones malas esse, sive sint pituitosæ, biliosæ,

melancholicæ, vel sanguinæ, quia recrementa alimentorum sæcibus mista faciunt, ut nunquam meracæ conspiciantur nisi ex morbosa causa. Quod autem in chronicis cum fastidio conspiciantur meracæ dejectiones, illæ notant, tantam esse morbosorum humorum copiam in intestinis, ut ne quidem recrementa alimentorum conspici possint: vel quod ingesta alimenta, ante quam deponunt sua recrementa, ita fuere corrupta, ut exhibeant massam pultaceam corruptam ubique sibi similem. Ergo malum est signum, siue respiciamus ad multitudinem materiæ morbosæ, siue ad corruptelam indutam. *Garter.*

## APHOR. 7.

Ἐκ πολυποσίης ῥίγῃ, καὶ παραφροσύνη, κακόν.

Ex multo potu rigor, & delirium, malum.

**R**igor & delirium ab ebrietate singularia fuerunt vinorum Græcorum symptomata, quæ nervos feriebant acriter, nisi coctione, conditura, aut vetustate cicurarentur. Metus est, si ebrui rigore corripiantur, ne non resipiscant, sed moriantur convulsi, ex cerebro nempe nervisque oppressis, vini fortis crudique multitudine intra venas recepti. *Hecquet. Lister. Valles. Conf. 5 aph. 5. & 4 aph. 29.*

APHOR.

## APHOR. 8.

Ἐπὶ φύματι εἶσω ῥήξεως ἐκλυσσις, ἐμστὴ καὶ λεπτοψυχὴ γίγνεται.

**E**x rupto intro tuberculo exsolutio, vomitio, & animi defectio contingit.

**E**narrata hic sunt signa rupti intus abscessus, effusique puris, maxime ad ventriculum, & pulmones. *Ex tumoribus* (tam circa ventrem, quam in præcordiis) *mortem magis adferunt, quicunque intro rumpuntur.* Hippocr. Coac sect. 2. n. 236. Sæpissime mors in cachecticis, tabidis & diuturna lenta ac hæctica febre detentis, ex ingenti abscessu interno rupto natales trahit. Effusum enim foetidissimum pus, non modo viscus cui insidet penitus consumit, sed & vicinas quas tangit partes labe inficit atque corrumpit, simul quoque foetore suo tenuissimum illud fluidum, quod fibris vim motricem confert, admixtione sua contaminat. *Hoffm. Med. rat. T. 3. p. 372.* Unde exsolutio virium, quia destituitur corpus blandis, rescipientibus, humoribus; sed & vomitio a materia acri, fibras ventriculi, intestinorum, œsophagi & diaphragmatis irritante, convellente. *Λεπτοψυχὴ* hinc intelligitur, ut quæ significat defectionem virium eousque incrementem, ut & naturalis calor multum labefactari incipiat. *Boerb. J. M. §. 829.*

*Vomit* interdum provenit ex rupto abscessu ad interiora: sed hoc signum inconstans est,

Y 4

sæpe

sæpe enim observatur ruptio interna sine vomitu superveniente: nam qui in empyema incidunt ex rupta vomica pulmonis vel pleuræ, raro a vomitu vexantur: quare, si accedat, significare potest, tumorem fuisse ruptum circa vel in ventriculo. *Λειποψυχία* ex intus rupto tumore fit, a nimia facta evacuatione, qua cingentia tumorem sustentaculo orbata tantam in se recipiunt sanguinis copiam, ut in reliquo corpore non remaneat sufficiens ad circulationem continuandam. Raro autem istud fit a rupto interno abscessu purulento; sed, si intus fuerit varix, aut aneurysma, horum ruptione, quia ita effunditur sanguinis ingens copia, facile fieri potest lipothymia & etiam syncope. *Gorter.*

### APHOR. 9.

Εἰς αἵματι ῥύσει παραφροσύνη, ἢ καὶ σπασμὸς, κακόν.

Ex sanguinis profluvio deliratio, aut etiam convulsio, malum.

Apud Celsum l. 2. c. 8. p. 76. hic aphorismus ita legitur: *Si sanguis profluxit, deinde secuta est dementia cum distensione nervorum, periculum mortis est.*

Mala sunt ab inanitione. De convulsione dictum 5 aph. 3. Nunc additur desipientia quæ sensuum hebetudinem significat, ob ingentem virium jacturam. *Tozzi.*

APHOR.

## APHOR. IO.

Ε'πὶ ἐλεῶ ἑμῶ, ἢ λὺγξ, ἢ σπασμὸς, ἢ  
 παραφροσύνη, κακόν.

Ex ileo vomitio, aut singultus, aut  
 convulsio, aut delirium, malum.

Celsus l. 2. c. 8. p. 74. ita habet: Si in tenuiore intestino morbus est, vomitus, singultus, nervorum distentio, delirium, mala sunt; & l. 4. c. 13. p. 221. stercus per os redditur. Adjicitur periculo, si vomitus biliosus, mali odoris, aut varius, aut niger est.

Ileus vocatur rejectio violenta per os eorum quæ cibi, potus, medicamenti titulo assumta; aut chyli, bilis, feri stomachici, pancreatici, intestinalis; bilis atræ, muci, puris, ichoris; fæcum intestinalium; clysmatum ipsorum. Boerb. J. M. §. 816. Ubi acutissimi instant dolores, cum contumaci alvi constipatione & vomitu assiduo etiam male olente, accedente singultu, delirio, gelido sudore, extremorum frigore, nervorumque distensione, certos adesse mortis prodromos censendum. Hoffm. Med. rat. T. 3. p. 349. Significatur inflammatio intestinorum, communicata cum ventriculo, & demum etiam cum cerebro.

In ileo seu volvulo non necesse esse, ut contenta rejiciantur, ex aphorismo hoc constare potest; nam dicit Auctor, si volvulo vomitus superveniat, malum. Si vomitus perpetuo adesset, non esset signum malum, neque su-



pervenire posset. Nunc autem vomitus superveniens propterea malum signum præbet, quia indicat, non solum intestina in motum inversum cieri, sed & ipsum etiam ventriculum, quare ab ano ad œsophagum motus peristalticus habetur inversus cum dirissimis doloribus, quod pejus est, quam si sola intestina fuissent affecta: atque vomitus ille intercipit applicationem omnium medicamentorum, quæ ad volvulum curandum ore dantur, nam statim ac ingesta fuere, vomitu tunc rejiciuntur. Inde Vomitus est malus & ut signum, & quia intercipit curationem necessariam. Si motus inversus intestinorum non solum propagetur ad ventriculum, sed etiam ad œsophagum, signum adhuc est pejus, quam si solus vomitus adesset, quia latius dispersus est morbus, plures partes in consensum trahit, & inducere incipit singultum, qui species convulsioni est, sed qui a leviori causa generatur, quam convulsio totius corporis, & qui ex affectis tenuibus intestinis facilius per consensum potest generari, propter continuitatem membranarum, quam convulsio totius corporis: propterea si superveniat convulsio, majus significatur malum, quam prædici potest ex superveniente singultu. *Garter.*



**APHOR.**

## APHOR. II.

Ἐπὶ πλευρίπδι περιπνευμονίῃ, κακόν.

Ex morbo laterali pulmonis inflammationo, malum.

## APHOR. 12.

Ἐπὶ περιπνευμονίῃ φρενίτις, κακόν.

Ex pulmonis inflammatione phrenitis, malum.

Cohærent hi duo aphorismi, & posterior prioris est continuatio. Hippocrates quoque hic memoratas metastases conjungit in *lib. de affection. n. 9.* quando scribit, interdum ex morbo laterali in pulmonis inflammationem & febrem ardentem transitum fieri. Et Celsus *l. 2. c. 7. p. 64.* *Post lateris*, inquit, *dolorem, vitia pulmonum: post hæc, insania.*

*Pleuritis* vera seu exquisita & legitima dicta, de qua hic agitur, vocatur dolor pungens acerrimus, cum febre acuta, & pulsu duro, in inspiratione valide aucto. Nomen habet a *πλευρά* vel *πλευρᾷ*, quibus vocibus significatur & costa, & latus generatim, & membrana costas succingens. Poneit inflammatorium quid adesse vel in musculis intercostalibus internis, vel

vel in modo dicta membrana. Ob vicinitatem frequenter accidit, ut superveniat pleuritidi pulmonum inflammatio seu peripneumonia, quam alii accuratius appellari censent pleuripneumoniam, peripleumoniam, vel & peripneumopleuritidem, ut distinguatur a peripneumonia quæ orta est a solis pulmonibus inflammatis, salva pleura aut costas cingente membrana. Cur malum dicitur, orta ex pleuritide peripneumonia? Quia notatur magnitudo causæ inflammatoriæ, propagatæ ex locis intercostalibus vel pleura membrana ad ipsos pulmones. Hinc omni sæviori pleuritidi peripneumoniam superaccidere, annotat *Boerhaave aph. 906.* postquam in *aph. 905.* observasset, quod in mortem exeat pleuritis tunc, quando tam vehementes causæ ejus, ut dolor productus omnem motum supprimens brevi creet, impedito sanguinis trajectu, peripneumoniam letalem quam brevissime. Apud Hippocratem *Coac. sect. 3. n. 172.* ex communi interpretatione legitur, *peripneumonias ex pleuritide transmutatas, securiores esse his quæ ab initio fiunt.* Nonne hæc manifeste contraria est assertio modo enarratæ? Tollitur contradictio, vocem illam ἀσφαλέστεραι, quam vertunt *securiores*, exponendo per *stabiliiores, & firmiores*; sicuti enim σφαλερός *fallacem, instabilem, & inconstantem* significat, ita ejus contrarium ἀσφαλὲς *stabilem, constantemque* significabit; unde ἀσφαλέστεραι hic erunt peripneumoniæ, quæ exitum firmiorem, & stabiliorem habent, ad differentiam earum, de quibus in præcedentibus Coacis tractatum est, quæ quoniam frequenter transmutantur, modo in abscessus superiores, modo in inferiores, modo in suppurationem, aliosque exitus habent

bent incertos, & varios, merito instabiles & inconstantes dici possunt. Inquit igitur Hippocrates peripneumonias pleuritidis succedaneas firmiores esse iis, quæ a principio invadunt, & ratio est, quia hæ nullam earum transmutationum subire possunt, quas primogeniæ subeunt, idque ob virium robur, quod in illis transmutationibus requiritur, quod in his adesse non potest. Nam ut dicitur Hippocrates *lib. de affection. n. 23.* quando alter morbus alteri succedit, æger a priori morbo adeo debilitatur, ut subsequenti vix resistere queat, & ideo illum tam diu ferre non potest, quousque abscessum faciat, aut ad suppurationem deveniat, hæc enim non nisi temporis longitudine evenire non solet. Recte igitur dictum est peripneumonias ex pleuritide transmutatas stabilioris esse judicii, quam eas, quæ a principio fiunt, quia aut cum bonis, & salutaribus signis ad salutem terminantur, aut sine his ad interitum. *Martian. p. 577.*

Cur *phrenitis ex peripneumonia*, malum? Ferrox & perpetuum delirium, a cerebro primario affecto, cum febre acuta continua, vocatur phrenitis vera. *Boerb. aph. 771.* Cerebro inflammato phrenitidem excitari certum est, & ab omnibus receptum, cerebri nomine comprehendentibus totum viscus, quatenus medullari substantia constat, venis, & arteriis per ipsum disseminatis, membranisque ipsum cerebrum continentibus. Verum hic morbus aliquando aliunde in cerebrum defertur. *oriuntur*, ait Hippocrates *l. 3. de morb. n. 9. phrenitides etiam ex aliis morbis.* Sunt itaque plures phrenitidis differentię pro diversitate, & varietate partium, ex quarum inflammatione phrenitis excitatur:

gra-

gravissima autem omnium ea est, quæ ex septo inflammato ortum ducit. Talem vero esse eam, quæ peripneumoniz succedit, est rationabile, inflammatione ipsa a pulmonibus ad septum transversum se extendente; & apud Hippocratem doctrina, quod ex septo transverso inflammato phrenitis excitetur, adeo frequens est, ut hanc solum phrenitidis causam cognovisse visus sit, ut vel ultimo allegatus locus id palam facit, ubi etiamsi a pluribus aliis causis eam excitari fateatur, hujus tamen speciei tantummodo curationem descripsit; imo, quia hæc frequentius evenire observata est, ideo septum illud tanquam sapientiæ primarium instrumentum phrenes, hoc est mentis nomen apud Græcos sibi vindicavit, indeque ipsius phrenitidis nomen deductum est. Morbum autem letalem esse ibidem scribit, cum tertio die, aut quinto, aut septimo moriantur. Interim tamen non inficiandum est, quod etiam pulmone solo vehementer inflammato phrenitis excitari possit, quæ ratione magnitudinis casum letalem facit; sicque superveniens phrenitis signum erit, inflammationem ad summum gradum magnitudinis pervenisse. Vid. *Martian. p. 473. 577. 190. & Ettm. Oper. T. 3. p. 54.* Phrenitis a peripneumonia letalis. *Boerb. aph. 774.*



APHOR.

## APHOR. 13.

Επὶ καύμασιν ἰσχυραῖσι σπασμοὶ, ἢ τῆτανος, κακόν.

Ex vehementibus ardoribus convulsio, aut nervorum distentio, malum.

Celsus l. 2. c. 7. p. 64. post magnos furores corporis, nervorum rigorem, aut distentionem oriri scribit.

Convulsio seu spasmus, aut etiam tetanus, febrili superveniens fervori, malum portendit, quia notatur sanguinem impetu pulsum esse in arteriarum ultimos fines, qui in nervorum desinunt fibrillas, ut ita ad nervos pertingat phlegmone, quæ creet spasmos, tetanos. Conf. notata ad 2 aph. 26. Imo, qui a tetano corripiuntur, intra quatuor dies pereunt, &c. juxta 5 aph. 6. De natura spasmī, & tetani, dictum est ad 5 aph. 17.

## APHOR. 14.

Επὶ πληγῇ εἰς τὴν κεφαλὴν ἐκπληξίς, ἢ πνευραφροσύνη, κακόν.

Ex ictu in capite accepto stupor, aut desipientia, malum.

A pud Celsum l. 2. c. 7. p. 64. ita legimus: Ubi caput vulneratum est, delirium erit.

Notatur cerebri substantia comprimendo læsa:

sa: unde non modo apoplexia, sed & perquam facile, in primis in plethorico-cacochymicis subjectis, phrenetica affectio inducitur. *Hoffm. Med. rat. T. 4. P. 1. p. 410.* "Εκκλιξις idem significat quod apoplexia. vid. 2 *aph.* 42. Παπαφροσύνη hic generatim designare videtur desipientiam. Conf. 2 *aph.* 2. Quæ caput quodammodo concutiunt, cum intensa oculorum rubedine, ac manifesto delirio, perniciem denunciant. *Hippocr. Coac. sect. 2. n. 8.* Protinus requirendum est, inquit Celsus *l. 8. c. 4.* num bilem is homo vomuerit, num oculi illius obcæcati sint, num obmutuerit, num per nares auresve sanguis ei effluxerit, num conciderit, num sine sensu quasi dormiens jacuerit. Hæc enim nonnisi osse fracto eveniunt. Atque ubi conciderunt, scire licet, necessariam, sed difficilem curationem esse. Si vero etiam torpor accessit, si mens non constat, si nervorum vel resolutio vel distentio secuta est, verisimile est, etiam cerebri membranam esse violatam; eoque in angusto magis spes est. At, si nihil horum secutum est, etiam potest dubitari, an os fractum sit.



APHOR.

APHOR. 15.

Ἐπὶ αἵματι πύσει πύσις, κακόν.

Ex sanguinis sputo puris sputum,  
malum.

APHOR. 16.

Ἐπὶ πύσιν πύσεις φθίσις, καὶ ῥύσις· ἐπὶ δὲ  
τῷ πύελον ἴσχηται, ἀποθνήσκει.

Ex puris sputo tabes, & fluxus: ubi  
vero sputum sistitur, moriuntur.

Conjungendæ sunt hæ sententiæ, nam prioris consecutarium est posterior. *Celsus* l. 4. c. 4. p. 203. *Sæpe, inquit, evenit, uti sanguinem pus sequatur.*

Puris sputum sanguinis sputo superveniens notat natum in pulmonibus ulcus; hinc vero provenit *phthisis*, si nempe repurgatio legitimo tempore non facta fuerit, a pure retento; vide 5 aph. 15; & *fluxus* sive diarrhœa. Non autem semper phthificos diarrhœa superveniens e medio tollit, sed tunc demum, cum iisdem jam consumptis supervenit; de qua re legantur dicta ad 5 aph. 14. *Moriuntur autem ubi sputum sistitur*; quam diu enim phthifici notabile quid exspuunt, tam diu cum diarrhœa vivere observantur: adeo ut aphorismus modum mor-

Vol. II. Z tis



tis ostendat illorum, qui ex phthisi moriuntur; eousque enim extenuati vivunt, donec per ea quæ exspuunt, possunt pulmonem expurgare; cum vero intus manent, obserantur quidem viæ spiritus, patientes vero strangulantur. *Forrest. Obs. Med. l. 4. obs. 4. schol. p. 213. Vid. Hippocr. l. 1. de morb. n. 10. & 19. Pus expuisse in tabe, deinde ex toto spueri desisse, mortiferum est. Cels. l. 2. c. 8. p. 72. Neque tamen omnibus phthisicis, cum morituri sunt, sputum supprimitur, ita ut a sputo in pulmonibus retento suffocentur, sed iis tantummodo, quos diarrhœa superveniens e medio tollit. Martian. p. 473.*

Sanguis effluens & stagnans extra vasa in pus convertitur, unde puris sputum; quod pus sensim pulmonem corrumpens prohibet, ne sanguis elaboretur, vel cum sanguine miscetur, eumque corrumpit, vel totum corrumpit corpus, per quod fluit, unde tabes & concidentibus, summeque laxatis per corruptionem partibus fluxus. Quod si supprimatur sputum, totum pus intra pulmonem detinebitur, ex quo fiet ejusdem visceris brevi corruptio, unde mors, quæ etiam ex eo citius corripit, quod pus collectum intra pulmonem infarciat, & comprimendo occludet vasa sanguinis, adeoque sanguinem sistet. *Bellin. de urin. &c. p. 673.*



APHOR.

APHOR. 17.

Εἰς φλεγμονὴ τῆ ἥπατος λυγρὸν κακόν.

Ex jecoris inflammatione singultus, malo est.

Expositus habetur hic aphorismus supra 5 aph. 58.

APHOR. 18.

Εἰς ἀγρυπνίᾳ σπασμὸς, ἢ παραφρεσύνη, κακόν.

Ex vigilia convulsio, vel delirium, malum.

Secundum Cels. l. 2. c. 7. p. 64. ubi vigilia torfit, nervorum distentio.

Mala in aphorismo memorata ab inanitione: unde humoribus nascitur acrimonia, a qua fibrillæ cerebri atque nervi afficiuntur. Diuturnas vigiliæ sequitur plerumque maxima partium internarum debilitas, unde stagnationes humorum in capite, periculi plenæ inflammationes ac deliria oriuntur. Hoffm. Med. rat. T. 1. p. 613. Hinc apud Celsum l. 2. c. 7. p. 58. „ Si „ in continua puero venter nihil reddit, mu- „ taturque ei color, nec somnus accedit, plorat-  
Z 2 „ que

que is assidue, metuenda *nervorum distentio* est". Delirium sane ponit semper cerebri medulloſi affectionem morboſam, &c. *Boerb. aph.* 701. Convulſio itidem ſemper a vitio cerebri, quod oriri poteſt ex omni illa cauſa, quæ deliria, pervigilia, creare poteſt. *ibid.* 710. Quin ipſa nimia vigilia pro cauſa habet plerumque leviffimæ inflammationis cerebri prima initia. *ib.* 708. Quare vigiliis urgentibus confert uſus demulcentium, temperantium, humectantium internus & externus. *Wedel.*

## APHOR. 19.

Εἰς ὅςτις ψιλώσει ἐρυσιπέλας, (κακόν.)

Ex offis nudatione eryſipelas, (malum).

## APHOR. 20.

Εἰς ἐρυσιπέλας σηπεδών, ἢ ἐκπύησις, (κακόν.)

Ex eryſipelate putredo, aut ſuppurationio, (malum.)

Cum in nullo Græco exemplari legatur hæc vox κακόν *malum*, temerarium eſt illam addendo a communi lectione recedere, & eo minus id fieri licet, quando hæc ſenſum idoneum admittit. Nam offe denudato plerumque eryſipelas ſupervenire, ut prior ſententia dicit, mihi

mihi admodum rationabile videtur. Quia si magna vulnera labiorum, vulnerum tumor consequitur, quia absque magnitudine vulneris, os denudari nequit, sequitur ossis denudationem subsequi inflammationem, quod erysipelas appellat, quia humoris tenuioris adest prædominium. Inducto autem in ulcere erysipelate, necesse est, aut calore naturali vincente suppurationem fieri optimo, & laudabili pure, aut eodem succumbente, putredinem excitari, quod postremum sicuti malum est, ita ulcus suppurare bono pure, optimum erit, ideo de ambabus sententiis malum dici non potest. Quare horum duorum aphorismorum sensus erit. Ab ossis denudatione erysipelas plerumque consequitur, & ab erysipelate putredo, aut suppuratio. *Martian. p. 473 sq.* Explicationi huic favet textus in lib. de cap. vuln. n. 27. *At ubi in capitis vulnere, sive serra fuerit adhibita, sive non, nudato tamen osse, tumor rubicundus ad erysipelatis naturam accedens, in facie & oculis utrisque, vel altero subortus fuerit, quique ad contactum doleat, ac febris & rigor corripiat, ulcus vero ipsum, quod ad carnem osque attinet, ad adspectum recte habeat, quæque ulcus ambiunt bene habeant, excepto faciei tumore, eique nullum aliud peccatum in reliqua victus ratione accefferit, medicamento quod bilem moveat homini alvus purganda est. Quo sic purgato, tum tumor subsidit, sanusque evadit. Medicamentum autem exhibendum pro hominis robore, virium illius habita ratione.* Hisce addi potest ex Celso l. 5. c. 26. n. 33: *At, si nigrities est, quæ nequedum serpit, imponenda sunt, quæ partem lenius exedunt; repurgatumque ulcus sic, ut cætera, nutriendum est. Si magis putre est, jamque procedit ac serpit,*

opus est vehementius erodentibus. Si ne hæc quidem evincunt, aduri locus debet, donec nullus ex eo humor feratur. nam quod sanum est, siccum est, cum aduritur. Post unctionem putris ulceris, superponenda sunt, quæ crustas a vivo resolvant; ἀπερχωτικά Græci nominant. Ubi exciderunt, purgandum ulcus, maxime melle & resina est. Sed iis quoque purgari potest, quibus purulenta curantur, eodemque modo ad sanitatem perducendum est. H. J. Sed tamen ignorari non debet, quod, quum erysipelatis causa tenuis sit humor, qui resolutione vel diaphoresi sanari amat, juxta dicta ad 5 *aph.* 23. quod, inquam, eo intuitu, suppuratio ex erysipelate malum dici queat: suppuratio quippe ejus non proprium; nam quia sedem suam habet in sola cute, ubi suppurat, necesse est, ut profundius, in carnes, penetret. *Cardan. p. 768 sq.* Sine dubio autem ullo corruptio seu putredo hic contingens est malum, quia via est ad gangrænam. *Valles.* Conferantur quæ de natura humoris erysipelacei caustica notata sunt ad 6 *aph.* 25.

Non semper ossi denudato supervenire erysipelas, quotidie experimur; si autem superveniat, malum erit signum, tam quoad causam, quam effectum. Tunc enim præprimis accedit erysipelas, si humor ichorosus ex osse nudo effluens ad partes molliores applicatus, istas irritat, tumere & rubere facit, qualis rubedo ab imperitis pro inflammatione accipitur. Sed quoniam talis tumor ruber magis est pruriens, & non convertitur in pus sed in ichorem, atque exigit medicamenta quæ erysipelati adhiberi solent, ac respuit lactantia & humida, quæ egregie opitulantur inflammatis,  
neceſſe

neceſſe erit, ut hanc rubedinem ſupervenientem vocemus eryſipelas. Hoc autem generatur, ſi medulla oſſis corrumpi incipit: ergo ſignum eſt malum, quum ſit corruptionis indicium. Et mala quoque eſt cauſa; nam ſi putreſcat medulla, os nudatum non ſolum in loco denudato peribit, ſed etiam pars reliqua a medulla corrupta inficietur: atque medulla corrupta intercipient omnem conſolidationem, quia materiem purulentam, quæ alias conſolidationem promovet, commutabit in ichorem rodentem, ſolventem omnes affluentes humores in putrilaginem. Optimum eſt, ſi materia eryſipelatis tenuis, acris, & calefaciens per inſenſibilem perſpirationem exeat, relinquens partem prius obſeſſam ſanam; iſtius enim detegitur naturæ, ut nunquam ſanis aſſimilari poſſit, vel in pus commutari, ſed retenta ſenſim reddatur acrior: propterea tanto cum ſucceſſu adhibent Chirurghi ſicca & ſiccantia atque abſorbentia ad eryſipelatis curationem, quibus id tenue auferunt. Si vero illa materia relinquatur in loco calido, & humiditate diluta, prompta eſt ejus mutatio in putrilaginem, qua non ſolum boni affluentes humores liqueſcunt, verum ipſæ etiam partes firmæ, & præcipue pinguedo: tunc non amplius ſufficit inſenſibilis exhalatio, verum, quod ita per putredinem fuit mutatum, ſimul debet auferri. Quare morbi ſtatus pejor eſt poſt conceptam illam putredinem, quum declarat cauſæ augmentum & promittat difficiliorem & tardioſiorem curationem. Igitur cavendum eſt, ne pars eryſipelate affecta diſponatur ad putredinem. Atque malum eſt, ſi eryſipelas abeat in ſuppuracionem. Dum enim acris materia eryſipelatoſa

irritat partes adjacentes, in his generat localem inflammationem, quæ pus producit, adeo ut in eo loco habeatur materia erysipelatoſa irritans, & materia purulenta, qualis morbus a Veteribus dicebatur eryſipelas phlegmonodes. Si pura ſimplex adſuit inflammatio, quæ commutatur in ſuppurationem, pus confeſtum erit blandum & conſolidans: ſed ſi ex eryſipelate adjuncta materia illa bilioſa acris admisceatur puri, iſtud tunc pus non manet blandum & conſolidans, atque hoc inchoſum eryſipelatoſum non deſinet irritare, novamque inflammationem in ambitu concitare; ideoque malum eſt, & ſemper evitandum a Chirurgis, ne eryſipelas maturantibus convertant in purulentiam. *Gorter.*

APHOR. 21.

Εἰς ἰσχυρὰ σφυγμῶ ἐν πῖσιν ἔλκεσιν αἱμορραγίη, κακόν.

Ex forti in ulceribus pulſu, ſanguinis eruptio, malum..

Clarius reddidit Celfus l. 2. c. 7. p. 64: *Ubi vehementer venæ ſupra ulcera moventur, ſanguinis profluviū erit.*

Pulſus fortis in ulceribus, copiam ſanguinis ad ulcus confluere indicat, quatenus caro, & venæ eo repletæ, motum arteriarum ægrotanti ſenſibilem faciunt, qua ſtante, non eſt mirum, ſi inde fluxus ſanguinis ab ipſomet ulcere

ex-

expectari debeat, venulis in ulcus desinentibus viam ipsi præbentibus. *Martian. p. 374.* Ubi stasis sanguinis, a fasciis, ulcus, seu vulnus, intermedium, lachrymosum ac minime suppurans, pulsans ac febriens fieri, scriptum est ab Hippocrate *lib. de fract. n. 28.* *Malum* itaque dicitur, quia notatur sanguinis stasis in arteriis cum inflammatione. Nam ubi ulcus ambientes partes inflammatione vexantur, quam diu inflammatio perseverat, ulcera coire non solent. *de ulcer. n. 5.* Neque obstat hisce, quod Hippocrates *ibid. n. 3.* dicit, quod omni recens facto ulceri, præterquam si in ventre sit, ex eo ipso sanguinem statim plus minusve effluere expediat. nam notum est, quod sæpe paulo latius nomen ulceris ab Hippocrate usurpetur, pro omni continui solutione, pro vulnere in hoc textu; imo generalissime omnes morbi ulcera vocantur in *lib. de fract. n. 33.* Recentiores distinguunt vulnus ab ulcere, illud dicentes solutam cohæSIONem recentem, cruentam, partis mollis, a corpore duro acuto, moto, pressio, vel resistente; ulcus vero appellant solutam cohæSIONem partis mollis, non cruentam, sed ichorosam aut purulentam plerumque, a materia erodente: nec ulceris denominationem dant vulnere nisi antiquo & purulento.

Recte monet Auctor malum esse, si post fortem pulsum in ulceribus sanguis erumpat, quia non potuit semper compescere illam hæmorrhagiam, atque illa evacuatio sanguinis non conducebat consolidationi ulceris: antea enim potuit per balsamica applicata promovere ulceris consolidationem, & modice sustentare partem, nunc vero applicanda sunt styptica ad



compescendam hæmorrhagiam, & firmior adhibenda est ligatura, atque ita retardatur ulceris curatio, & relinquitur timor recrudescentiæ hæmorrhagiæ. *Gorter.*

APHOR. 22.

Ἐπὶ ἰδύνη πολυχρόνιῃ τῶν περὶ τῆς κοιλίας ἐκπύησις, κακὴν.

Ex diuturno partium, quæ ad ventrem attinent, dolore suppuratio, malum.

Videtur hæc sententia desumpta ex *lib. de humor. n. 3.* ubi hæc leguntur: *In vicinia dolorum cujusque abscessus contingunt, ad superiorem partem magis, & in totum. Si tardus fuerit morbus, & deorsum feratur, infra etiam abscessus contingunt.* Qui textus truncatus & turbatus est in præsentī aphorismo, in quo compilerator ejus indicare forte voluit, quod in longis morbis, seu lentis febribus abscessus oriri soleant in inferioribus partibus, *ad ventrem*, abscessuum autem futurorum signa esse dolores: vocula autem κακὴν in textum irreplisse aliunde videtur. Vis certum fientis abscessus signum? En: *Quibus sine febre aliqua parte dolor, aut prurigo, cum rubore & calore est, ibi aliquid suppurat.* Cels. 1. 2. c. 7. p. 62 sq. Conf. 4. aph. 31. 32. 33. & quæ ad eos notata sunt.

APHOR.

## APHOR. 23.

**E**πὶ ἀκρίτῳ ὑποχωρήσει δυσεντερία, κακόν.

**E**x sincera alvi egestionē intestinōrum difficultas, malū.

**H**anc sententiam Celsus l. 2. c. 7. p. 64. ita exprimit: *Post alvi longam resolutionem tormina oriuntur.*

A dejectione mere biliosa, acri, intestina exulcerantur; unde dysenteria. *Holler.* Intellege autem dejectionem, quæ diu perseverat, nec illam esse ab atra bile in principio morborum, aut in extenuatis, nam talis, seu subsequatur, seu non dysenteria, statim letalis est, ex 4 aph. 22. 23. 24. Quid alias per meracam seu sinceram dejectionem significari soleat, explicatum habetur ad 7 aph. 6.

## APHOR. 24.

**E**πὶ ὅττις διακοπῇ παραφροσύνη, ὡς κενεὸν λάβη.

**E**x osse perfecto delirium, si ad vacuum usque penetravit.

**I**ntellige sententiam de cranii alta fractura: & quod fragmentum cranii fracti in cavum cerebri ad meninges penetrans delirium creat, a  
facta

facta phlegmone in dura matre. *Hecquet. Conf. 7 aph. 14.* Verum tamen oportet ut læsio facta fuerit in membrana cerebrum involvente; nam ut adnotavit Hippocrates *lib. de capit. vuln. n. 24.* ossa, quæ a suo naturali statu recedunt & media desidunt, fracta aut late admodum præcisa, hæc minus habent periculi ubi membrana integra fuerit. Imo vero, etiam si ex ossis fractura non semper & necessario delirium supervenit, quia tamen frequenter id contingit, aphorismus hic nihilominus verus erit, quum Hippocrati mos sit referre mala malis supervenientia. Vid. *Martian. p. 474.*

APHOR. 25.

Εκ φαρμακοποιῆς σπασμὸς, θανατῶδες.

Ex medicamento purgantis potione convulsio, letale.

Quod particulatim de superna per helleborum purgatione prolatum est 5 aph. 1. nunc universaliter de omni purgatione repetitur. Advertendum est autem, gravius esse convulsionem a medicamento absque immodica evacuatione supervenire, quam ubi simul immodica evacuatio concurrit. *Martian. p. 474. Conf. 5 aph. 4. & 6 aph. 39.* Quicumque a veneno vel validissimo emetico aut purgante sumto moriuntur, hos identidem inflammatio spha-celosa, teste anatome practica, e medio tollit. Mortis autem præsagium ferunt ardores interni & summæ anxietates, pulsus valde parvus &

& inæqualis, vel plane deficiens, cum sudore frigido, delirio & convulsione. *Moffm. Med. vat. T. 3. p. 349.*

APHOR. 26.

Ἐπὶ ὀδύνη ἰσχυρῇ τῶν περὶ τὴν κοιλίαν ἀκρω-  
τηρίων ψύξις, κακόν.

Ex vehementi partium quæ ad ven-  
trem attinent dolore, extremorum  
refrigeratio, malum.

Exponi potest hæc sententia de dolore in  
præcordiis, maximeque scrobiculi cordis  
regione, qualis est in lipyria febre ad 4 *aph.* 48.  
enarrata. Conferri potest 7 *aph.* 1.

APHOR. 27.

Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχθρὴ πινεσμός ἐπιγεγόμενος,  
ἐκτρέψεται ποίει.

Mulieri utero gerenti tenesmus super-  
veniens, abortire facit.

Affiduus conatus ad dejiciendum, seu tene-  
smus, in consensum trahere potest ute-  
rum, ut excutiat foetum; nam necitur cum  
recto

recto intestino uteri cervix: maxime, si fuerit tenesmus vehemens, excitatus a dysenteria maligna, frequenti in Græcia malo. Præterea mulieres Græcæ admodum imbecilles & delicatæ fuerunt, ob summam abstinentiam a vino, victumque tenuiorem, & custodiam diligentiorrem. Ab hæmorrhoidibus internis hodie sæpe mulieres gravidæ tenesmo afficiuntur, neque tamen abortum faciunt. *Lister.*

Fœtus humanus raro ante septimum mensem ad eam perfectionem venit, ut possit alimentis ore sumtis proprium suum nutrimentum conficere, & in lucem prodiens respirare. Si ergo prius in lucem prodeat, quam ut illa organa habeat perfecta, sive fœtus ita prodiens sit vivens vel mortuus, illa exclusio vocatur *abortus*, qui est partus maturior quam quo potest vitalis manere infans. Si vero post istud tempus, usque ad legitimum partus tempus excludatur fœtus sive vivens sive mortuus, potius illa exclusio vocatur partus præmaturus, quo tempore exclusus fœtus omnia membra eousque habet perfecta, ut potuisset a matre separatus vivere. De tali ergo exclusione hoc loco agit auctor, quæ fit ante tempus, quo potuisset fœtus exclusus a matre separatus, manere vitalis. Ex causis abortum facientibus hic recensetur tenesmus. Si intestinum rectum a quavis causa irritatur, in ejus fibris muscularibus aliquis concitatur motus, qui contenta non solum hujus, sed etiam intestini coli determinat versus anum, & ita ejicit: & ut hæc ejectio validiore potentia peragatur, naturali lege muscoli abdominis in consensum trahuntur, qui non solum tunc quasi contra voluntatem nostram constringuntur, sed etiam faciunt motum determinantem deorsum:

sum: præterea cogimur facta summa inspiratione retinere animam, ut diaphragma magis complanatum possit recessum visceris sursum impedire, qua majore potentia urgentur contenta intestinorum versus anum, quando vocatur *alvi egestio*. Sed si in intestinis nullæ restent fæces, & hoc tamen intestinum ab aliqua causa irritatur, eadem sunt conamina sine dejectione fæcum, nisi quod violenta illa compressione extrudatur aliquid mucosi ex lacunis intestini reëti. Hic conatus sæpe rediens sine dejectione fæcum vocatur *tenesmus*, seu crebra cupiditas egerendi alvum. Intestinum rectum ad talem ejectionem instigatur vel a causa irritante ipsum intestinum, vel ita movetur per consensum, uti experimur in calculosis, si calculus hæreat ad urethræ orificium, & in stranguria virorum. In foeminis autem, quia uterus intestino recto adjacet, ab eo affecto etiam intestinum rectum consentire potest; quando tunc non amplius in recto intestino sunt fæces, illa foemina laborabit tenesmo. Igitur foemina gravida tenesmo laborat, ex causa irritante intestinum rectum, vel per consensum cum utero seu vagina. In utroque casu abortus instat, si fiat ante legitimum pariendi tempus. Si enim causa illa instigans in utero vel vagina hæreat, nemini mirum esse potest, quod tunc per validissimum conatum, uti in parturientibus, foetus immaturus excludatur. Si fiat autem per irritationem ipsius intestini, non solum conatus in tenesmo valide urget contenta uteri, ut ejus internum orificium aperiatur & ita excludantur; verum ipse uterus tandem etiam in consensum trahitur, ut se accingat quemadmodum in parturientibus profundere contentum immaturum foetum.

foetum. Ex his satis constat, quam cauti esse debeant Medici in propinandis purgantibus, in dandis suppositoriis vel glandibus, & injiciendis clysmatibus, foeminis gravidis; atque summa cura promte curare debent foeminis gravidis tenesmum & dysenteriam, ne subsequatur iterato conamine egerendi abortus. *Gortier.*

## APHOR. 28.

**Ο**, ἡ ἀν' ὀστέον, ἢ χόνδρον, ἢ νεῦρον ἀποκοπῇ ἐν τῷ σώματι, ἔπε αὖξεται, ἔπε ξυμφύεται.

**O**s quodcunque, vel cartilago, vel nervus in corpore præcisus fuerit, neque augetur, neque coalescit.

**H**ic aphorismns supra 6 aph. 19. continetur.

## APHOR. 29.

**Η**ν ὑπὸ λευκῆ φλέγματι ἐχομένα διάρρεια ἐπιγένηται ισχυρῇ, λύει τὴν νῆσιν.

**A**lba pituita vexato si vehemens alvi profluvium superveniat, morbum solvit.

**H**æc sententia iisdem verbis legitur in *lib. de Judicat. n. 11.* In *Coac. sect. 3. n. 326.* scripta est in h. m. *Pituita alba tumentes* (τῆς λευ-

λευκοφλεγμασίτης) alvi profluvium sedat. (exsolvit, liberat). Et in lib. 2. de morb. n. 69. dicitur, si venter per morbi initia sua sponte conturbatus fuerit, sanitati est proximus. quod etiam dictum extat lib. de intern. affect. n. 23. sed desunt hic verba illa per initia morbi. Rursus lib. 1. de morb. n. 6. hæc habentur: Subaqueoso & lienoso, albaque pituita detento, alvus vehementer perturbata, bono est. Apud Celsum l. 2. c. 8. p. 68. aqua inter cutem minime terribilis dicitur, si venter mollis; si per se excernit mollia & figurata.

Λευκὸν φλέγμα, pituita alba, communiter in scholis Medicorum una voce Leucophlegmatia dicitur; & Celsus l. 3. c. 21. p. 160. λευκοφλεγματίαν, vel ὑπὸ τὴν σάρκα, appellari scribit eam hydropis speciem, quando corpus inæquale est, tumoribus aliter aliterque per totum id orientibus. Hippocrates lib. 2. de morb. n. 69. pituitam albam ita describit: Totum corpus albo tumore intumescit, venter ad contactum crassus est, pedes, coxæ, tibiæ & scrotum intumescunt, respiratio coacervata est (impedita seu difficilis & anhelosa, vultus rubicundus, os aridum, & sitis detinet, cumque comedit, spiratio crebra incidit. Hic eodem die interdum melius, interdum vero pejus habet. Eadem pene verba leguntur in de intern. affect. n. 23. Ex doctrina Boerhaavii aph. 1225. hydrops λευκοφλεγματίαν, ἀνὰ σάρκα, ὑπὸ σάρκα, oritur, quoties in toto habitu pinguitudinis subcutaneæ (in membrana adiposa, reticulari & cellulosa dicta, quæ membranas corporis omnes & musculos interfacet) lymphæ stagnat, vel effunditur; qui & circum abdomen, & circa scrotum. Non hic, puto, morari nos debet animadversio Martiani p. 587. ubi leucophlegmatiam

Vol. II.                      A a                      inter



inter hydropis species non referendam esse arbitrat, eo quod Hippocrates eam hoc nomine non appellaverit. Enimvero cum communis omnium hydropis specierum sit nimia humoris abundantia, qui collectus tumorem facit, & in leucophlegmatia quidem per totum corpus, ut bene observat *Mead* in *Monit.* p. 123. nihil impedire video, cur receptam inter Medicos doctrinam deferamus. Nonne ipse Hippocrates *l. 2. de morb. n. 69.* præcipit, si non turbetur venter, ut exhibeatur medicamentum deorsum purgans, ex quo aqua purgetur? Egregius inprimis est textus, naturam & originem leucophlegmatiae declarans, apud Hippocratem, *lib. de affect. n. 20.* qui ita habet. *Cum pituita alba detinet, totum corpus tumore albo intumescit, eodemque die alia corporis parte melius, alia deterius habere videtur, tumorque aliàs alia corporis parte & major & minor est. Huic medicamenta deorsum purgantia exhibenda, quibus aqua aut pituita purgatur. — Morbus hic ex pituita oritur, cum quis ex diuturnis febribus pituita abundaverit, & minime purgatus fuerit, & in ejus carnes pituita vertitur. Quæ quanquam reliqua pituita nihilo sit albidior, cutis tamen color candidior apparet. Sanguis enim pituitæ copia aquosior redditur, neque æque in eo bonus color inest, proptereaque candidiores apparent, morbusque pituita alba vocatur. Si igitur per initia curatio adhibita fuerit, convalescit; sin minus, in aquam inter cutem (ἐν ὑδρωπῇ) morbus transiit, & hominem perimit. Ast notari meretur differentia, quam inter hydropem ἀνὰ σάραξ dictum & leucophlegmatiam constituit *Aretæus l. 2. de caus. diut. c. 1.* ubi vult, in leucophlegmatia quidem perinde ac in anasarca aquam copiosam inter cutem stagnare, sed in hoc sanguinem simul,*

quo

quo carnes nutriuntur, valde esse corruptum, adeoque vitium longe subesse gravius; quare etiam leucophlegmatia mitior hydropis species, curatuque facilius haberi debeat, quoniam variae ejus tollendae sint prosperae occasiones, ut sudoris, lotii excretionem, aut alvi nonnunquam copioso effluvio; quum contra in reliquis speciebus, praesertim si mixtae sint, Medicus totum hominem permutare debeat, si ipsas curare velit. Hac stante differentia, cum Hoffmanno *Med. rat. T. 4. P. 4. p. 423 sq.* dicenda erit leucophlegmatia in initio, anasarca vero seu hyposarca in augmento mali, cum jam, ob majorem sanguinis quam in ipsa leucophlegmatia corruptionem, color carnis & cutis magis depravatus & ex atro viridescens adparet, manifesto indicio, quae sanguificationi humorumque depravationi inserviunt viscera, ut sunt pulmones, hepar & renes, nimiae laxitatis vel infarctus vitio laborare, & ad functiones secundum naturam peragendas minus esse idoneas. Et haec distinctio in praxi medica usum habet, quando scire expedit, quo medicationis genere tractandus sit aeger, quod certe non idem semper profuturum existimari debet: id quod Hippocratem declarasse supra vidimus, videlicet per initia morbi. *Conf. 6 aph. 14.* Unde etiam limitationem accipit praesens aphorismus. Nam ubi diarrhoea ista aegro jam debili existente contingat, periculosa est. *River. p. 329.* Neque praebet constantem regulam, omnem hydropem vel leucophlegmatiam curandam esse purgantibus; variae enim sunt Hydropis causae, quarum quaedam respuunt purgantia; & quando in leucophlegmatia non prius solutus fuit humor per alvum educendus, per purgans elicietur

cietur humor bonus & fluxillis, relicto viscoso in tunica cellulosa & cute, qui ad intestina venire nequit. *Gorter.*

APHOR. 30.

Οἱ ὅσοι ζῖν ἀφρώδεα τὰ διαχωρήματα ἐν τῇ  
διάρροίᾳ, τέτοιον ἀπὸ τῆς κεφαλῆς  
παύει κατὰ ῥέει. (φλέγμα κατὰ ῥέει)

Quibus per alvi profluvia spumosa  
sunt alvi excrementa, iis ea ex  
capite defluunt. (de capite pituita  
defluit)

Sententia videtur intelligenda esse de diarrhoea pituitosa, eo quod materia ejus a capite provenire ab Hippocrate creditum sit, in capite vero cerebrum esse magnam glandulam, pituitæ, & consequenter catarrhorum, abinde in quasvis corporis partes depluentium fontem. *Fick.* Inde est, quod in *lib. de morb. sacr. n. 7.* legimus: *si pituita frigida, in cerebro collecta, ad ventrem feratur, alvi profluvia corripiunt.*

Constat experimentis, aërem in intestinis & ventriculo collectum motu vermiculari æquabili ita uniri humoribus, ut plane evanescere videatur; sed motu inordinato earum partium, etiamsi nihil aëris ingeratur, tantam aëris copiam generari, seu potius separari ab adhærentibus humoribus, ut non solum intestina & ventriculus turgeant, verum etiam totum abdomen

domen instar tympani tendatur; &, quamvis multi ructus & crepitus emittantur, venter tamen non subsideat, quasi generationis aëris nunquam esset finis. Generatur etiam in intestinis aër, uri extra corpus nostrum, ex fermentatione vel putrescentia contentorum, si ventriculi & intestinorum actio debilior non valeat spontaneam hanc mutationem arcere. Tali modo natus aër si viscosus, vel pinguibus humoribus misceatur, exhibet liquorem spumofum; sed aquosis meris mistus statim se extricans non producit spumantem liquorem. Ut igitur spumosæ egestionem fiant in alvi profluviis, requiritur præsentia humoris subpinguis, saponacei, vel glutinosi, qui aëris bullulas retinere potest, atque intestinorum motus inordinatus, qui aërem producit, & qui simul copiosorem dejectionem facit; nam in tali motu aucto concipi nequit fieri posse vel fermentationem, vel putredinem spontaneam ex deficiente motu intestinorum. Spumosæ ergo egestionem semper significant motum intestinorum perturbatum; sed prout color, odor, & consistentia variat, ita est humor morbosus diversus, qui ex aëre admisto spumantem egestionem præbet. Nunquam in praxi observare potui, spumofam egestionem dedisse bonum præsagium, quia semper indicat motum perturbatum, & corruptionem humorum. Quum auctor accuset pituitam, inde concludere possumus, eum hoc loco intelligere fæces albicantes, seu pallidas & spumosas, quas etiam sæpe observavimus emissas esse cum capitis dolore. Hoc etiam cum observaverit Hippocrates, existimavit eam pituitam spumofam, quam conspexit egestam per alvum, natam esse in capi-

te, & inde cum impetu delatam ad intestina, & inde ejectam. Nos aliquoties experti sumus, in capitis doloribus huiusmodi factas fuisse egestionem spumosas, quas puto provenire a succo nervoso acriori præprimis in encephalo nato, & capsulis nervorum, sensim secundum nervorum cursum ad intestina delato, ibi præbere humorem dictum pituitosum, qualis observatur in gravedine. Si hic humor in cavum intestinorum depositus fuerit, simulque intestina vellicat, motu tunc inordinato intestinorum, non solum generatur aër copiosior, verum etiam eodem motu ita miscetur huic pituitæ, ut præbeat recensitas alvi egestionem spumosas cum multis ventris torminibus. *Gorter.*

### APHOR. 31.

Οἱ κόσιξι περίσσειαν ἐν πῖλιν ἔχουσι κριμνώδεις αἱ ὑποστάσεις γίνονται, μακρὴν τὴν ἀρρώστιον σημαίνουσιν.

Quibus febricitantibus sedimenta in urinis sunt crassiori farinæ similia, longam ægritudinem significant.

Hic aphorismus reperitur in *Prognost. n. 11.* ita exaratus: *Sedimenta in urinis crassiores hordei tostii non exacte moliti partes referentia, prava sunt, hisque pejora laminis similia.*

In urinarum sedimento duo potissimum considerantur ab Hippocrate, color & substantiæ modus. De coloribus album statuit omnium optimum,

optimum, & post eum, subrubrum, cæteros autem colores non meminit tanquam malos; modum vero substantiæ in sedimento considerans, lævitatem probat. læve autem dicitur, quod sibi continuum est, & cohærens, æquabilemque habet superficiem, minime asperam, & nulla ex parte divulsam. hujus lævitatatis prisanam statuit *lib. de vict. acut. n. 5.* dum illius viscositatem lævem appellat. Huic contraria est asperitas, quæ substantiæ modum inæqualem, & minime cohærentem importat, hujusque inæqualitatis in sedimento quatuor enumerat differentias, pro ratione magnitudinis partium ipsiusmet sedimenti, in *Prognost. l. c.* Ita, si sedimentum ex partibus tenuissimis constat, tenuè dicitur; hujusque malitiam describens inquit: *alba & tenuia valde prava sunt.* Quod si partibus paulo crassioribus constat, sedimentum *κρινωδεις* dicitur, h. e. farinæ crassioris partes referens; & si adhuc crassiores fuerint ejus partes, & aliquantisper compressæ *πταλωδεις* appellatur, hoc est lamineum, hocque prædictis deterius facit; *πιτυρωδεις* tandem, id est fursuraceum dicitur sedimentum, quod partibus adhuc crassioribus constat, hocque omnium pessimum statuit. Quare juxta modum substantiæ duplex est sedimentum, alterum æquale secundum totam substantiam; & hocque bonum est, quia fit a calore succos exacte superante, quorum pars est ipsum sedimentum: alterum asperum, & inæquale, quod malum censetur: ita ut sicuti læve & æquale indicat calorem innatum humores ipsos superare, ita inæquale, & asperum indicabit humores peccantes a præternaturali calore exuri, aut magis, aut minus pro ratione inæqualitatis ipsius sedi-

A a 4

menti

menti eo ordine, quo explicatum est. Non enim consentaneum est rationi, prædicta sedimenta a substantia partium solidarum decedere, ut tota fere Medicorum schola tenet, quia neque per febres colliquativas, neque per hæticas, in quibus manifeste partes solidæ marcescunt, talia conspiciuntur sedimenta. Quare rationabilius est dicere, sicuti sedimentum laudabile est pars succi a natura devicti, ita & mala sedimenta esse portionem humoris a febrili calore exusti, ita ut, quo major viget exustio, partes in sedimento majores conspiciantur, quo vero minor, minores. Nam agente calore illo adurente in succos ipsos, eos primum assat, deinde exurit, & quo calor est vehementior, eo citius partes humorum tenuiores, & humidiores consumuntur, & sic partes exustæ majores permanent, unde non est mirum, si, quo partes in sedimento fuerint crassiores, eo pejus ipsum sedimentum reddunt. *Martian. p. 484.* Longum itaque morbum significant crassa illa urinæ sedimenta, quia declarant materiæ cruditatem ex vigore morbi, præsentemque magno æstu. *In acutis morbis periculum ænunciat urina biliosa, neque aliquantulum rubra, & quæ hordei non exacte moliti crassioribus frustulis similia habet sedimenta alba. Hippocr. Coac. sect. 5. n. 11. 12. In pleuriticis urina alba diluta, hordei tostii non exacte moliti crassioribus frustulis simile habens sedimentum fulvum, dolorem & periculum denunciat. At quæ pallida fulvum habet sedimentum, hordei tostii non exacte moliti crassioribus frustulis simile, diuturnitatem ac periculum indicat. ibid. n. 64. 65. Cervicis ac dorsi perfrictiones, quæ etiam totum corpus pervadere videntur, convulsiones denunciant, in quibus urinæ hordei*

*herdei tosti non exacte moliti crassioribus frustulis similia continent.* ib. sect. 3. n. 198. 199.

Si in fundo uroscopii, quod continet urinam in quiete refrigeratam, detegitur materia albicans instar farinæ non exacte molitæ, tale subsideris vocatur *sedimentum farinosum*, quod non multum distat a sedimento albo & bono in febribus, quoad externum conspectum, nisi quod illæ partes sint majores, minusque æqualiter distributæ, quam in sedimento albo. Quoniam hæ partes farinosæ non apparent in calente urina, neque tam magnæ ire possunt per tubulos renales, certe constat, istas formari in refrigerata urina. Illa ergo materia hoc sedimentum formans possidet majorem concrescendi potentiam, quam quæ observatur in sedimento albo æquali, qua concrescit in grumulos. Quum vero omnis materia sedimentum formans sit materia morbi, quia illa in sanorum urina non apparet, concludere possumus, tali in febre morbi materiem in corpore adhuc oberrantem pronam esse ad concretionem, & inde viribus vitæ non facile separari posse. Materia febris continuæ salubriter evacuari solet sub forma sedimenti albi & æqualis, quod sedimentum tantum valet in febribus, ut dicatur criticum. Si vero referat farinam crassiorem in febribus significat, materiem phlogisticam, ex majori motu febrili natam, non abiisse in materiem subpurulentam albam & æqualem, quæ a natura facile eliminatur, sed in materiem talem tenaciorem, quæ non facile operum a tota massa segregari potest; & inde in corpore manens morbum protrahit: aut si postea deficientibus viribus per spontaneam supervenientem corruptelam immutetur, frequen-



quentissime novum morbum chronicum producit. *Gorter.*

*APHOR. 32.*

Ο'κόσιζι δὲ χολίδεες αἱ ὑποστάσιες, ἄνωθεν  
δὲ λεπταί, ὀξείῳ ἀρρώστῳ σημαίνει.

**A**t quibus biliosa sedimenta, supra vero tenuia fuerint, acutum morbum significat.

**G**alenus, quem cæteri expositores secuti sunt, adverbium illud ἄνωθεν, cum antiquis quibusdam interpretibus, ad tempus, non ad locum referens exponit. *Quibus biliosæ sunt subsidentiae a principio tenues*, &c. Verum non mihi adeo monstruosum videtur, urinæ sedimentum matulæ fundum attingens, & aliquantisper elevatum, partem habere superiorem tenuem, inferiorem vero crassiorem, ut sententiæ per se claræ alienos sensus cum verborum improprietate mendicare cogamur, quia, etiam si de urina loquentes aquosam tenuem dicimus, non tamen id de sedimento asserere licet, sed illud tenue appellatur, quod contraponitur crasso. Quare aphorismi sensus est: Quibus biliosæ sunt subsidentiae, colore scilicet chloro, aut flavo infectæ, quæ in parte superiori tenues sunt, acutum morbum significant; indicant enim bilem peccare, quæ nondum

dum a natura sit deviata, nam eo casu subfidentia esset æqualis, non tenuis in superiori parte, quæ humoris concitati est signum, ut non immerito morbus acutus indicetur. *Martian. p. 474.* Quibus ad vesicam bilis aliquid confluit, iis urina crassa, idque a pituita, redditur, biliosum vero deorsum secedit, eo quod exusta sunt quæ in ventre insunt. *Hippocr. l. i. de morb. n. 27.* Tenuis autem & biliosa urina, & ægre lentum habens sedimentum, & quæ in melius ac deterius commutatur, temporis diuturnitatem postulat. *Coac. sect. 5. n. 6.*

Liquor colorem flavum exhibens, *biliosus* vocatur Veteribus, etiamsi non sit vera bilis, & omnia excrementa ac humores morbofi flavescences dicuntur biliosi. Itaque si id, quod ad fundum uroscopii in urina refrigerata fertur, habet colorem flavum, hoc loco hypostasis biliosa vocatur. Materia est biliosa, id est materia ichorosa flavescens, nata ex materia purulenta vel inflammatoria corrupta, est enim gravior reliquâ urinæ massâ, quia fundum petit, qualis major specifica gravitas non invenitur in bile, quæ supernataret. Ergo signum est in febribus materiem febrilem non mutatam esse in materiem albicantem criticam, sed in ichorosam, acrem & stimulantem humorem, qui in corpore remanens (nam omnis non ita per urinam emittitur) stimulo suo febre intendet. Quia vero separatur a reliqua massa urinæ, signum est, hanc materiem biliosam non ita miscibilem esse communi vehiculo humorum aquoso, unde difficilius eliminari in posterum poterit. Urinæ superne tenues non significant urinam aquosam, sed pellucidam & etiam coloratam, nam æque inveniuntur urinæ tenues coloratæ quam decolores. *Gorter.*

APHOR.

## APHOR. 33.

Οἰκόντι δὲ διετηκότα τὰ ἔρα γίνεται, τα-  
πείσι παραχῇ ἰσχυρὴ ἐν τῷ σώματι ἐστίν.

Quibus autem disparatæ fiunt urinæ,  
iis vehemens est in corpore tur-  
batio.

Urinæ *disparatæ* seu variæ dicuntur, quæ mo-  
do coctionis notas, modo cruditatem præ-  
se ferunt: ergo argumenta monstrant naturæ  
modo dejectæ aut titubantis, modo vincentis,  
h. e. magnæurbationis in corpore. *Hecquet.*

Urina, quæ frequenter in melius, & dete-  
rius mutatur mala est, quia morbi inconstan-  
tiam, naturæque instabilitatem significat, qui-  
bus invicem dimicantibus, modoque hoc, mo-  
do illo prævalentibus urinarum frequens muta-  
tio fit, modo ad pejus, modo ad melius, quam  
quidem urinarum permutationem describens  
Hippocrates in *lib. de vict. acut. n. 46.* hæc ha-  
bet: *Ex urinis vero quid futurum sit conjiciendum.*  
*Crassiores namque & pallidiores, meliores; tenuiores,*  
*& nigriores, deteriores. Quod si mutationem ha-*  
*beant, temporis longinquitatem indicant, morbusque*  
*neccessario tum ad pejus, tum ad melius inæqualitatem*  
*permutat.* Hac igitur ratione urinæ hujusmodi  
permutationem habentes morbi longitudinem  
significant. *Martian. p. 605.* In febre variarum  
interdum urinarum mictiones, morbum pro-  
ducunt. *Hippocr. Coac. sect. 5. n. 78.* In febribus

bus si urina mutationes habeat, temporis longitudinem indicat, ægrumque tum ad deteriora, tum in alteram partem necessario commutari. *lib. de Judic. n. 7.* Longum fore morbum colligere possumus, si urina modo liquida & pura est, modo habet quædam subsidientia. *Cels. l. 2. c. 5.*

A P H O R. 34.

Οὐκ ὀπίσθιν ἐν πύλιν ἔρριζιν ἐφίστανται πομφόλυγες, νεφρίτικά σημαίνουσι, καὶ μακροῦ χρόνου ἀρρώστιας ἔσονται.

Quibus in urinarum summo bullæ consistunt, renum affectiones significant, atque longam fore invale-  
tudinem.

A pud Celsum *l. 2. c. 5.* inter signa longæ valetudinis ponitur urina, quæ *bullas excitat*; & *c. 7. p. 60.* dicitur in renibus vitium esse, *si urina bullat.*

An bullæ illæ significant impeditam Urinæ in renibus secretionem? Bullatæ seu spumantes urinæ producuntur ex crassiore humore, quem agitavit spiritus flatulentus, unde origo spumæ, quæ non vanescit facile. Sunt tales Urinæ recidivis crebræ, ab inchoata crisi, cujus perfectio sperari nequit cum tali urina. *Duret. in Coac. p. 520.* Spuma est aggregatum plurimarum bullarum minutarum, sive sphæricularum, quia interclusus aër æquo nisu pellit undique

undique membranulas, quibus intercipitur. *Boyle de Color. p. 109. Hamel. Oper. T. I. p. 36.* Bulla dicitur rotundum in humore corpus, quod cito fit ut plurimum, & cito solvitur. Ad ejus generationem duo potissimum concurrunt, flatus contentus, & humidum corpus continens. *Mercurial.* Urina, quæ conquassata spumam diu retinet, notat olea & sales in lixivium saponaceum mista, atque soluta, adeoque 1. tenacitatem miscelæ arctæ, 2. coctionem difficilem & crisin, 3. morbos fere pulmonicos, aut catarrhosos in capite. *Boerb. J. M. J. 1012.* Nunquam vidi me fefellisse præsagium. Quando prius urina spumam retinet, uti aqua in qua sapo dissolutus est, tunc tenaciter adhuc olea & salia sibi adhærent. Quando vero die septimo, urina concussa, bulla inde orta mox sponte diffilit, certum est, ægrum in vado esse. *Idem Præl. in J. M. J. cit.* In peripneumonia suppurationem factam declarat urina spumosa. *Idem aph. 835.* Si quidem spuma diu manet, necesse est flatum gigni, & ex lenta crassaque materia: quod vero crassum est & lentum, frigidum est necessario, idemque morbos longos necessario etiam procreat. Palam est igitur, bullas diu in urinæ superficie manentes, longum morbum declarare: & quanto bullæ majores fuerint, atque diutius manserint, eo longiorem morbum significare. Nam pueri solent lixivio admiscere saponem, ut palea efficiant ampullas. quod enim lentum est, multum extendi potest, & in magnum spatium: oleum autem, quod saponi immistum est, absorta jam tenuiore parte, maxime cohæret. Regula etiam est dialectica: Quodcunque tale est, maxime si tale sit,

fit, effectum eo majorem producit. ut, si frigidum & lentum morbos longos efficit, quod frigidum est maxime, aut lentum, longissimos efficiet morbos. Nihil autem prohibere videtur, quin materia illa, ex qua fiunt bullæ, non ex capite aut pulmonibus, aut ventriculo veniat, neque enim bullæ illæ, quod arbitratur Galenus, in renibus ex spiritu generantur, quandoquidem videamus ipsis oculis urinam absque spuma prorsus exire, nec ex spiritu flatuoso, ut ille credit: sed dum mejitur, gignitur. Fit ergo spuma ipsa, dum urina exit: indicioque est, quod quanto majore impetu ejicitur, eo fit major: semper autem fit, sed ex viscida materia manet: e tenui & minime viscida, statim dissolvitur. Quod si quis caput virgæ urinæ immerferit, ac primum faciat ut matulæ imum contingat, sinatque sensim urinam effluere, nulla prorsus fiet spuma, etiamsi morbus renalis sævissimus infestet. Dicendum videtur, tametsi materia illa cruda longius veniat quam a renibus, aut omnino necesse esse ut generetur morbus in renibus ex tam viscida materia: aut non posse esse viscidam materiam, nisi in renibus consistat, & morbum generet. Videtur sane, quod bullæ, quæ diu insident & magnæ sunt, ex materia viscida in renibus necessario fiant, aliter attenuatæ jam essent transitu longo per venas. *Cardan. p. 787.* Quædam bullæ apparent in superficie, quædam in medio urinæ, vel utrobique. Bullæ aliæ sunt simplices, aliæ multæ connexæ in latitudine, scilicet medium versus: aliæ non connexæ, tametsi multæ sint. & hoc eadem ratione de bullis juxta altitudinem intelligi debet. Semper autem quæ sublimes sunt, & quasi aliis inequitant, aut ad medium

dium extenduntur, his a quibus oriuntur, sunt minores. Bullæ denique aliæ sunt parvæ, aliæ magnæ. Bullæ fiunt ob extraneum spiritum, spirituum autem non semper eadem est quantitas, nec qualitas eadem. Spiritus crassiores potius in bullis apparent inclusi, tenuiores vero magis dispersis contentis congruunt. quemadmodum eorum quantitates quadrant magis cum quantitate bullarum, atque cum recessu; quæ faciunt contenta recedendo a fundo: atque etiam cum ipsorum contentorum dissipationibus, cum magis disperguntur. Bullæ significant dolores capitis, aut renum, & præterea defluxum in pulmonem. Bullæ, quæ in superficie urinæ generantur, demonstrant spiritus in corpore ascendisse usque ad caput. Cum vero jam concocta fuerit materia, quæ spiritus excitavit, resolutio spiritui, ad pulmonis loca descendens convoluta cum spiritu qui in pulmone est, magis etiam inflatur. & hoc demonstratur a bullis, quæ circa medium innatant. Cum autem materia multum agitur circa renes, vesicam & vasa seminaria, ob locorum angustiam, tunc bullæ excitantur densissimæ; & interdum apparent veluti capilli, aut veluti feminis ipsius splendidiores, aut veluti renum calefactorum colliquamina. *Actuar. de urin. p. 152 sq. 287. 290 sq. Conf. Fernel. Medic. p. 420. 327.*

Urina spumosa evacuatur, si in itinere corrumpatur, si ei admisceatur viscosum, aut si proveniat ex putrefactis nostri corporis humoribus: inde tam frequens in febribus colliquativis, putridis, hecticis, phthisi, & omni nimia emaciatione corporis, calculosis, omnibusque morbis, qui faciunt exire liquefactam pinguedinem

dinem e corpore nostro. Adeoque multo plures sunt morbi, in quibus invenitur urina spumosa, quam qui ab auctore citantur. Talis igitur urina viscosa, saponacea, vel pinguedine imprægnata, permittit quidem bullulas aëris urinâ leviores adscendere, sed hæ si ad superficiem venerint, totam non relinquunt massam, verum obteguntur tenui expansa pellicula ex tali urina facta, quæ semper indicat aliquam in urina esse tenacitatem: atque quo spuma est copiosior, diutiusque persistens, eo majorem tenacitatem in urina arguit. Quare non solum ex urina spumante præcedentia cognoscere possumus, verum etiam magnitudinem & parvitatem mali. Talis urina cum & sine febre evacuari potest: sed quoniam observavit Auctor sæpe reddi in affectis renibus, inde ex conspecta tali urina quoque intulit, significari renum affectiones. Si enim aliquis renum calculo laborat, duplici ex causa urinam spumantem reddit. Calculus enim semper affluente urina perfusus speciem corruptionis inducit, quare calculosi etiam reddunt urinam foetentem: atque hoc putrefactum urinam spumosam facit, uti patet ex urina sana dein putrefactâ. Calculus etiam continuo terendo abradit naturalem viarum mucilaginem, quæ urinæ mista & simul exiens, urinam magis glutinosam facit & inde magis spumantem: inde etiam calculosi reddere solent urinam crassiorem & contentis saturam. Si vero pinguedo in corpore liquefacta & acrior reddita per urinæ vias emittitur, in suo transitu quoque dolorem renibus inferre potest, omnibusque viis urinæ, quibus abradit seu abstergit mucilaginem has vias naturaliter tegentem: ita illa urina ex sua natura acrior, nudas

Vol. II.

B b

tan-



tangens partes , dolores nephriticos infert, quod sæpe in febribus putridis observatur. Si quis febre laborans reddere incipit urinam spumofam , semper ego quoque in praxi observavi , istos ægros tarde recuperasse pristinam sanitatem: quod etiam rationibus est conveniens, nam omnis febris commutatio in putredinem morbum prolongat , quum vis vitæ nesciat putrefactum emendare , & careamus organo putrefactum separante a bono; hinc diu durat, priusquam omne putrefactum fuit evacuatum: quod alio modo fit in materia purulenta & critica, quam natura novit eliminare. Hinc per nullum emunctorium invenimus humorem corruptum evacuatum fuisse criticum: imo ulcera, quam diu putrefacta emittunt, non consolidantur. Quia vero urina spumosa significat mutationem materiæ febrilis in putrilaginem, ex generali lege putrefacti longa est expectanda invaletudo. *Gorter.*

APHOR. 35.

Ὅ κρόσις δὲ λιπωρὴ ἢ ἐπίσπικις καὶ ἀθρόη, τέπεισι νεφρικὰ, καὶ ὀξέα σημαίνει.

**A**t quibus quod supernatat , pingue est & confertum , iis affectiones renum, & acutas significat.

**N**on hic intelligitur ea pinguedo , quæ vere pinguedo est, & in guttas dispersa per urinæ superficiem conspicitur , malignæque colli-

colliquationis signum existit; de qua Hippocrates *Prognost. n. 12. Pinguedinis*, ait, *supra innatantes araneorum telas referentes, damnare oportet, colliquationem namque significant.* Ad quæ Fernelius *Medic. p. 320. addit: nisi enim renum colliquatio & fusio quædam in causa sit, corpus univ ersum vel febre ardente, vel phthisi, vel hectica febre liquefcit. Divulsa quasi olei puncta innatantia alterutrum similiter, sed inefficacius denunciant. Nænnunquam tamen animadverti ex epoto oleo hæc cum urina fluxisse. Quo autem facilius illa dissipantur, eo morbum levio rem, contumacior em vero quo diutius persistunt. Urina autem vere pinguis & oleosa, rarior certe, si observaretur unquam, notaret 1. vasa attrita per majorem motum, hinc soluta, cruori mista, & cum urina excreta pinguis; 2. humores acres. Et ideo minabitur phthisin, & atrophiam. Boerb. *J. M. §. 1011.* Experimentum Ruyschius solus habet & ante eum veterinarii, qui dicere solent, quoties equum obesum a subito & valli diori motu extinctum vident, *belg. de reusel is gesmolten in 't ligbaam*, verissima phrasi usi. Nam Ruyschius vidit omnino effusam ad aliquot libras in cavitatem abdominis solutamque pinguedinem. Simile quid vidi post oleosum cly sma diutius retentum. Talis pinguedo omnino reforberi potest in venas, & per arterias cum urina expelli. Ipse ego urinam vidi, quæ strigmenta oleosa in urinali traxit, qualia in aqua nascuntur, prius quam adfusum alcohol probe cum ea mistum fuerit. Dedi bibendum hominibus oleum, non ideo per renes cum urina quidquam transivit: si transiret, etiam chylum cum urina effluere necesse esset, qui oleo meabilior est. *Ejusd. Præl. in J. M. §. cit.**

Estne fabula urina vere pinguis & oleosa,  
 an existit vere? „ De oleaginosa urina nihil  
 „ est magis apud Medicos decantatum, & mi-  
 „ rum, quantum clament, dum alii negant,  
 „ ajunt alii, urinas dari posse, quæ oleo sint  
 „ omnino similes, non in difficultate fluxus  
 „ solum, sed in colore, sapore, unctuositate, ac  
 „ uno verbo, sint fere oleum, vel quid pingue  
 „ fluens: affirmantibus aliis, oleaginosas uri-  
 „ nas illas esse solum, quarum superficiebus  
 „ innatant quasi guttæ olei, non vero oleum  
 „ esse urinam universam, imo nec esse posse,  
 „ eo quod fieri non possit, ut aqua cum oleo  
 „ ita misceatur, ut unum compositum consti-  
 „ tuat; urinæ autem pars minima aqua est; ad  
 „ hoc igitur, ut produceretur urina oleaginosa,  
 „ oporteret conjungi aquam cum oleo, quod  
 „ plane repugnat. Qua super re asserimus,  
 „ quod nemini dubium, urinas, quarum su-  
 „ perficiebus innatet quid oleosum, sæpe da-  
 „ ri, & nos hujus naturæ excernebamus, cum  
 „ vertigine laborabamus; quod facile, ac ne-  
 „ cessario continget, quoties pingue aliquid  
 „ in corpore solvitur. Finge igitur jam non  
 „ pingue aliquid, sed plurimum oleosi e cor-  
 „ pore solvi, & aquam vel inhærere parti-  
 „ bus, vel in pingue quid permutari; an non  
 „ universa urina purum putum oleum videbi-  
 „ tur ipsi in affectionibus omnibus respondens?  
 „ Postremo, verum quidem est, aquam, &  
 „ oleum conjungi non posse ex se solis, sed  
 „ si adjiciantur sales & præcipue acriores, tria  
 „ illa in unicum corpus coalescent maxime  
 „ oleosum”. *Bellin. de urin. &c. p. 18sq. Conf.*  
*Etim. Oper. T. 3. p. 131.* Observamus mani-  
 festam sæpius pinguedinem, urinæ febricitan-  
 tium

tium & hecticorum supernatantem, & lateribus vitri se adponentem. Oleaginosæ urinæ sine strepitu, ut oleum solet, minguntur & effunduntur. *Hoffm. Med. rat. T. 1. p. 214.* Vide etiam *Eph. N. C. D. 2. a. 2. o. 123 & 124.* De ægroto, qui febre acuta laborabat & delirabat, legimus quod minxerit læve oleosum multum, in *lib. 1. Epidem. sect. 3. agr. 12.* Liquefactionis signum præbet urina oleosa, quæ redditur ante rigorem, videlicet sudorificum, & mala dicitur in *Coac. sect. 5. n. 29.* quoniam a tali rigore nihil sperari, nec expectari potest præter incommoda corporis inflammati, vel exsoluti, est enim rigoris sudorifici critici fere prænuncia urinæ suppressio, cum incidit ἐκ τῶν χρεσῶν. *Durst. in Coac. p. 503.* Enimvero vel rigor supervenit liquefactionis ratione, & tunc urina illa præcedens pessimam esse liquefactionis solutionem indicabit, quæ vel calorem absumat, vel particulas irritantes, vel simul utrumque producat, ex quo rigor superveniens liquefactionem promovebit; vel rigor supervenit aliunde, puta ex gratia, quia laborat ille febre aliqua intermittente, ac tunc similiter cum oleosa liquefactionem indicat vi rigoris, tum ratione materiæ irritantis, a qua rigor producitur, tum ratione concussionis, qua rigemus, promovebitur liquefactio. *Bellin. l. c. p. 41.* Ne hic memorem, quod urina nonnunquam a plebejis omnino lactea, supernatante pinguedine, judicanda Medicis offeratur in vitris, in quibus olivum ante servatum fuit; de quo in *Eph. N. C. D. 3. a. 3. app. p. 85.* Id certe notari apprime meretur, quod sæpius in ægrotantium urinis observetur crassitudo quædam in summitate, qualis apparet in urinis, quæ diutius as-

servatæ sunt ; & hanc appellavit *pinguedinem* quandam Hippocrates in *Coac. sect. 5. n. 2.* ubi in febre a tali apparente pinguedine celerem dicit notari liberationem. Pinguedo enim urinis superflans magnum interius incendium vigere significat , a quo morbi vehementia, & acuties dependet ; quia vero confusa existens *exaquescit*, ut habet textus, h. e. clarescit, signum est, naturam morbificæ materiæ dominari. *Martian. p. 603.* Vid. etiam *Bellin. l. c. p. 35.* Ad hujus normam textus intelligendus est etiam locus, qui in *Coac. ibid. n. 43.* communiter ita legitur : *Quæ emititur urina in qua quod subsidet pinguedinem habet , febrem significat :* sed inchoata est tantum græca lectio, cum ait, *πυρετόν σημαίνει* i. e. *febrem denunciat* ; non enim hoc spectat ipsa prognosis, ut tantum nos doceat febrem denunciari ab urina descripta. nec vero id novum est, nec etiā febrī tantum denunciandæ appositum: sed ejus qui ægrotat periculo aut securitati. Quare ita rescribendum, *ταχέϊαν δὲ καὶ λύσιν σημαίνει*, i. e. *ac citam quoque dimissionem febris ostendit* ; signo nempe & causa discessionis. signo quidem mitificati humoris morbifici, liberorumque meatuum. Causa autem, de copia vacuati humoris, quæ cernitur in liberali urina, quæ fuerat antè paucā: tum in copiosa hypostasi quæ pinguis apparet similitudine; non reapse: cujusmodi est γράϋς pinguium jussulorum. *Duret. in Coac. p. 508.* Referri huc quoque potest urina pinguis quæ prodit in febribus intermittentibus, finito paroxysmo, cujus mentio habetur in *Boerb. aph. 753.* Magnitudinem ardoris febrilis, magnum humorum attritum, simulque acrimoniam, per hujus generis urinas denotari, indubium.

dubium esse puto. Notabilis est textus *lib. 4. Epidem. n. 6.* in quo narratur de Nicostrati uxore, quod, delirans & convulsa, urinam emisit, cui interdum *velut adiposum quiddam*, αἷματι μολῶδες, superstabat. Sed quam proxime ad præsentis aphorismi nostri explicationem accedunt hæc: Pinguis apparens urina plerumque gerit arenulas minimas viscido quodam nexas, & sic effingentes speciem membranulæ oleosæ; tum notat abundantiam terræ, & salis hebetioris in sanguine; prælagit hinc scorbutum, calculos, & similia. *Boerb. J. M. §. 1010. Conf. Ettm. Oper. T. 2. p. 593.*

Pingue in urinis, si corpus interea integrum se tuetur, plethorici habitus, indeque redundantis nutritii succi, utut cocti laudabiliter, signum est: si vero emacrescat corpus, colliquationis fit indicium. In renum autem affectibus pinguis facta urina, gravem illorum & acutam arguit ægrotationem, phlegmonem nempe, qua eliquatur illorum pingue & cum urina excernitur. *Hecquet.* Non semel vidi (verba sunt Halleri) innatantes in urina guttulas fluidi adipis, etiam in non male valentibus, quod vidit etiam Sanctorius. Verum eam pinguitudinem mallet ex sanguine ipso repetere, unde deduci potest in vascula urinæ, quoties ea justo laxiora sunt. Neque enim lacunulæ ureteris sufficere videntur, aut respondere observationis. vid. *Boerb. Præl. in J. M. T. 3. p. 231. Sanctorius (Stat. Med. sect. 1. aph. 108.) Crassissimi*, inquit, *humores in robustis per angustissimas vias tranant, ut patet de pinguedine per urinam.* Urinæ pingues & oleaginosæ, quibus febris hectica, partes colliquans, vulgo indicatur, ex sanguine oleoso & sulphureo, aut

renum pinguedine ex supino in dorsum decubitu incalescente, oriri potuerunt: unde in corporibus florentibus, & optime constitutis istiusmodi urinæ haud raro animadvertuntur. Signum etiam hoc hypochondriacis magis proprium & familiare esse quam tabidis testatur Willisius, & quam plurimos sine hoc intabescere mori. *Guidot. in Proleg. ad Theoph. de urin.* Præterea, pinguedo vel oleosum urinæ supernatans non raro assumtis pinguioribus, & oleosis cibis, nulli autem calori consumenti & tabifico, originem debet. *Eph. N. C. D. 3. a. 4. p. 34.* Urina vere oleaginosa, pinguedinem corporis liquefactam sibi supernatantem monstrans, non confundenda est cum urina oleaginosa apparenter tali, qualis in hypochondriacis & scorbuticis confirmatis subinde apparere solet, seu crusta salina. Illa (vera pinguedo) semper est uniformis, & ad latus aspecta nullum colorem, nullum splendorem, &c. acquirit. Altera vero (crusta ex salibus concreta) ad latus matulæ aspecta varios repræsentat colores instar iridis aut caudæ pavonis. *Ettm. Oper. l. c. & T. I. p. 232.*

Pinguedinem corporis in tunica cellulosa collectam, a vehementi calore liquatam, & circulatione aucta propulsam, sanguini primo venoso mistam, & ita ad cor delatam, non solum in subito superveniente febre acuta ardente, verum etiam in motu musculari validiore, præprimis in obesitas, observarunt multi Medici. Sed ex aucta illa circulatione sequitur, pinguedinem receptam evacuari cum urina: nisi enim motus particularis renum major simul accedat, recepta pinguedo in sanguine cum urina evacuari nequit, ut sæpe observamus

mus in Ardentibus. Ut illa ergo pinguedo exeat, neque sola circulatio major cum ardore sufficit, quia his non generatur pinguedinis transitus per renes; neque sola actio renum valet talem producere urinam, quia, si cum sanguine arterioso copia pinguedinis non adferatur, renes eam excernere nequeunt. Recte igitur observavit Auctor has duas conjunctas affectiones, nempe nephriticas & acutas. Quod opponunt in marasmo & phthisi, non est aliquis momenti; quia hi non reddunt talem urinam, etiamsi pinguedo totius corporis consumatur: his enim pinguedo non consumitur forma pinguedinis, sed quando pinguedo in his corrupta fuit & degenerata evacuatur. Quamobrem his frequentior est urina spumosa, quam quæ habet pingue confertum superna-





## APHOR. 36.

Ὀκρόσι δὲ νεφριτικῶσιν ἔχσι τὰ προειρημένα  
 ξυμβαίνει σημεῖα, πόνοι τὴ περὶ τὰς μύας  
 τὰς ραχιαίας γίνονται, ὡ μὲν περὶ τὰς ἔξω  
 τόπας γίνονται, ἀπώσημα προσδέχῃ ἐσόμενον ἔξω·  
 ὡ δὲ μᾶλλον οἱ πόνοι πρὸς τὰς εἰσω τόπας γί-  
 νονται, καὶ τὸ ἀπώσημα προσδέχῃ ἐσόμενον  
 μᾶλλον εἰσω.

Quibus vero renum vitio affectis præ-  
 dicta signa contingunt, doloresque  
 circa spinæ musculos fiunt, si qui-  
 dem ad loca exteriora ferantur, absces-  
 sum extra fore expecta: quod si au-  
 tem dolores ad loca interna magis  
 fiant, abscessum quoque interius potius  
 futurum expecta.

Nephritici, inflammatione renum laboran-  
 tes, quibus prædicta (aph. 34. 35.) signa  
 contingunt, una cum doloribus obtusis, pulsanti-  
 bus, in lumbis, circa spinæ musculos, iis abscessum  
 fieri nunciari potest, eumque extra, si dolores  
 dicti ad loca magis exteriora ferantur, interius ve-  
 ro, si dolores ad interna magis loca vergant.

Nam quæ pars laboraverit, ibi abscessum  
 expectare oportet, juxta 4 aph. 32. Exemplum  
 abscessus renis ad spinam dorli se manifestantis,  
 videsis in Eph. N. C. D. 2. a. 3. o. 139. De  
 abscessu renali intra corpus plura prostant ex-  
 empla.

empla. Vid. *ibid.* D. 1. a. 1. o. 16. 64. a. 2. o. 81. a. 4. o. 114. a. 9. p. 241. D. 3. a. 6. app. p. 52. &c.

### APHOR. 37.

Ὅκοσοι αἷμα ἐμέχουσιν, ὡς μὲν ἀνευ πυρετοῦ, σωτήριον· εἰ δὲ ζῶν πυρετῶ, κακόν. Ἰσχυρὰ πύειν δὲ πῶσι ψυκτικοῖσι καὶ πῶσι συλητικοῖσι.

Qui sanguinem vomunt, siquidem citra febrem, salutare; cum febre vero, malum. Curandum vero refrigerantibus & adstringentibus.

Hunc aphorismum ab Hippocratis bibliotheca rejicerem libenter, propter ea, quæ leguntur, tum *Coac. sect. 3. n. 250.* hunc in modum: *Qui spumantem sanguinem evomunt, partibus infra septum transversum dolorem nequaquam sentientibus, iis ex pulmone vomitio fit; ac quibus quidem insignis in eo venæ ruptio fit, copiosus vomitione rejicitur, periculumque imminet: tum 4 aph. 25. Sanguis, supra quidem, qualiscunque fuerit emissus, malum; infra autem, si niger dejiciatur, bonum: nisi expositio obstaret Antiquorum, quam innuit Galenus; ita enim sententiam interpretabantur, sanguinis excretiones per os omnes sanabiles esse, si sine febre fiant, cum febre vero malas. Quæ satis conveniunt iis, quæ *Coac. sect. 3. n. 241.* leguntur hunc in modum: *Sanguinem spucentibus sine febre esse conducit, ac tussi & dolore leviter conflictari, &c. intense vero febricitare,**

*citare, ac tussire aut dolere, &c. minime conducibile.* Quam tamen expositionem rejecit Galenus, omnem excretionem a pulmonibus, summo discrimine plenam ratus, quantumvis sine febre fiat; quæ quidem Galeni opinio rejicitur, non modo per citatam Coacam, sed etiam per ea, quæ leguntur l. i. de morb. n. 10. in hunc modum, de pulmone suppuratis tractans: *Hic si per morbi initia, antequam vena sanguinem effundere & vehementer laxari cæperit, curatione præoccupetur, & prius quam extenuetur ac lecto decumbat, & prius quam caput corrumpi reliquumque corpus tabescere incipiat, incolumis ab ejusmodi morbo evadit.* Dum verbi *emovere*, prædictorum interpretationem respuit, se doctrinæ Hippocraticæ immemorem præstat, innumera enim adsunt loca, ex quibus clare patet Hippocratem hoc verbum ad omnem copiosam excretionem ab ore usurpare, ad distinctionem spuitionis, quæ fit in pauca quantitate, illud accommodando tam excretioni, quæ fit per gulam, quam, quæ fit per asperam arteriam. Quare sensus aphorismi talis fuerit: qui sanguinem largiter fundunt, sanari possunt si sine febre fuerint, cum febre vero emovere, malum, & letale. *Martian. p. 475.* In vomitu cruento, seu rejectione sanguinis ex ventriculo, si febrem junctam habet, si sanguis corruptus, graveolens & niger prodit, si ex magno & corrupto liene, vel indurato hepate profisciscitur, animique tandem jungitur defectio, summum adest periculum & mortem proximam jam portendit. Ast non tantum discriminis subest, si febris abest, si a suppressis evacuationibus ex plethora oriundis ortus. Conf. notata ad 4 aph. 25. Sanguinem in febre vomuisse, pestiferum est.

est. *Celf. l. 2. c. 6. p. 56.* Quibus fluere sanguis solet, aut quibus spina dolet, coxæve, aut post cursum vehementem vel ambulationem, dum febris absit, non est inutile sanguinis medicre profluvium. *ibid. l. 4. c. 4. p. 203.*

In curatione Medicus pro diverlitate corporum, caularum & temporis, prudenter & circumſpecte ſeſe gerere debet. *Refrigerantia* profunt quodocunque ſanguis nimis æſtuat atque in orgasmo conſtitutus, & pulſus impetuofus ac validus eſt; v. g. aquæ fontanæ, vel plantaginis, potus, in cujus libra nitri puri drachma & ſyrupi papaveris rhœados uncia dimidia ſoluta, ſucceſſive & temperate ſumtus, egregie conducit. Extra paroxyſmum, ad arcendum mali recurſum, potui ordinario inſervit commodè aqua fontana pura & levis in qua ferrum extinctum, vel etiam ſerum lactis acidulatum. Sed a quacunque cauſa fuerit producta ſtomachi hæmorrhagia, ſummo ſtudio cavendum eſt validis ſtypticis, adſtringentibus & vitriolaceis pharmacis. His enim ſanguinis eruptio quidem ſiſtitur, ſed cruor in vaſis ſtagnans putreſcit & gravis inflammatio cum ſphacelo metuenda, aut minimum, ſi cachecticum corpus eſt, expeditus fit in hydrophem tranſitus. Vid. *Hoffm. Med. rat. T. 4. P. 2. p. 71 ſq.* Si abeſt febris, vel elota alica, vel panis ex aqua frigida, & molle quoque ovum dari poteſt potui, &c. Vid. *Celf. l. c. p. 204.* Juvenis ſcirrhoſo lienis tumore laborans, poſt valentiora exercitia ſanguinem vomens, ſanatus eſt brumali tempore datis anodynis (inprimis laudano cydoniato Helmontii) & ſorbtionibus aquæ & aliorum potulentorum gelidiſſimis, parca copia, ſæpe repetitis, clyſtere

stere injecto ex lacte cum butyro, saccharo & vitello ovi, ad educendum ex ventriculo congruatum sanguinem. *Com. Bon. p. 477 sq.* In omni vomitu cruento, etiam desperatissimo, & per profusissimum sanguinis effluxum, ægros in agone constituentes, post methodica, quando sic licebat, administranda, nobis semper certum ac tutissimum remedium, & in omni ætate, sexu ac temperamento expertissimum, fuit radix Ypecacuanha, probe selecta, in alcohol contrita, & ad drachmam dimidiam cum mastichis purissimæ itidem pulveratæ granis quindecim bis, intra duodecim aut etiam, si moram hanc ferebat morbus, intra 24 horas, in aquæ plantaginis unciis tribus cum paucō syrupo rosarum rubrarum exhibita. Nec inde exhorrescat quisquam, quod in vomitu sanguinis cohibendo, remedium emeticum adhibeatur; siquidem certo, inter vomitus ab hoc emetico excitatos, sanguis sensim reprimitur, ac supprimitur; & quod de eo coagulatum in stomacho ac intestinis abunde accumulatum reperitur, per inferiora ejicitur. *Experto crede.* Cyrillus in *Ettm. Oper. T. 2. p. 308.* Si ab acribus assumptis generetur sanguinis vomitus, ne aliquid de eo acri restet in ventriculo, danda est potio diluens, quæ vomitu rejecta id acre simul aufert: sed si fiat a causâ interna, vomendi conatus compescendus parva quantitate vini Rhenani diluti cum citri succo & laudano liquido, cavendum ab omni adstringente & coagulante; hæc enim sanguini in ventriculo effuso mista, eum in thrombum contrahent, qui vomitu difficile potest reddi, & sua duritie ac tandem acrimonia laceffet ventriculum, & ad novum vomitum instigabit, dum

dam interim coagulans datum, contentis ventriculi ut & sanguini mistum, ad contrahendum vasculum apertum sanguinem fundens nihil præstare possit. Quare adstringentia magis ob sunt quam profunt in sanguinis vomitu: sed retentus ventriculus vacuus ita contrahet vasculum antea apertum, ut sponte sistatur sine damno effluens sanguis, & ita adducta vasculi latera inter se consolidantur. Quare præcipua curationis pars est, facere & servare ventriculum, quantum fieri potest, vacuum, per aliquot dies, ingerenda alimenta liquida tam parva copia & partitis vicibus, ut vita servari possit, evitando omnia duriora, acria, & copiosiora. Quibus continuatis sponte cessabit sanguinis vomitus, quod adstringentibus facile fieri non potuit. *Gorter.*

## APHOR. 38.

**Κ**ατάρροις ἐς τὴν ἄνω κοιλίαν, ἐκπύονται ἐν ἡμέρῃσιν ἑκοζιν.

**D**estillationes in superiorem ventrem, intra viginti dies in pus vertuntur.

**F**luxiones in thorace intra viginti dies suppurari incipiunt, nisi cito alio deferantur, atque per urinas vel per sudores exitum inveniunt. *Tozzi.* At vero multis modis superiore ventre suppurati fiunt. Nam cum pituita multa e capite confertum in superiorem ventrem

trem confluerit, putrescit & pus evadit. Putrescit autem maxime diebus uno & viginti.— Ex pleuritide quoque superiore ventre purulenti fiunt, cum vehemens fuerit, neque diebus judicare solitis computruerit, neque sputo rejecta fuerit, sed latus exulceratum fuerit, a pituita adhærescente & bile. — Interdum vero etiam ex venis sanguis se in ulcus ingerit, qui putrefactus pus fit. — Purulenti quoque fiunt, si pituita e capite in latus defluat, illicque adhærescens putrescat. — Fiunt etiam cum ex immoderato labore aut exercitatione, aut quavis alia ratione parte anteriore aut posteriore ruptio ita facta fuerit, ut non confestim sanguis expuatur, sed vulsum in carne contingit, quæ divulsa paucam humiditatem attrahit & sublivida evadit, &c. *Hippocr. l. i. de morb. n. 11.*

Si in eo succo, qui humectat & nutrit partes encephali, aliqua generatur acrimonia, illa capsulis nervorum a dura & pia matre mutuatis ad varias partes duci potest. Quare de origine & cursu catarrhorum nulla obstat via, quin duci possit ad varias corporis partes, & ita etiam ad ventrem superiorem seu pectus, qualis pars hoc loco intelligitur. Sed tunc illa restat summa difficultas, quomodo materia catarrhosa acris lymphatica possit in suppurationem commutari, quoniam experimur, catarrhos in nares vel fauces, vel pulmones descendentes raro purulentiam proferre, sed mucum aut tenuem humorem corrodentem, vel magis spissum, uti experimur in coryza, broncho, & tussi ex catarrho natis: nisi velimus per suppurationem hoc loco intelligere materiæ hujus tenuioris degenerationem in materiem crassio-

rem

rem & albicantem, qualem mutationem frequentissime in catarrhis observamus, non vero commutationem in verum pus. Materia enim acris & tenuis nullibi in verum pus commutatur, sed in materiem albam tenaciorem, quæ quoad adspæctum non multum a pure differt. Quod autem partes catarrho vexatæ tandem verum pus proferant, istud non fit ex mutata materia catarrhosa in purulentiam, sed si ista materia corroserit partem & ulcus formaverit, quod pus fundit, sicuti etiam superius (7 aph. 20.) in materia erysipelatoſa observavimus. Igitur deducerem ex hac observatione, quod etiam praxi respondet, materiem catarrhosam in ventrem superiorem destillantem, intra viginti dies commutari in materiem albam magis cohærentem, seu concoqui. *Gorter.*

APHOR. 39.

Ἡ ἐν τῷ αἵμα καὶ θρόμβος, καὶ στραγγίς ἐχῆ, καὶ ὀδὺν ἐμπύην ἐς τὸ περίναιον, καὶ τὸ ὑπογάστριον, καὶ τὸν κτένα, τὰ περὶ τὴν κύστιν νοσήειν σημαίνει.

Si quis sanguinem & grumos meiat, & stranguria laboret, dolorque ad perinaeum, imum ventrem, & pectinem incidat, partes circa vesicam male affici significat.

Recensitus hic est aphorismus supra 4 aph. 80.

Vol. II.

Cc

APHOR.



## APHOR. 40.

**Η** ἡ γλῶσσα ἐξαίφνης ἀκρατὴς γίνηται, ἢ ἀπόληκτόν τι τῷ σώματι, μελαγχολικὸν δὲ πλεον γίγνεται.

**S**i lingua derepente incontinens, aut aliqua corporis pars siderata evadat, id atram bilem indicat.

**V**idetur hic aphorismus desumptus esse ex l. 1. de morb. n. 3. ubi ita legitur: *Multi autem ab his frequenter mutilati fiunt, sideranturque manibus, & pedibus, & vocis inconstantes fiunt, & ab atra bile paraplegiæ, claudi vero a coxendico morbo.* Nam quod in aphorismo ait, *lingua incontinens*, ibi legitur, *vocis inconstantia*; ex quo docemur, quid per linguam incontinentem intelligere debeamus, locutionem scilicet interruptam, per quam patientes, dum loquuntur, dictiones exacte proferre non possunt, symptoma, quod vulgari (ital.) *tartagliare* dicitur (lat. *balbutire*, *lingua hæsitare*), idque provenit, ni fallor, a resolutione quorundam musculorum moventium linguam, quorum defectu lingua inæqualiter, & non ad voluntatis imperium exacte movetur, ita ut dum recta e. g. movere intendit, alicujus musculi defectu in obliquum fertur, & sic vocis articulatio defectuosa redditur, quod quidem symptoma vocis, & linguæ inconstantiæ appellat Hippocrates. Quomodo autem humor iste maxime

maxime nervosas partes invadat, explicavimus superius in expositione quinquagesimi sexti aphorismi præcedentis Sectionis. *Martian.*  
P. 475.

## APHOR. 41.

**Η** ὑπερκαθαρισμένων τῶν πρεσβυτέρων λύγξ ἐπέρχεται, ἐκ ἀγασθόν.

**S**i senioribus ultra modum purgatis singultus accidat, non bonum.

**A**b assumpto pharmaco duplici ratione supervenire singultus potest, vel ob immodicam purgationem, vel ob naturalem medicamenti facultatem. Primo modo in præsentī aphorismo non bonum esse, docemur, eo quod, cum senes ob purgationis violentiam in singultum incidunt, signum est, humores a nimia purgatione acrimoniam contraxisse, stomachoque a pharmaco debilitato, bellum indicere, idque in senibus maxime malum est, quia siccitas ab ætate contingens, humorum correctionem non facile admittit, cum in senibus humores acres, temperamenti ipsius ratione facile abundant. A facultate vero medicamenti singultum excitari, non est malum, quia experientia constat, multa singultum frequenter movere, qui quidem sponte paulo post sedatur, quod cognoscens Hippocrates quamvis, ubicunque de convulsione ab immodica purgatione contingente mentionem facit,

cit, par signum malum etiam singultum faciat; quod constat ex 5 aph. 4. cum tamen convulsionem a facultate medicamenti ortum habentem recenset, de singultu nullam mentionem facit, nam 5 aph. 1 & 2. simpliciter dixit, *convulsio ex ventratro letalis, ex vulnere convulsio letalis*; quare non est idem, quid consequi purgationes immodicas, & violentas, & a purgante medicamento. Nam etiam si ab assumpto pharmaco convulsio semper letalis sit, singultus tamen non ita, sed tunc solum, quando immodicam purgationem subsequitur: ratio diversitatis est, quia convulsio mala est ratione dignitatis affectæ partis, singultus vero ratione efficientis causæ. *Martian. p. 475.* Nonne, præter creatam ab immodica evacuatione acrimoniam, proveniet etiam ab inanitione singultus, dum a nimia purgatione corpus exhaustum humoribus privatur solida inter atque fluida æquilibrium, unde nascuntur spasmi? Vid. Not. ad 5 aph. 3.



**APHOR.**

## ΑΡΗΟΡ. 42.

Ἡ πυρετὸς μὴ ἀπὸ χολῆς ἔχῃ, ὕδατος πολλῆς, καὶ θερμῆς, καταχεομένη κατὰ τῆς κεφαλῆς, λύσις τῆς πυρετῆς γίνεται.

Si febris non ex bile orta prehenderit, aqua multa, & calida, capiti affusa, fit febris solutio.

Intellige febrem a vehementi exercitio, ab æstu aut vino, ita solvi posse, certe in regione aliqua calidiori, & ubi balneum in usu sit quotidiano. Nam multa aqua calida in caput affusa, meatus cutis excretorios laxare & cruditates concoquere apta est. *Lister.* In *lib. 2. Epidem. sect. 6.* ad finem Hippocrates hunc in modum loquitur: Si quem calor (aut febris) prebendat, neque ex bile, neque ex pituita, sed aut ex lassitudine, aliave de causa febricitet, calida multa affusa caput irrigato, quoad in pedibus sudor excitetur, farinamque quam crassissimam coquito. Excitato vero in pedibus sudore, farinam plurimam & calidissimam edat superchibito mero, & stragulis coopertus placide quiescat. Quibus docemur, quomodo lotiones capitis, de quibus in aphorismo tractatur, pro ephemerarum curatione sint administrandæ; nec diversitas in eis adnotanda est ex eo, quod additum sit neque ex pituita; nam quando Hippocrates *lib. de nat. homin. n. 27.* docet plurimas febres ex bile oriri; earumque spe-

cies enumerat, continentem, quotidianam, tertianam, quartanam, & eas, quæ ab occultis doloribus fiunt, videlicet ab inflammationibus internis, quas omnes universaliori nomine putridas vocarunt posteriores, non ita excludit pituitam, ut nullo modo ad febrem concurrat, imo a sola bile febrem excitari posse non existimavit, sed febres ex bile appellavit, quia absque ea præfatas febres accendi, est impossibile. Quod si humoris prædominium attendatur, febris a bile dicitur, in qua hæc dominabitur, a pituita vero, eadem pituita prædominante. Utramque respexit in citata sententia Epidem. alterum vero tantummodo, bilis scilicet prædominium, citato lib. de nat. hom. *Martian. p. 476.* Aqua calida capiti exterius admota non conducere videtur nisi iis in casibus, ubi calor, siccitas, & inflammatoria adest diathesis, ad dolores mitigandos, laxando crispaturam fibrarum, statim humorum solvendo; juxta dicta ad 5 *aph.* 22: alias vero virtute sua molliente, laxante, vasa ad congestiones & stases humorum, cerebro perniciosas, facile suscipiendas disponit. Capitis igitur lotionum usus res periculi plena est, & magnam prudentiam desiderat, hinc cautissime usurpari debent, & tutius ab iis nostris in regionibus abstinetur. *Hoffm. Med. rat. T. 1. p. 657.* Quid? quod etiam Celsus *l. 3. c. 14.* improbat methodum Cleophanti cujusdam ex antiquioribus Medicis, qui in febre tertiana & quartana, multo ante accessionem, caput ægri multa calida aqua perfundebat.

Omnes febres, quæ ex humore acri, tenui & calefaciente in corpore nato, generantur, dicuntur apud Veteres a bile oriri, inter quas  
febris

febris tertiana intermittens primas partes tenet: an vero febris ardens, putrida, hektica, & symptomatica ex bile nascatur, non consentiunt. Igitur incertus sum, num in memoratis febribus, atque in quotidiana & quartana, quæ dicuntur oriri ex pituita & melancholia, caput perfundendum sit multa aqua calida, ad curationem. Proinde incerta hoc loco proponitur curatio. Credo igitur, Auctorem observasse quandam speciem febris egregie solvi hac aqua calida perfusa, sed & expertum esse, in febribus biliosis nocuisse. Quæcunque pars nostri corporis multa aqua calida fovetur & abluatur, ab actuali illo calore paulo magis eo tempore incalescit, atque liberatur a sordibus cuti adhærentibus, simulque laxatur & humectatur: sed si desinat ille calor actualis, relinquitur pars frigidior & laxior, quam erat ante fotum vel affusionem eam. Si vero illa pars ultra modum incalescat & sicca sit ante hanc affusionem, ut experimur in partibus inflammatis, ab affusione hac lenietur urens calor, humectabitur pars, & tensio laxabitur. Facile ergo erit ex his conicere, quam in specie febris hæc methodus valeat: nempe si ex insolatione caput incalescit & siccatum fuit, siccitas enim, & humor tenuis acer ex insolatione natus, humectabitur, atque concedetur liber exitus humori illi, & qui resistabat in poris, simul auferetur. Aut si quis ex laboribus durioribus propter expulsionem humoris tenuioris & compactum sanguinis febricitet, hac capitis ablu-tione calida, ejus humores compacti resolventur, suppeditabitur mitis & tenuis humor aquosus, & solida contracta, sicca, humectabuntur & laxabuntur. Denique quibus ob aeris fri-

gilitatem vel ventum prohibita fuit perspiratio, & materia illa retenta febriculam concitat, his per aquam affusam calidam liberior conceditur perspiratio, qua id, quod febrem excitat, eliminatur e corpore. His ergo in febribus conduct aqua multa calida in caput affusa: sed si materia sit biliosa, uti experimur in morbis erysipelatosi, per affusam calidam his augebitur bilis corruptio. *Gorter.*

## APHOR. 43.

Γυνή ἀμφιδέξιον ἔστιν.

Mulier ambidextra non fit.

Expungent hanc sententiam sine formidine reatus, qui norunt, quod ambidextros faciat usus, non natura. Fundamento certe aereoso nituntur quæ adfert, ad tuendam veritatem aphorismi hujus, *Cardanus p. 799 seq.*



APHOR.

## APHOR. 44.

Ὅσοι ἔμπυοι καίονται, ἢ πύμνονται, τὰ μὲν  
τὸ πύον καθαρόν ῥυή, καὶ λευκόν, περιγι-  
γνεται· ἢν δὲ ὕφαιμον, καὶ βορβορώδες, καὶ δυσ-  
ώδες, ἀπέλλυται.

Suppurati cum uruntur, aut secantur,  
si pus purum, & album effluat, eva-  
dunt: quod si subcruentum, & coeno-  
sum, & graveolens fuerit, pereunt.

Sententia hæc in *Prognost. n. 19.* legitur in  
hunc modum: Cum suppurati uruntur, quibus  
purum quidem pus est & album, & minimo fætidum, ii  
servantur. at quibus subcruentum, & coenosum, mo-  
riuntur. Et l. 2. de morb. n. 45. ubi de empyi-  
cis, quibus sectio adhibita est, tractatur, hæc  
habentur: Indicio est evasurum ægrum, si quidem  
pus album & purum fuerit, fibræque sanguinis in-  
sint, ut plurimum convalescit. At si primo die ovi  
luteo simile, aut postero die crassum defluat, aliquan-  
tum ex virore pallidum, & graveolens, ubi pus ef-  
fluxerit, moriuntur.

En. Pus optimum est album, æquale & læ-  
ve, & quam minimum graveolens, huic autem  
contrarium pessimum. *Hippocr. Prognost. n. 7.*  
Si pus diu in loco clauso relinquitur, attenuatur,  
acre fit, putrescit, vicina consumit, erodit.  
*Borh. aph. 406.* hinc necesse rubrum habeat  
sanguinem admistum ex erosio vasculis, evadat



inæquale, *subcruentum*, *cænosum*, colore fuscum & substantia amurcam referens, atque inde *graveolens*. Si ergo empyema in thorace habentibus, de quibus præsens intelligendus est aphorismus, sive sectis, sive uestis, pus effluat optimum, de illorum vita sperari potest, cæteris se habentibus convenienter; nihil enim mali arguit ejusmodi pus de partibus unde venit. Contra, si ex pravis signis quippiam apparuerit, omni spe destitutus est æger, uti loquitur Hippocrates *Prognost. n. 19*. memoratis enim pravis qualitatibus imbutum pus, significat corruptam partem unde manat & tæbe affectam, unde necessario pereunt ægri: quoniam mortifera est gangræna cum cæterarum corporis partium, tum vero spirabilium, quarum officio vel ad punctum temporis vitam carere non potis est: & quarum vitio, naturæ omnia præsidia collabuntur, cum *ἀδυναμία* omnium facultatum, & vacatione omnium officiorum, tandem in sympathiam & contagionem adductorum nobilissimæ partis corruptæ. *Duret. in Coac. p. 273. Conf. Boerb. aph. 1192. 1193.*



APHOR.

## APHOR. 45.

Οἵ κέ σοι τὸ ἥπαρ διάπυον καίονται, (ἢ πί-  
νονται) ἢ μὲν τὸ πύον καθαρόν ῥύη, καὶ  
λευκόν, περιγίγνεται, ἐν χιτῶνι γάρ τὸ πύον τε-  
ταίσι (ἐστίν) ἢν δὲ οἶον ἀμόρην ῥύη, ἀπόλλυται.

Qui ex purulento jecore aduruntur,  
(aut secantur,) ii, ubi pus purum flu-  
xerit, & album, supersunt, quod  
pus in tunica ipsis conclusum sit: sin ve-  
ro qualis amurca fluat, pereunt.

Extat hic aphorismus in *Coac. sect. 3. n. 274.*  
paucioribus conceptus verbis, ita: *Qui-  
bus ex hepatis ulsione pus amurcae simile prodit, le-  
tale.* Apud Celsum l. 2. c. 8. p. 67. hæc le-  
guntur: *Si in jecinore vomica est, & ex ea fertur  
pus purum & album, salus ei facilis. id enim malum  
in tunica est. & ibid. p. 71: Ex jecinore si pus  
cruentum exit, mortiferum est.*

Vidimus ad præcedentem aphorismum in  
empyicis, quod eorum bene res eunt, quibus  
pus educitur æquale, album & nihil olens,  
contrà ipsos mori, quibus manat pus contra-  
riis dotibus præditum. Similiter empyema he-  
paticum, quod exitum foras affectat; si quidem,  
perusto hypochondrio, libertatem habeat, ex-  
eundi, ac tum in exitu signa edat integræ par-  
tis solidæ, vegeti caloris nativi, & humoris  
morigeri (quoniam id manat e tunica ubi col-  
lectum

lectum erat, non in viscere ipso diffusum) apparetque omnino quale modo descriptum est; certa spe consolatur Medicum futuræ salutis. Quod autem prodit e parte corrupta, in viscere ipso diffusum, non autem collectum in tunica, pus amurcosum, funestum exitum ostendit, quia nulla salus vitæ sperabilis esse potest in amissione vitalis officii, quo fungitur ipsum hepar dum valet natura & valetudinis cura. *Durer. in Coac. p. 309. Conf. Boerb. aph. 944. 945.*

APHOR. 46.

Ὅτινας ὀφθαλμῶν, ἀκροῦν ποτίσας, καὶ  
λέσας πολλῷ θερμῷ, φλεβοτόμει.

Oculorum dolores, exhibita meri potione, & copiosæ æquæ calentis balneo, venæ sectione curato.

Antiqui Hippocratis expositores præsentis aphorismi interpretationem haud ineptam adducunt, videlicet, dolores oculorum a copiosa materia, & equæ compacta procedentes venæ sectione curari, verum eos prius attenuandos esse, & meri potu, & calido balneo. Hanc tamen expositionem rejicit Galenus, eo quod periculosam sit, & vini potu, & balneo in corporibus repletis uti, nulla evacuatione prægressa. Verum hæc Galeni ratio aliquid roboris haberet, si juberet Hippocrates pluribus diebus ante Venæ sectionem prædictis utendum esse;

esse; sed quia supponit, ea tantummodo esse administranda eo ipso die, quo fit phlebotomia, ut dicendi modus, quo utitur, satis manifestat: etiamsi humores inde fundantur, & ampliorem locum exposcentes, venas distendant, nullum tamen periculum impendet, cum statim evacuatio subsequatur. Nam etiam *lib. de vict. acut. n. 38.* pro aphonix curatione venæ sectioni præmittit fomentum toti corpori, quod non minoris periculi esset, nisi statim evacuatio subsequeretur. Verum dicet aliquis, hanc curationem non omnibus oculorum doloribus convenire, sed iis tantummodo, qui ab enarrata causa dependent, unde improprie Hippocrates universaliter locutus est. Huic respondeo, indefinite propositionem hanc protulisse, non universaliter, idque ab Hippocrate fieri frequenter, quando non necessario semper id contingere ab eo observatum est. Quamvis etiam universaliter vera, & rationabilis defendi posset hæc curatio in omnibus oculorum doloribus, quia, cum oculorum dolor fieri possit, & a sanguinis plenitudine, & ab humorum crassitie, nec non a nimia tenuitate, in omnibus his tribus casibus curatio hoc in loco ab auctore proposita rationabilis est. Nam de plenitudine doloris causa nemo dubitabit, quin pro ea tollenda conveniat venæ sectio, nec ex præcedente vini potione, & balneo incommodum aliquod adveniet, si statim evacuatio succedat. Similiter, quando humores crassi, & frigidi dolorem faciunt, probanda est venæ sectio, quæ humores omnes evacuare potest, quæ cum venoso genere communicantur, nam cum morbus, non ab intemperie sola, sed ab humoribus ipsis dependeat, magis est commodum,

dum, quod a venæ sectione provenit; evacuatis humoribus, qui ipsum fovent, quam noxa, quæ ab eadem, refrigerato corpore, timeri possit, qua quidem ratione Hippocrates in frigidis morbis minus timuit venæ sectionem, quam ubi bilis dominatur, unde etiam in hydropse a phlebotomia non abstinuit, ut ex *lib. de vict. acut. n. 62.* manifeste constat: quare in doloribus oculorum a frigidis, & crassis humoribus convenit venæ sectio, præsertim cum ante, & vini potione, & calidis lotionibus frigida intemperies corrigatur, humorque attenuetur, ut per venæ sectionem evacuari possit. Quare difficultas tantummodo versatur in iis doloribus, qui a tenuibus, & acris humoribus dependent, in quibus etiam si vini potionem convenire posse concedat Galenus, quatenus vinum humiditate eorum acrimoniam retundit, & potissimum subsequente balneo, venæ tamen sectio in affectibus biliosis Hippocrati semper suspecta fuit; quod quidem intelligendum est, quando bilis peccat in toto, non quando in particula tantum, ut evenit in hoc casu, in quo bilem non abundare in toto ex eo conjicimus, quia febrem non adesse supponitur, quando de ea non fit mentio, quæ necessario in doloribus oculorum accenditur, quotiescunque bilis in corpore viget. hac enim ratione in morbis, qui febrem adjunctam habent, magis timuit Hippocrates venæ sectionem, quam ubi nulla adest febris: *Martian. p. 476.* Antiquos oculorum dolores & rubores, multis remediis frustra tentatis, vini potu meracioris curatos refert *Borellus Cent. 2. obs. 77.*

APHOR.

APHOR. 47.

**Υ**δροπῶντα καὶ βῆξ ἔχῃ, ἀνέλπιτός ἐστιν.

**H**ydrope laborantem si tussis detineat, desperatus est.

**H**æc sententia extat, & exposita est, supra  
6 apb. 35.

APHOR. 48.

**Σ**τραγγαρίῳ καὶ δυσουρίῳ, θώρηξις, καὶ φλεβοτομία λύει πίνειν δὲ τὰς ἡσῶ φλέβας.

**U**rinæ stillicidium & meiendi difficultatem, vini meri potio, & venæ sectio solvit: at secandæ sunt interiores venæ.

**I**n lib. 2. *Epidem. sect. 9. n. 39.* hæc tantum leguntur: *Stranguriam venæ sectio solvit.*

Superius 6 apb. 36. venæ sectio commendata est ad dysuriam cum febre. Hic ad stranguriam & dysuriam chronicas, senibus v. g. familiares, traduntur remedia. *Hæcquet.* Stranguriæ, & dysuriæ quamvis multæ causæ esse possint, omnes tamen ad tres reducuntur, ad inflammationem vesicæ, aut partium adjacentium; ad  
ma-

materiæ acris, & pituitosæ defluxum; & ad facultatis imbecillitatem, cujus gratia hi affectus senibus sunt familiares, & in iis difficulter curantur. Ratione inflammationis convenit venæ sectio, quæ etiam non erit inutilis, quando ab aliorum humorum affluxu dependet, ob rationes ad 7 *aph.* 46. adnotatas, quamvis hujus peculiaris curatio sit vini potio, & illius maxime, quæ a facultatis imbecillitate ortum ducit, vinum enim partim concoquendo, partim roborando, partim humectando, & quod summum est, urinam ciendo prædictis malis auxilio esse potest. *Martian. p.* 477. Quod si post suppressum mensium vel hæmorrhoidum fluxum, stranguria, vel dysuria, imminet, optimum consilium, ut excretiones hæ vel revocentur, vel sanguis copiose congestus per sanguinis, præsertim in pede, missionem, derivetur, quod auxilii genus iis inprimis, quibus ani aut uteri venæ stillare amplius jam cessarunt, proficuum est. Est hoc in casu verum omnino Hippocratis dictum, *urinæ difficultatem & stillicidium solvere venæ sectionem.* Quod ad vini potum attinet, merito tenendum, quod nullum aliud ex usu sit, quam dulce, Malvaticum, Hispanicum, vel etiam Hungaricum, quod moderate & medice potum, tam ad roborandum stomachum, quam ad vires refocilandas, apprime conducit, nisi febris & calor prohibeant. Illa vero vina, quæ multum acidi tartarei in sinu foveant, ut Rhenana, aliaque Germanæ austera, penitus merito sunt rejicienda. *Hoffm. Med. rat. T. 4. P. I. p.* 482. 485. Quid in aphorismo per venas interiores intelligendum sit, indicatum est in expositione 6 *aph.* 36.

Venæ

Venæ sectio minuit motum, & vini potio auget corporis calorem. Si ergo junior Medicus utroque genere auxiliorum uti vellet, tantum noceret, quantum proderet. Ne igitur in posterum faciamus periculum, videndum est, num ex motu languidiore generetur stranguria, & dysuria; tunc enim largior vini potatio est concedenda: sed si experimur adesse ardorem, signa febris vel inflammationis, a vini potu abstinendum, at vena secanda est.

*Gorter.*

## APHOR. 49.

**Τ**ὸ κυνάγχης ἔχόμενον οἶδημα, καὶ ἐρύθημα ἐν τῇ στήθει ἐπιγιγνώμενον, ἀγαθὸν ἔξω γὰρ τρέπεται τὸ νέσθημα.

**A**b angina detento tumor, & rubor in pectore superveniens, bonum: foras enim morbus vertitur.

**E**adem sententia legitur in *lib. 2. de morb.* n. 26 & 27. *Coac. sect. 3. n. 102.* & apud *Celsum l. 4. c. 4. p. 197.* ita expressa est: *rubore & tumore in præcordiis orto, scire licet fauces liberari.* *Exposita habetur superius 6 aph. 37.*





## APHOR. 50.

**Ο**κόσπιν ἀν σφακελιῶν ὁ ἐγκέφαλος, ἐν  
 τρισὶν ἡμέρησιν ἀπόλλυνται· ὡς δὲ πάντας  
 διαφύγῳσιν, ὑγιεὲς γίνονται.

**Q**uibus cerebrum sphacelo tentatum  
 est, intra tres dies intereunt: quod  
 si vero hos effugerint, sani eva-  
 dunt.

**H**ic aphorismus in *Coac. sect. 2. n. 53.* ita scri-  
 bitur: *Quibus cerebrum sphacelo affectum est,*  
*quidam tribus diebus, quidam etiam septem moriun-*  
*tur, quos si evaserint, servantur.*

Si de sphacelo cerebri, vel illarum partium  
 quæ sub cranio latent, Hippocrates hic eo  
 sensu, quo recentiores Medici sphacelum ac-  
 ciunt, locutus fuisset, absonum esset, emor-  
 tuo vel sphacelato cerebro, statuere velle, post  
 tertium aut septimum diem evasurum. Utitur  
 Hippocrates verbo σφακελίζω, quod communi-  
 ter vertitur per *sphacelari* aut *emortuum esse*; &  
 usurpat eandem vocem *lib. 2. de morb. n. 5.*  
 & 20. in quorum postremo loco eadem fere  
 verba occurrunt cætera quæ habentur in hoc  
 aphorismo. Oboritur hinc Jo. Agricolæ su-  
 spicio, inter sphacelum & necrosin Veterum  
 magnam esse differentiam; persuadetque sibi  
 Vir doctus 1. id, quod *sphacelum* hodie dicimus,  
 i. e. partes post gangrænam emortuas, necro-  
 sin dicendum esse ad mentem Veterum; 2. in-  
 flamma-

inflammationem partium sub cranio, *phrenitidis* nomine insignitam, secundum Hippocratem *sphacelum* appellari. Vid. *Com. Litt.* 1736. p. 321 sq.

Modernis vocatur *phrenesis* sive *phrenitis*, membranarum cerebri vel solitaria, vel cum parte quadam cerebri sociata inflammatio, sed perperam, & perverso vocabulorum usu. Hippocrati enim & Græcis auctoribus diaphragma vocatur *φρένες*, quod ad intelligendam in lectione Veterum *ἀμφίβειαν* probe notandum; unde *phrenitis* proprio ac genuino sensu est inflammatio diaphragmatis, quam ordinario insequitur delirium. Dicitur autem *φρένες* diaphragma, vel quia Antiquis mentis sedes fuit reputatum, vel quod in diaphragmate affecto & inflammato Mens perturbetur: quam Veterum opinionem renovavit *Bartholinus* in *Examine Paradox. Med.* qui statuit in centro diaphragmatis nervo sedem esse fundamentalem animæ. Præterea observari & hoc debet, quod omnia vocabula Græcorum medica in *τις* terminantia semper significant inflammationem ejus partis cujus acceperunt denominationem, ut apparet in vocabulis *Nephritis*, *Hepatitis*, *Pleuritis*, & sic per consequens *Phrenitis*. Antiqui e contra inflammationem membranarum cerebri, aut ipsius cerebri vocarunt *sphacelum* seu *sphacelismum*. Hodie abusive *sphacelus* dicitur mortificatio totalis, quam Hippocrates & Veteres vocarunt *necrosin*; qui serpentem adhuc extinctionem, dum est in fieri, *gangrenam* vocabant, quod vocabulum adhuc in tali sensu in usu habemus. *Ettm. Oper. T. 3. p. 54.*

Oportet hunc aphorismum intelligere, ut Galenus in enarratione vult: Si incipiente

D d 2

spha-

sphacellismo, h. e. ulcere cerebrum depascente, virtus potens fuerit, ut illud superet, ægrotus intra tres dies evadit, & sanus fit: si vero a cerebri potentia non superatur, cerebrum corrodit & exedit, & intra tres dies interficit. Et intelligit, teste Galeno, non perfectam corruptionem cerebri; nam tales nunquam evadunt. *Forest. Obs. Med. l. 10. obs. 11. schol. p. 324* Per proleptin usurpatum est siderationis nomen, i. e. dum sideratur cerebrum; ut inchoata videatur sideratio, non autem numeris omnibus absoluta, quæ insanabilis est; tanquam privatione inducta. Nam proprie sphacelus, perfectam cujusque partis corruptionem significat. Sed quemadmodum carnis corruptio gangræna dici solet: ita sideratio ossis, nomen sibi vindicat τῆ σφακίᾱς. Ut igitur multum interest inter gangrænam & γαγγραινοῦσθαι, quod illa perfectam absolutamque νέκρωσιν carnis significet; hoc vero μελασμέν, i. e. nigredinem & inchoatam corruptionem: sic inter sphacelon & σφακελίζειν, ille enim carbunculationem ossis, hoc vero alterationem, qua itur ad alienationem, denunciat. Atque ut sæpenumero rerum absolutarum verba & nomina pro inchoatis usurpantur: ita quoque hic talis usurpatio consideranda videtur, ut σφακελίζειν dicatur cerebrum, quod in corruptionis metu est. Sed quid est sphacellismus cerebri. & quibus signis ad illius cognitionem deducimur? Eum sphacellismum ita descripsit Hippocrates l. 2. de morb. n. 20: *Siderato cerebro, dolor ab occipitio in spinalem medullam invadit, ac tum frigus ad cor pervadit, unaque sudor cito cietur, effluitque sanguis e naribus; nonnulli etiam vomunt; hic tribus diebus vitam finit.* Et infra  
n. 23:

n. 23: Si quem *sphacelus* corripit, dolor anticam potissimum capitis partem occupat, intumescit, livescit, cum febre & crebro rigore. Hunc secare oportet, neque abradendo quiescere, donec ventum sit ad *diploïdem*. Finiunt vitam alii tribus, alii septem diebus, pro varia sideratæ partis conditione & situ. Nam siderato bregmate, & in puero, citior mors venit, quam in occipite & adultiore. Si causam melasmi fortis natura expulerit, aut Medicus multum celer atque fidelis terebrando exhauserit, partique afflictæ neoterismum induxerit, æger restituetur. Si autem, facta decussata carnis dissectione, & pericranii a calvaria avulsione, appareat, tactu & aspectu, & modiolò religiose & prudenter circumactò, os colore, caractere, & mole omnino a se mutatum, & a naturali connexion ac situ amotum, signum hoc est perfectæ *καρπίστος*, & quod omne vivens consortis mortui impatiens esse soleat; juxta *Coac. sect. 2. n. 53. Duret. in Coac. p. 96 sq.* *Sphacelus* in nostro aphorismo denotat cerebri corruptionem, non illam quæ oritur ab inflammatione tendente in *sphacelum* verum (quo sensu nempe hodie vocabulum hoc usurpari solet), sed quæ provenit ab acri crudo irritante meninges, cujus acrimonia, si sit valida & copia magna, cerebrum ita opprimitur, ut æger moriatur vel post tres, quinque vel septem dies. Sed si humor ille reddi incipit per nares, vel sputum, vel urinam, ægri liberari solent. *Garter.*

## APHOR. 51.

**Π**ταρμός γίνεται ἐκ τῆς κεφαλῆς, διαθερμαίνονόμενα πῦ ἐγκεφάλῳ, ἢ δινηγρανομένη τὰ ἐν τῇ κεφαλῇ κενῶ, ὑπερχεῖται γὰρ ὁ αἶρ ὁ ἐνέων ἐξω· ψοφᾷ δέ, ἔτι διὰ σενῶ ἢ διέξοδῳ αὐτῶ ἐστίν.

**S**ternutatio ex capite fit concalesfacto cerebro, aut perhumeſcata capitis inanitate, aër enim intus contentus, extra effunditur : ſtrepitum autem edit, quod ei per anguſtum ſit tranſitus.

**E**xploſionis genus eſſe ſternutationem, non inepte exprimit aphoriſmus. Cum enim ab irritatis nervis olfactoriis, per nares in membrana pituitaria diſperſis, in conſenſum trahuntur rami ex nervorum pari quinto & ſexto ad naſum delati, & ab his nervi intercoſtales, qui dictis ramis ortum ſuum debent, ut & communicans cum iis par vagum, diaphragmatis, nec non muſculorum abdominalium & intercoſtaliū cum muſculis reſpirationi ſervientibus ſuſcitatus conſenſus, excitat motum illum, quo fit ut thorax valde dilatetur, & aër magnæ copia in pulmones irruat, qui ibi a calore rarefactus mox iterum magna vi inde per anguſtias narium foras pellitur. Eſt itaque ſternutatio, violenta & ferme convulſiva, mox tamen remittens, conſtrictio membranæ pituitariæ

tariæ omniumque partium expirationi dicatarum, unde & antiquissimis Medicis levis & cito transiens audit epilepsia. Causa autem hujus constrictionis semper in membrana pituitaria hæret, unde & sternutatio a tussi differt: hujus namque causa efficiens in membrana bronchiali asperam arteriam, laryngem & bronchia pulmonum investiente residet, ubi convulsivam constrictionem partium expirationem præstantium producit, cujus ope aër uno impetu in altum propulsus per os eliminatur, postquam antea laryngi allisus sonum, quem tussim vocamus, edidit. Contra vero sternutationis causa, constrictionem membranæ pituitariæ efficiens, eandem constrictionem, ob consensum, illis quoque partibus communicat, quæ respirationi inserviunt; unde pari quidem, ac in tussi, modo aër in altum violenter propellitur; ast, cum musculi linguæ radicem attollentes una sese constringunt sicque linguam attollunt & hoc ipso quis partem posteriorem adimplent ita, ut aër per os sufficientem exitum non acquirat, ipse aër maximo cum impetu per nares protruditur & illum sonum efficit, quem sternutationem vocant. Cur lingua sub sternutatione attollatur, patet consideranti, illam nervos a quinto pari mutuare & sic cum membrana pituitaria communicare. Sternutationis usus potissimum in eo consistit, ut impuritates ex naso eliminentur, nervi olfactorii illæsi conserventur, sicque ipse olfactus naturali modo peragi possit; interim tamen simul totius corporis concussio accidit eo fortior, quo fortior sternutatio est. Vid. *Com. Lit.* 1739. p. 361 sq.

D d 4

Tunc,

*Tunc, cerebrum versus, sanguis ruit impetu magno  
Et valido nisu munguntur vascula mucii.  
Hinc sternutantes demulcet blanda voluptas.*

Hebenstr. de Hom. p. 89.

Est quidem sternutatio singulare illud naturæ beneficium, quo sequestrantur viscida, acria, quæ cæteroquin ad cerebrum duci poterant, intra pituitariam narium tunicam; non tamen semper feliciter illam cedere observatum est in peste illa Italica, qua multi (cei scribit Siganus lib. 1. *Hist. de regno Italiae*), cum sternutarent, alii cum oscitarent, repente spiritum emiserunt. Quod cum sæpe eveniret, consuetudo inducta est, quæ nunc etiam observatur, ut sternutantibus salutem precando, oscitanti- bus signum crucis ori admovendo, præsidium quærent. Vid. *A. E. L.* 1758. p. 478. Præ- mium membrum sternutans est diaphragma per consensum nervi intercostalis: hinc quibus hæc membrana sensilior, hi facile sternutant. *Ettm. Oper. T. 1. p. 149.* Quo sensibilior est membrana narium pituitaria, eo, propter faciliorem irritationem, promptius sternutamur; hinc qui ex crebro pulveris sternutatorii abusu mem- branam istam exsiccata, minus sensilem, ha- bent, minus sternutare solent. *ibid. T. 2. p. 459.*

Prima sternutationis causa in aphorismo dicitur *cerebrum percalefactum*, id est, si motus vi- talis in encephali partibus validior nimium ca- lorem concitavit, arteriæ in membrana pitui- taria magis agitatæ, sua actione stimulantur fa- ciunt tale irritamentum in hac membrana, uti sit a calefacientibus pulveribus vel vaporibus naribus attractis, qua commota membrana na- turali lege concitatur sternutamentum. Inde

in

In impetu majore sanguinis ad caput toties generatur sternutamentum, quod iterata concussione tandem sanguinem extrudit, aut illa vascula disrumpit, atque facit hæmorrhagiam narium, qua illa vasa deplentur, & minuitur impetus, in quo casu sternutamentum est præsagium bonæ hæmorrhagiæ. Sed si ab inflammatis meningibus per consensum pituitaria membrana agitur, vel si ipsa membrana inflammatur, molesta, fatigans, & iterata fit sternutatio, sine hæmorrhagia subsequente, qua agitatione pars inflammata magis exasperatur. Inde intelligitur, cur in quibusdam morbis acutis atque epidemicis interdum salutaris, aut interdum letalis observetur sternutatio. Altera causa dicitur *perhumectatum*, quod est in capite, vacuum. Veteres, in Anatomicis non satis periti, existimarunt humores in capitis vacuo spatio, id est, in cerebri ventriculis, collectos expurgari per nares. Sed constat hodie, nullam ex ventriculis cerebri ad nares esse viam. Observatio tamen practica eam viam adstruere videtur, quum cerebrum humiditate, uti videtur, oppressum liberetur copiosiore evacuatione muci per nares, & gravitas cerebri levetur sternutamento, quo multum muci elicitur: verum si membrana pituitaria multo muco sit appleta, aggravatur etiam caput, & ille potest facile per nares expurgari. Quamvis autem demonstrari possit per aliam viam fieri posse talem evacuationem, hoc tamen non demonstrat, fieri non posse evacuationem ex encephalo. Qui contendunt duram matrem accurate obtegere os ethmoïdeum, ut nihil humidi perfluere possit ex encephalo ad nares, illi non concipiunt nervos olfactorios ire per hoc os



ad cava narium, in quo transitu negari nequit, aliquid etiam humidi permeare posse. Sive ergo concipiatur, in sinibus frontalibus vel ephippii hæerere mucum, qui in cavum narium destillat, sive concipiatur humiditatem encephali secundum olfactoriorum nervorum decursum in nares descendere, in utroque casu homo sentiet cerebrum seu caput aggravatum, quæ gravitas minuetur humidi evacuatione per nares. Si hic mucus seu humor tenuior sit mitis, non concitabit sternutamentum, sed si quædam acrimonia adest, illa vellicans internam narium membranam sternutamentum concitat, quo elicitur ex hac membrana, quæ & interne vestit sinus recensitos, mucii abundantia, cujus evacuatione tollitur ille humor aggravans. Rationem reddere satagens Auctor, quomodo, cerebro calefacto, ex spatio vacuo tanta vi extrudatur in sternutantibus aër, putat humidum in ventriculis cerebri contentum a cerebri caliditate commutari in vaporem, uti aqua in lebete vel vase clauso ab igne subtrato, si tunc alicubi formatur apertura, exhibit aër cum impetu. Experimentum utique est verum, sed falsa est facta analogia, nunquam enim cerebrum ita incalescit, ut est ignis gradus qui aquam ebullire facit & in vaporem converti, neque via tam patula, per quam pervisset ille vapor per nares emitte. Atque ille aër, qui in sternutantibus exit, non venit ex encephalo, sed ex pulmonibus. *Gorter.*

APHOR.

## APHOR. 52.

**Ο**κόποισιν ἡπαρ περιωδυνᾶται, ταῖσι πυρε-  
τὸς ἐπιγινόμενός λυεῖ τὴν ἐδύνην.

**Q**uibus jecur circumcirca dolet, iis  
superveniens febris dolorem solvit.

**H**æc sententia explicata est superius 6 aph.  
40.

## APHOR. 53.

**Ο**κόποις συμφέρεῖ αἷμα ἀφαιρεῖσθαι ἀπὸ  
τῶν φλεβῶν, ταῖς καὶ κατὰ τὴν φλεβοτο-  
μήσθαι.

**Q**uibus sanguinem ex venis detrahere  
convenit, iis vere vena secanda est.

**E**t hic aphorismus supra 6 aph. 47. expositus  
habetur.



## APHOR. 54.

**Ο** κάσιζι μεταξύ τῶν φρενῶν καὶ τῆς γαστρὸς  
 φλέγμα ἀπικλείεται, καὶ ὀδύνην παρέχει,  
 ἢ ἔχον διέξοδον εἰς ὑδαιτέρην τῶν κοιλιῶν, ταπύ-  
 οισι κατὰ τὰς φλέβας εἰς τὴν κύσιν τραπίντῃ  
 τὸ φλέγματῃ, λύσις γίγνεται τῆς νόσου.

**Q**uibus inter septum transversum, &  
 ventriculum pituita concluditur, &  
 dolorem exhibet, neque in alter-  
 utrum ventrem viam habet, iis per  
 venas in vesicam pituitâ versâ, morbi  
 fit solutio.

**P**ituitæ nomine hic concipitur pars alba san-  
 guinis, aut lymphatica, quæ ab impedita  
 membranarum interna transpiratione redeundo  
 ad arterias sanguinales regreditur, ubi stasi fa-  
 cta aut restagnatione, ejusmodi, quam per con-  
 gestionem vocant, apostasin facit; inde vero in  
 venas eliquata, per renes in vesicam deponi-  
 tur. *Hecquet.*

Inter Auctores non constat, qualis locus hic  
 intelligatur; sed nullam partem huic loco ma-  
 gis convenientem invenire potui, quam omen-  
 tum, quod etiam pituita sæpe oppletur. Istud  
 enim sub diaphragmate locatum est & non sem-  
 per attingit fumen, quod pituita oppletum in  
 parte superiore ventris inferioris sub pectore  
 tumorem pituitosum & mollem format. Diu-  
 tissime

tissime hic hæere posse pituitam sine ullo dolore, & sine mutatione coloris in facie, aliquoties observavi, tandem vero sensim acriore facta pituita dolor generabatur. Quodsi cellulæ ruptis effundatur pituita, ascites formatur: si vero sensim magis increseat, ita premit adjacentia viscera, ut ad munera sua peragenda incapacia fiant, & ita lentam mortem inferant. Talem nunc collectionem pituitæ observavit Auctor curatam fuisse per urinam multam. Quod verum esse nos quoque experti sumus, etiamsi multi negent viam. Sed quando per venam epiploicam in venam portarum, & ita in venam cavam conceditur lymphæ transitus, nulla restat obscuritas viarum, per quas illa lympa antea collecta potuisset venire ad renes & ita nomine urinæ evacuari. Quia vero hanc novimus naturalem solutionem, arte hoc etiam tentandum est, ut primo resolventibus & fritionibus tentemus pituitæ stagnantis solutionem & propulsionem, atque dein per diuretica promoveamus eductionem. *Gorter.*



## APHOR. 55.

**Ο**κόσιζιν ἂν τὸ ἥπαρ ὕδατι πλησθῇ, οἷς τὸ ἐπίπλεον ραγῇ, τεταίσιιν ἢ κοιλίῃ ὕδατος ἐμπιπλάται, καὶ ἀποθνήσκουσιν.

**Q**uibus jecur aqua plenum in omentum eruperit, iis venter aqua impletur, & moriuntur.

**I**n membrana hepar vestiente ortæ hydatides seu vesiculæ aqua plenæ, ruptæ effundunt ichores in omentum, quod hepati & ventriculo superincumbit, & ab acrimonia eroditur ac corrumpitur, unde in abdominis cavum effusi liquores isti hydropem ascitem creant letalem, tum ab omenti erosione & exulceratione, tum ab adjacentibus visceribus eadem labe infectis. *Tozzi*. Quibus a jecore hydropes fiunt, his tussis & tussendi cupiditas inest, sed nihil effatu dignum exspuunt, pedesque intumescunt, ac venter non nisi dura ægreque egerit, & circa alvum tumores fiunt, qui partim dextra, partim sinistra parte oriuntur, & desinunt. *Hippocr. Prognost. n. 8. Coac. sect. 3. n. 278.*



APHOR.

## APHOR. 56.

Ἀλύκην, χέσμεν, Φρίκην, οἷον ἴσον ἴσῳ  
 πινόμενόν , λύει.

Anxietatem, oscitationem, horrorem, vinum æquali mensura aquæ temperatum epotum, solvit.

Extat hæc eadem sententia in *lib. 2. Epidem. sect. 6. n. 45.*

*Anxietas* sensus quidam est oppressionis sive gravitatis & prementis cujusdam rei circa præcordia, vel & ad hypochondria, cum respirationis difficultate, a quacunque causa, quæ liberæ sanguinis per pulmones circulationi ponit impedimentum. *Oscitatio* est respirationis illa species, quæ fit diducto ore & pendula maxilla inferiore, qua pulmones maximopere extenduntur, inspiraturque quam plurimum aëris lente & sensim, qui dein retentus aliquamdiu & rarefactus lente rursus & sensim expiratur. Vid. *Boerh. J. M. G. 638.* Excitari solet, quando perspirabili halitui exitus denegatus & sanguini per pulmones difficilis est fluxus: unde plerumque in febribus accessionis est signum, ac frequens accidit in lethargicis, somnolentis, & ventriculi impletionem. *Horror* seu sensus frigoris oritur a perspiratione impedita. Vid. Not. ad *5 aph. 17.* In hisce molestiis temperata cardiaca, quale est vinum aqua  
 tem-

temperatum, juvant, augendo oscillationes solidarum partium, hinc resolvendo obstructa, excitando perspirationem. Quidam anxii a potu vini aqua diluti statim levantur, aut dato vino Rhenano aqua temperato, cum adjecto succo citri. Alii multo melius curantur spirituosis aromaticis. Nonnulli liberantur vomitu, & alii iterum alvi fluxu, aut hæmorrhagia. Nimirum ex causa varia anxietatem inferente, diversa conferunt remedia. Quod si v. c. in ventriculo aliquid putrefactum hærens anxietatem infert, istud vino acescente dilutum, non amplius anxietatem inducit. Si autem bilis corrupta in ventriculum delata anxietatem induceret, magis conferret eam materiem vomitorio, vel purgante dato eliminare. Idem observandum est in oscitatione. Si stagnantes in ventriculo humores in spontaneam corruptionem abire incipiant, & frequentem oscitationem faciant, huiusmodi oscitationes egregie minuuntur potu vino diluto, quo simul ventriculi motus blande instigatur; sed inde non sequitur, omnem oscitationem hac potione curari. In horrore si bibendum detur vinum aqua dilutum & calefactum, id crudum & perspirabile retentum egregie diluitur, & per insensibilem perspirationem eliminatur, qua materia expulsa, cessat etiam illa causa irritans. *Gorter.*



APHOR.

APHOR. 57.

Ὅς οἰσιν ἐν τῇ ὑρήθρῃ φῦμα γίνεται,  
τεταπεινὸν διαπυήσαντ' καὶ ἐκκραγέντες,  
λύεται ὁ πόνος.

Quibus in urinaria fistula tuberculum  
innascitur, eo in pus verso & ru-  
pto, dolor solvitur.

Est hic idem aphorismus cum 4 aph. 82. &  
ibi expositus habetur.

APHOR. 58.

Ὅς οἰσιν δ' ἂν ὁ ἐγκέφαλος σεισῇ ὑπὸ  
πνὸς προφάσει, ἀνάγκη ἀφώνας γενέ-  
σθαι παρὰ χρόνον.

Quibus cerebrum commotum est ab  
aliqua causa externa, eos protinus  
voce deficere necesse est.

Ex hoc aphorismo colligitur id, quod a Ga-  
leno sæpius adnotatum est, Hippocratem  
per vocis privationem intelligere apoplecticos  
affectus, in quibus ægrotantes, non voce tan-  
tum, sed sensu, & motu privantur. Nam  
lib. 1. de morb. n. 3. eandem referens senten-  
tiam, quod in aphorismo ait, eos statim voce  
privari.

Vol. II.

Et

privari



privari necesse est, ibi inquit, eum, qui percussus est, necesse est e vestigio mutum fieri, & neque videre, neque audire. Conf. etiam *Coac. sect. 3. n. 370.* Cur vero ad cerebri concussionem hoc symptoma sequatur, ratio est, quia cerebro concussio spiritus animales in ejus sinibus contenti ex concussione agitantur, commoventurque ita, ut voluntatis imperio obedire non possint, unde eorum actione cessante, sensibus, & motu ægrotantem privari, necesse est: in quo statu persistunt, quo usque spiritus pristinam quietem consequantur: quod non longe postea evenit, nisi a concussione ventrigulorum cerebri compressio fiat, aut sanguine venula aliqua abrupta repleantur, unde vera apoplexia sequatur, quæ hominem e medio tollat. *Martian. p. 478. Conf. 7 aph. 14.*

## APHOR. 59.

Τοῖσι σώμασι πῶςιν ὑγρὰς τὰς σάρκας ἔχουσι  
δοῖ λιμὸν ἐμπιέειν· λιμὸς γὰρ ξηραίνει τὰ  
σώματα.

Corporibus humida carne præditis famem inducere convenit; fames siquidem corpora exsiccat.

Ergo corporibus laxis, leucophlegmaticis, & in morbis a feri abundantia, nec non obesius, qui macilentiores fieri cupiunt, conveniet tolerare famem: quæ apud Celsum l. 1. c. 3. p. 32. quoque inter exsiccantia refertur auxilia.

auxilia. Indicat fames indigentiam cibi. Ast vero in pabuli penuria natus calor humidum superfluum exorbet, cruditates coquit, & per inedias pituita in alimentum vertitur. *Laurent. de strum. l. 2. c. 9.* Quodsi in stagno, aut mari, aut fluminibus quis natere sibi videatur (per somnum), bonum non est, cum humiditatis exuperantiam indicet. huic autem victus ratio sicca & labores conferunt. *Hippocr. de insomn. n. 15.* Quibus morbis siccitas confert, semel die cibum capere conducit, ac cibos & potus pauciores quam ut repleti queant consumere, &c. *de affection. n. 41.* Tanta abstinentiæ & inediæ vis inest medicinalis, ut non modo in vitiis stomachi omnibus fere, in quibus eam *Celsus l. 4. c. 5.* commendat, colluviem crudorum humorum absumendo, calorem & tonum deficientem restituat, verum etiam copiam feri evacuando solidorum tonum intendat, totumque sanguinis circulum cum excretionibus promoveat; ac adeo iis adfectibus, qui ex nimia feri abundantia proveniunt, occurrat insignissime. *Hoffm. Med. rat. T. 4. P. 4. p. 167.*

*Sæpe potest morbi depellere corpore causas  
 Provida, legitimo tempore iussa, fames.  
 Percipe quid natura velit, cum debilis æger  
 Abstinet atque cibis non cupit esse satur,  
 Quam sit in exiguo victu præstabilis usus,  
 Pabula quid noceat plura vel ampla dari,  
 Quam noceat plenis sano quoque sanguine venis  
 Luxuries, quantum copia vasa gravet.*

Hebenstr. de Hom. p. 360.

## APHOR. 60.

**Ο**ἅν ἂν ὅλη τῇ σώματι μεταβολαί, καὶ πὶ  
 σῶμα καταψύχεται, καὶ πάλιν θερμαί-  
 νηται, ἢ χροῶμα ἔπρον ἐξ ἐπὶ μεταβάλλη, μὴ-  
 κτλ νύσθ σημαίνει.

**U**bi toto corpore mutationes, & cor-  
 pus universum perfrigeratur, rur-  
 susque incalescit, aut subinde colorem  
 commutat, morbi longitudo denuncia-  
 tur.

**S**cripta & explicata est hæc sententia supra  
 4 aph. 40.



APHOR.

## APHOR. 61.

**Ι**δρὼς πολὺς, θερμὸς ἢ ψυχρὸς, ῥέων αἰετῶς  
σημαίνει ἔχειν πλεγμαμένην ὑγροῦ. ἀπαγγεῖν οὖν  
χερῶν, τῷ μὲν ισχυρῷ, ἀνωθεν, τῷ δὲ ἀσθενεῖ,  
κάτωθεν.

**S**udor multus, calidus aut frigidus,  
semper fluens, humoris copiam in-  
esse significat. Hæc igitur robusto qui-  
dem superne, debili vero inferne de-  
ducenda.

**E**xpositus hujus aphorismi sensus habetur in  
dictis ad 4 aph. 41 & 42.

## APHOR. 62.

**Ο**ἱ πυρετοὶ οἱ μὴ διαλείποντες, ἢν ισχυρότε-  
ροι διὰ τρίτης γίνονται, ἐπικίνδυνοι. ὅτῳ δ'  
ἀν τρόπῳ διαλείπωσι, σημαίνει ὅτι ἀκίνδυνοι.

**F**ebres non intermittentes si tertio  
die vehementiores evadant, peri-  
culo obnoxia. Quoquo autem modo  
intermiserint, periculum abesse indicat.

**H**ic aphorismus reperitur superius 4 aph. 43.  
E • 3 APHOR.

## APHOR. 63.

**Ο**ἵκοισι πυρετὶ μακροῖ, τέπεισιν ἢ φύμα-  
τι, ἢ ἐς τὰ ἄρθρα πόνοι ἐγγίγονται.

**Q**uos febres longæ exercent, iis vel  
tubercula, vel in articulis dolores  
innascuntur.

**S**ententiam hanc quoque habuimus, 4 aph.  
44.

## APHOR. 64.

**Ο**ἵκοισι φύματα μακρὰ, ἢ ἐς τὰ ἄρθρα  
πόνοι ἐκ πυρετῆ γίνονται, οὗτοι σιτήσι  
ωλείοι χρέονται.

**Q**uibus tubercula diutina, aut in ar-  
ticulis dolores ex febre fiunt, ii  
copiosioribus cibis utuntur.

**V**ide explicationem ad 4 aph. 45.



APHOR.

## APHOR. 65.

Ἡ πρὸς τῷ πυρέσσοντι τροφῇ διδῶ, τῇ μὲν  
ὕγιαίνοντι ἰσχύς, τῇ δὲ κάμνοντι νῆσθαι.

**S**i febricitanti quis cibum exhibuerit,  
convalescenti quidem robur, ægro-  
tanti vero morbus.

**P**er cibum non intelligit Hippocrates omne  
genus alimenti, quod consistit in cibo, in  
sorbitionibus, & in potu: quasi alimentum fe-  
brienti dare prohibeat, quia tantum abest, ut  
hoc Hippocraticæ doctrinæ conveniat, ut ei  
potius adversetur, & ideo inedia, tanquam  
febri inimicam damnavit *l. 6. Epid. sect. 3. n. 55.*  
in hoc Prodicum reprehendens; sed de solidis  
tantummodo cibariis intelligit, & quæ proprie  
cibi dicuntur, quos febricitantibus ubique dam-  
navit, potissimum vero *lib. de loc. in hom. n. 39.*  
per hæc verba, *febrienti cibum ne offeras*, quos  
tamen in febris intermissione permittit, unde  
*lib. de affect. n. 14.* legimus, *si vero febrilis calor*  
*apprehenderit, & dimiserit, gravitas autem corporis*  
*ipsum detinuerit, hunc quidem quam diu febris tenuerit,*  
*sorbitionibus, ac potionibus curato, quum autem*  
*non tenuerit, etiam cibos dato.* Quare & in hoc  
aphorismo cibos tantummodo solidos prohibet  
febricitantibus; cujus quidem rationem satis  
longo sermone attulit *lib. de Vet. Med. n. 13.*  
concludens, ægrotantes plus lædi a diætâ sa-  
norum, quam sanos a cibis, quibus bruta ve-

E e 4

scuntur.

scuntur. Cum igitur contextus verba, in proprium sensum recepta, sententiam reddant veram, & penitus rationabilem, non est, ut eam ob locutionis modum ab Hippocraticis sententiis excludamus, quod expositores Galenum secuti communiter faciunt, quandoquidem exactam locutionis proprietatem non affectasse Hippocratem novimus a communi vulgarium regionis usu compulsus, cujus causa soloecismos in dictis Hippocratis etiam Galenus concessit. Aphorismi igitur sensus erit: Si quis febrienti cibum solidum exhibeat, is sciat ægroto tantum augmenti morbi præstare, quantum roboris cibis sano afferre solet. *Martian. p. 478. Conf. 1 aph. 16. item 2 aph. 10 & 17.*

### APHOR. 66.

Τὰ διὰ τῆς κύστις διαχωρέοντα ἔργον δὲ, εἰ οἷα τοῖς ὑγαινέσιν ὑποχωρεῖται. τὰ ἥκιστα ἔν ὁμοίᾳ τῶσιν, ταῦτα νοσηδέστερα. τὰ δὲ ὁμοίᾳ τοῖσιν ὑγαινέσιν, ἥκιστα νοσηρά.

Quæ per vesicam excernuntur spectare oportet, an qualia sanis subeunt. Quæ his minime sunt similia, ea morbosiora. Quæ vero sanis similia, minime morbosa.

URINÆ INSPECTIO Medico valde necessaria & insignissimi in praxi medica usus est. *Hoffm. Med. rat. T. 1. p. 219.* Et enim declaraturina sanguinis indolem, impetum, symptomata;

nata; morbi statum & coëstionis; statum secretionis & crisis; morbos renum, ureterum, vesicæ, testium quodammodo, vasorum deferentium, vesicularum seminalium, prostaticarum, glandularum Cowperi, urethræ; aliquas ægritudines in bile natas. *Boerh. J. M. §. 1017. Conf. Duret. in Coac. p. 489 sq.* Ast nihil ex inspecta urina conjici potest de statu hominis, ægerne sit, an sanus is, cujus urinam inspicimus, siquidem æger, quo ægrotet morbi genere, quanto tempore ægrotaturus sit, & quo exitu delinere debeat morbus, nisi ante notum fuerit, quomodo se habere debeat urina in statu naturali; comparantes enim naturalem habitudinem urinarum cum illa, quæ nobis offertur, cum per occasionem urinam aliquam inspicimus, & deprehendentes in quibus affectionibus utræque differant, satis tuto arguere ratiocinando possumus, quid immutatum sit in corpore illius, cujus urina observatur. *Bellin. de urin. &c. p. 1.*

Est Urina humor aquosus, & salsus plus minus, sive serosus juxta alios, a sanguine arterioso per emulgentia vasa in renibus secretus, qui dein per ureteres deducitur ad vesicam, & ex hac per urethram extra corpus mittitur. Est vero urina adeo multiplex, ut distinguenda sit prius quam de ejus indole dici vera queant. Namque a copioso, aquoso, potu fit cruda, copiosa, lenis, insipida, inodora, vix colore prædita, aquea, facile retinenda. Sed quæ redditur a chylo jam facta est magis cocta, parrior, acrior, salsa, parum foetens, colore diluto pallidi sulphuris, plus urgens. Illa iterum, quæ chylo jam in serum verso habetur, colore straminis, vel rubicundior, coctior, longe parrior,



parcior, falsior, foetidior, acrior, valde stimulan-  
 s, adeoque diu retineri non potens. Tandem vero hæc,  
 quæ post diuturnam a cibo, potuque abstinentiam,  
 ex humoribus valde & diu attritis, ut & ex deterfis  
 solidis partibus oritur, hæc demum paucissima,  
 acerrima, falsissima, foetida, ruberrima, vix  
 retinenda, & putrefactæ proxima, deprehenditur. *Boerb. 7. M. 6. 369-372.* Enimvero triplex est omnis  
 urinæ materia; una quidem de cruditate rerum  
 earum quæ assumuntur; altera de liquore sero-  
 so eorum qui sunt in venis humorum; tertia de  
 humoribus atque corporibus quæ liquuntur.  
 Atque hæc triplex consideratio in urina, his  
 verbis expressa est ab Hippocrate *lib. 6. Epidem. sect. 5. n. 30. urina concolor cibo & potui;  
 tum qualis esse solet; item cum humidum colliquatio est.*  
*Vid. Duret. l. c. p. 490.* Color urinæ quam ma-  
 xime particulis sulphureis invicem commixtis  
 debetur, unde quo major horum ingredientium  
 in urina est quantitas, ut in febricitantibus, scor-  
 buticis & qui in iis parum bibunt, eo color  
 est saturator. Quo major in corpore calor  
 est, eo saturator urinæ est. *Hoffm. l. c. p. 215.*  
 Tingitur etiam varie urinæ ab ingestis, v. c.  
 rhabarbaro, cassia fistula, beta rubra, rubia  
 tinctorum. Ad urinæ colores pertinet *circulus*  
 seu *corona* dicta urinæ, de qua multa dicunt.  
*Vid. Barthol. H. A. Cent. 4. bist. 26. Eph. N. C. D. 1. a. 3. o. 188. D. 3. a. 5. o. 150.* Corona  
 autem illa nihil aliud est, quam extremus lim-  
 bus summæ urinæ, qui superficiem matulæ  
 contingit: circumferentia hæc summæ urinæ  
 pro diversitate urinarum, diversitate vitri, &  
 crassitie, ex qua constat matula, positu lumi-  
 nis, & oculi dum inspicitur, diversimode co-  
 lorata,

lorata, & elegantissimis coloribus instar iridis apparet, unde sibi nomen coronæ meruit, & mirum est, quot ea super ridicule, & inepto fabulentur, & prædici posse asserant viri cæteroquin etiam doctissimi, cum re ipsa coronæ illæ nihil sint, nisi quiddam prorsus inane a varia luminis fractione per vitrum, & summum illud urinæ velum proveniens, nihil significans, & nihil solidi in se continens. *Bellin. p. 23.*

Præterea lotium sani hominis in eo ipso, & in aliis illi comparatis, varium est. Namque 1. urina infantum esse solet aquosa pellucida, cruda; puerorum crassa & coloris spicei, ob nutrimenti copiam, & voracitatem; juvenum urinæ tenuiores, magis coloratæ & paucioribus contentis præditæ; senum lotium apparet album, tenue, & nonnunquam sine contentis. 2. Mulierum urinæ crassiores sunt & cum copiosiori sedimento; sed virorum urina contrario modo se habet. 3. Sanguineorum urina ordinarie dilute citrina, larga copia redditur, & sedimentum albicans, paucum & mobile demittit; cholericeorum flava, aurea & sæpè rutilans est, cum pauca hypostasi, interdum nulla, aut tantum nubecula, quantitate autem sanguineorum urinam non æquat; melancholicorum ex aurantio & spiceo colore mixta, crassior parciorque effluit ac parum sedimenti habet; phlegmaticorum colorem ex albo & spiceo confusum refert, sufficientique copia excernitur, sedimentum autem submucidum demittit. 4. In regionibus calidioribus urinæ adparent tenuiores, magis coloratæ, cum pauciore sedimento, quam in frigidis. 5. Tenui victu utentium urina nullam habet hypostasin; contra eorum, qui liberalius vivunt. 6. A  
motu

motu corporis crassa & turbida magis urina est, quam quæ sub quiete emittitur. 7. Somnus efficit, ut urina largius emittatur, crassiorque adpareat; in vigiliis urina tenuis, diaphana, sæpe rutilans & pauca. 8. Ab affectibus animi variat: nam ira urinas intense coloratas & rubicundas efficit; in metu contra & tristitia urinæ fiunt tenues, crudæ, decolores, cum paucis sedimentis. 9. Ab excretis aliis: ubi multum sudatur, aut diarrhœa continuat, ibi parum mingitur; & vice versa. 10. Ratione temporum anni: sub initium veris urinæ reddi solent largæ, albæ, subspiceæ & plurium contentorum, in progressu ad colorem subrufum aut subcroceum & pauciora contenta fit transitus: urinæ æstivæ substantiæ sunt tenuioris, coloris subaurei, & hypostasim habent albam, lævem, æqualem; in æstus autem vigore fiunt tenues, aureæ, crocæ, paucae, cum hypostasi parciore & in album declinante: autumnus incipiens ad mediocritatem urinas quovis respectu redigit; verum adultus factus magis notabiles inducit consistentiæ & coloris mutationes: hiberno tempore ferme omnium in urina mutationum specimina videre licet, ob tempestatis, regiminis, vitæ generis, temperamentorum ac vitiorum in diætâ varietatem atque frequentiam. *Juncker Pathol. p. 448. 463.*

Ex dictis consequitur in urina examinanda ad usum medicum pro diagnosi vel prognosi considerari debere copiam, consistentiam seu fluiditatem, colorem, odorem, saporem, & contenta illi inhærentia. *Contentorum*, ὑφιστάμενων; communiter triplex statuitur differentia. *Hypostasis*, *sedimentum*, *subsidentia*, ὑπόστασις, appellatur contentum illud, quod in urinæ fundo residet. Quod in medio natat, *suspensum*, *appendiculum*, ἐναιώχημα,

Νεφελώματα, dicitur: quod tandem in superficie, sive sublimiori ejus parte continetur, *Nubecula, nebula*, νεφέλη, vocatur.

*In summo est Nubes, subsidit Hypostasis imo,  
Ast Enæorema permanet in medio.*

Etsi vero hæc distinctio nominum proprietati accommodatur, ab Hippocratis tamen doctrina plurimum recedit, qui de nubecula modo superiora, modo inferiora urinæ petente, mentionem facit, ut clare patet *lib. Prognost. n. 12.* ubi hæc leguntur: *Considerare vero convenit in urinis, in quibus nubeculæ sunt, an supernæ, an infernæ sint: Et quales habeant colores; Et quæ quidem deorsum feruntur cum coloribus relatis, eas bonas esse putare, ac laudare, quæ vero sursum feruntur, &c.* Idem attestatur *lib. Coac. sect. 5. n. 9.* dum inquit: *Nubeculæ in urinis, albæ quidem, Et infernæ commodæ sunt, &c.* Enæoremata pariter, & sublimia, & non sublimia, sed fundum petentia adnotavit in ægris Epidemiorum, potissimum vero in Herophonte, & in virgine Larissæa, ut satis constat, differentiam contentorum urinæ ex loco desumptam non esse ad mentem Præceptoris; qui longe diversam inter ipsamet differentiam facere videtur. Quam difficultatem cum viderit Galenus dixit: „ Sed ali-  
„ cubi ipse (Hippocrates scilicet) sublimamen-  
„ tum genituræ simile dixit, ita ut e duobus  
„ alterum sit, aut ut generalioris rei nomen  
„ existat sublimamentum, sectionem haben-  
„ tis in nubeculam, & id, quod genituræ si-  
„ mile est, aut ut nunquam nubecula ab eo su-  
„ blimamentum nominetur”. Hæc Galenus  
contra Hippocratis opinionem, qui credidit,  
hæc

hæc duo nomina, nubecula & enæorema, apud Hippocratem confundi, ea permotus conjectura, quia in quibus libris hoc contentum enæorema vocat, de nubecula nunquam mentionem facit, e contra vero ubi de nubecula fit mentio, enæorema ne quidem nominetur. Opinio quidem satis probabilis, nequaquam tamen vera. Nam præterquam quod falsum est, nullibi de utroque contento fieri mentionem, quando *Coac. sect. 5. n. 50 sq* hæc leguntur: *At in febribus erroneis nigra nubecula quartanam indicant, decolores autem* (scilicet urinæ) *μίλαςιν ἐναιωρούμενα*, id est *nigris suspensa*, h. e. habentes suspensa, seu enæoremata nigra cum vigiliis, & turbatione, phreniticæ, certum est in nubeculis optimis duas tantummodo requiri conditiones a Præceptore *Prognost. l. c.* ut albæ sint, & infernæ. Si ergo nubecula, & enæorema unum & idem significarent, enæorema dispersum optimum esset, dum modo album in urinæ fundo resideret, quod Hippocrati & experientiæ omnino repugnat: contenti enim unio ad concoctionem necessaria est. Quare ego dicerem per nubeculam intelligere Hippocratem contentum æquale secundum totam ejus substantiam simul cohærens, & in externa superficie læve, instar nubis cælo sereno vagantis, unde nubeculæ nomen sortitum est, quæ modo sursum, modo deorsum per urinam fertur, modo in medio ejus pendet. Enæorema vero dicitur illud, quod nubeculæ aliqua ex parte simile est: ab ea tamen, & figura, & substantiæ modo differens. Namque nubeculæ unica est tantummodo figura, & unus substantiæ modus; quæ duo in enæoremate varia sunt. Hinc est, quod apud Hip-

Hipp.

Hippocratem non legimus, nubeculæ tribui eas qualitates, quæ ad figuram, & substantiæ modum spectant, cujusmodi est, rotundum, glomeratum, planum, indiscretum, divulsum, compactum, tenue, rarum, densum, & similia; quæ enæoremati ubique tribuuntur, quasi si hæc de nubecula dicerentur, non nubecula, sed enæorema vocari deberet; quando nubecularum diversitas penes colorem, & locum, in quo remanet, tantummodo consideratur: unde nubeculam dicimus hanc rubram, illam albam, aut nigram, modo sublimem, modo subsistentem, modo in medio urinæ pendentem. Hæc est ergo, ni fallor, horum duorum contentorum apud Præceptorem differentia, ut ex ipsius doctrina colligere licet, quam etiam apertis verbis nobis indicavit *lib. 4. Epidem. n. 6.* dum inquit, enæorema nubeculæ aliquantulum nigræ crassitudinem quandam habere; quasi hæc sit peculiaris nubeculæ essentia, quæ mediocrem crassitudinem necessario habet. Hujusmodi vero nubeculæ raro in urinis observantur, ut mirum non sit, si in recensendis Epidemiorum historiis nubeculæ nulla mentio fiat: apparent tamen aliquando, & ægrotantes omnes, in quibus hæc observata sunt, cito, & fideliter judicati sunt. *Hypostasin* denique vocare consuevit Hippocrates contentum illud, quod in urinæ fundo perpetuo residet; verum tamen non omne, quod in fundo subsidet, hypostasis dicenda est, quando & nubeculam, & enæorema petere fundum aliquando diximus: sed quod aliorum respectu gravius est, ex quo fundum petat, non modo secundum partem, sed etiam secundum totum depressam habens formam, quam omnes liquidorum

dorum subsidentiae habent, juxta quam a nubecula, & enæoremate fundum petentibus distinguuntur, quæ formam habent aliqua ex parte elevatam. Quare quod inquirunt posteriores optimam hypostasim debere esse formæ pyramidalis, nomine abutuntur; quia hæc non est veræ hypostasis forma, sed potius enæorematis, aut nubeculæ, & sæpius in sanorum urinis conspicitur, quam ægrotantium; signumque est concoctionis alimentorum ingestorum potius, quam materiæ morbificæ, a quibus Medici sæpe decepti salutem proximam ægrotantibus prædicunt, quorum nonnulli ex eodem morbo intereunt, alii diutius ægrotant. *Martian. p. 323.* Hypostasis est quædam substantia excrementitia, cujus est puri analogæ generatio, posita inter illud atque humores naturæ dicatos nutriendi causa: quod scilicet quicquid de succo alibili virtutem naturæ effugit in sanguinis confectione, id in urina residit. Est autem ejusmodi, neque a natura similiter mutatum ut sanguis, neque, similiter ut pus, in sui confectione particeps alicujus causæ contra naturam. Illa vero hypostasis est fidæ salutis, quæ numeros omnes explet bonæ materiæ, loci, & situs. Ac primum quidem, alba materia bonitatem succi ostendit qui vim effugit naturæ in sanguinis confectione, qui est pepasmi capax, & jam nunc particeps. Eadem quoque denunciat integritatem partium solidarum, similiter colorata ut illæ quæ sunt natura albæ; proptereaque fundunt naturaliter excrementa colore similia subjectæ substantiæ; ut semen, pus, & hypostasim albam. Sed opportunitas loci, quem occupat hypostasis, i. e. urinæ fundum, ut

cer-

certum est argumentum caloris nativi, quo τὰ ὁμογεγῆ congregantur, & suo quæque loco apparent: ita pepasmi perfectionem ostendit, cum cruditatis vacuitate ac spiritus flatulenti: quo duce τὰ ὑφιστάμενα, quæ sunt graviora urinis, in iis volitant velut nubila. Tum lævitas hypostaseos, & ipsa æqualitas maximum signum exhibet situs inprimis expetendi, ex eo quod magna vis lucet nativi caloris in suo subiecto naturaliter constituto, quod suo dominatu sic tenet, imperioque regit, ut nihil illius intactum relinquat, & in quamcunque partem æqualiter se insinuet. *Duret. in Coac. p. 492.*

Sedimenta, suspensiones, & nubeculæ nihil aliud sunt, quam magis liberæ, & duræ urinæ partes, quæ cessante motu agitationis, qua perpetuo jactantur in sanguine, ad suum locum insito motu feruntur, & siquidem gravissimæ sint, fundum vasis petunt, & sedimenta nuncupantur; si minus graves, medium; si adhuc leviores, summum urinæ ascendant. *Bellin. de urin. &c. p. 12.* Quoniam urina naturalis potest quidem etiam nubeculam, suspensionemque continere, sed illud præcipue, saltem ut plurimum continet, quod sedimentum dicitur album, læve & æquale, & ultra hæc nihil aliud continere debet; illa igitur omnis urina dicitur ratione contentorum non naturalis, quæ primo nubeculam, & suspensiones nunquam continet, secundo sedimentum, vel nunquam, vel non album, non læve, non æquale, sed cujuslibet alius coloris, superficie interrupta, suisque partibus inæqualiter crassis, vel plane subsidens in fundo vasis: tertio, quæ alia quælibet contineat. Urina sine nubeculis, & suspensionibus, aut care-

Vol. II.

Ff

bit



bit iis partibus, quæ cessantibus motibus cum sanguine conceptis simul coeunt, ubi ipsorum major, aut minor gravitas permittit, vel eadem ita cohærebunt reliquis urinæ partibus, ut sejungi per suos motus, niscusque non possint. Similiter se habebit necessitas urinarum, quæ sedimentis carent. Quodsi sedimenta demittant diversorum colorum a naturali, illi non aliunde proveniunt, quam ab iisdem causis, quibus urina tota coloratur, imo vero non raro contingit, ut sedimento deposito urina evadat decolor, & quasi aquea pellucida, eodem interim perseverante colore in sedimento, quo urina universa colorabatur. Inæqualitas superficiei, & asperitas proveniat oportet a diversa gravitate, seu densitate partium totum sedimentum constituentium; æque densæ etenim, sive æque graves ad eandem altitudinem quiescant intra liquida oportet, ut ex eorum doctrina certum est: subsidens autem ex toto, & sese extendens per superficiem imi vasis nihil assurgendo, necessario pendet a maxima gravitate & densitate, qua præceps per liquidum ad fundum truditur. Quoniam vero terra, sal, & aqua urinam constituunt, si igitur præter naturam ita se habeat, ut quiescentibus motibus a sanguine conceptis sola terra secerni possit, fiet sedimentum arenosum; si terra, & sal, ita ut possit subire colorem nigrum &c. colores omnes suscipiet: si vero insuper admisti sint præter naturam humores visciidi, qui sal, ac terram comprehendere possint, & in quiddam simile squamulis, parvis foliis, ramentis furfuris, & hujusmodi compingere, sedimenta erunt foliacea, furfuracea, squamosa & his similia, quæ contingere etiam po-

poterunt, si scabiei aliquid, vel quidlibet pustulosum cum lævi crusta in renibus, ureteribus, aut vesica contineatur; abradet enim urina, & secum auferet ramenta crustarum, quæ cessante impetu imum vasis petunt. Ab eadem origine humorum, nempe viscidorum, pendent sedimenta membranosa; neque enim membranæ sedimentorum sunt aliud, quam majores squamulæ. Sicut etiam a non absimili causa produci possunt longa, & rotunda, exiliaque pilorum instar corpora, imo cujuslibet alius figuræ composita, quæ per urinam excernantur, unde qui dicuntur pili redditi per urinam ab auctoribus, non veri pili, sed pilis quædam similia fuerunt. Denique in urina præter naturam contineri possunt, quæcunque fluunt cum sanguine, & in renibus cum urina secerni, vel eidem separata admisceri possunt, aliunde venientia per exsudationem ex vasis, aut rupturam, aut extensionem eorundem, unde sanguis, pituita, bilis utraque, semen, pus, humores quilibet non naturales cujuscunque coloris, vermes, calculi, frustra cujuscunque materiæ in corpore præter naturam genitæ, deglutitæ, vel impactæ reddi poterunt, per urinam a renibus derivata, eademque omnia reddi poterunt, per urinam a renibus derivata, eademque omnia reddi poterunt, si urinæ admisceantur in ureteribus, vesica, aut urethra, ut patet. *ibid.* p. 21. Obvium jam est intelligere, quid arguat ipsum urinæ corpus ratione partium, & separationum, ex quibus urinam componentia deducuntur; quemadmodum enim materia contentorum arguit humores peccantes solutos esse, vel crudos fluere, vel hære in partibus corporis, ita prout ma-

jor erit, aut minor quantitas liquidi urinam componentis, vel partium durarum, si utraque cum quantitate naturali urinæ, & inter se conferantur, indicium, vel solum liquidum, vel solum durum, vel utrumque hæere uni, aut pluribus, aut omnibus partibus corporis; si alterutrius, aut utriusque quantitas sit naturali minor; vel solvi naturalem partium omnium, aut alicujus humorem, vel durum, vel utrumque, si alterutrius, aut utriusque quantitas reddatur naturali major. Facile autem ex diversitate colorum intelligemus, quando major liquidi, quam duri quantitas, vel major duri, quam liquidi in urina contineatur; cum eo minor sit liquidi quantitas, quo color est magis satur, supposita etiam naturali quantitate duri, major, cum est magis dilutus color in naturali quantitate duri: vel e converso duri quantitas naturali major in naturali quantitate liquidi tunc erit, cum color erit magis satur, minor cum dilutior in quantitate liquidi pariter naturali. *ibid.* p. 28. Nimirum coctionis notæ, quæ urinam faciunt meliorem, aut deteriore, a triplici urinæ parte desumuntur, ab ejus substantia, colore, & contento. Per substantiam intelligo crassitiem, & tenuitatem, quæ tantum ad coctionem, & cruditatem judicandam faciunt, ut sola tenuitas cruditatem attestari possit: cum nullibi crudam urinam dixerit Hippocrates quæ tenuis non fuerit. Cum igitur urina coctionis signum præ se ferre incipit, primum color mutatur: coctione vero ulterius progrediente mutatur substantia, & tandem contentum, quare urina, quo pluribus horum participat, eo melior censenda est. Et ideo forte melior erit urina, quæ sit  
boni

boni coloris, cum contento mediocris bonitatis, quam ea, cui bonus color deficiat, etiam si contentum habeat optimum, vel saltem bonitate non erit ei inferior. Unde urina boni coloris, nempe subruffa cum nubecula subrubra, æqualis bonitatis erit cum subrubra, sedimentum subrubrum habente. Nam quod bonitatis detrahit nubecula respectu sedimenti, id coloris bonitate reparatur. *Martiam. p. 604.*

Si nulla sit coctio, nullum est in urina sedimentum: &, si perfectissima sit coctio, ut in sanis exquisita victus ratione utentibus, etiam nulla fere est hypostasis; quia totum alimentum perfecte assimilatur, nec aliquid ejus in pus vel fæcem degenerat. Unde, licet fæx illa concoctionis perfectionem in morbis indicet: vere tamen, si rem totam consideres, non est integra coctio materiæ, ex qua fit hypostasis; sicut materia transiens in pus, non ita perfecte concoquitur, sicut quæ assimilatur. Hac ratione in pueris & voracibus sedimentum apparet copiosius, quam in iis qui exquisito victu utentes, quicquid est familiare, perfecte assimilant. sicut & urina plus habet sedimenti tempore concoctionis sanguinis, quam postea. Cæterum, quò quo modo se habeat, copiosa subsidencia a valida sit virtute. nam multum evincitur alimenti, a quo multa secernitur hypostasis: etiamsi ea ipsa non fuit perfecte assimilata, sed fuit velut cruda veri alimenti pars. *Mich. Villan. de syrup. fol. 41.* Urina in homine temperamenti undeque moderati optima, quæ subrussi subflavive coloris sit, subsidensque album, læve & æquale appareat, ad hancque veluti amussim quandam positam directæ probantur urinæ, quascunque

in humanæ speciei latitudine spectamus. Humorum cruditatem indicant urinæ substantiæ tenues: quandoque vero etiam propter obstructions tales apparent, quod quasi percolentur. Ita crassiores, uti naturam humorum jam concoctionem aggressam fuisse, sic nondum eos confecisse ostendunt, hosque ideo etiamnum turgere. Præstat ut, postquam redditæ fuerint, perturbentur statim, potius quam aliquamdiu fluidæ persistent. Colores in his qui ad albedinem tendunt, innati caloris defectum demonstrant: ideoque humorum imperfectam concoctionem, ac quo magis urinæ a colorum symmetria evariarint, eo sane magis a sanitate distant, quæ temperamentum sequitur proportionem respondens. Quæcunque colore magis infectæ visuntur, pro superiorum proportionem ad calidius vergunt. *Aëtuar. de spir. p. 104.* Urina tenuis aut redditur & manet tenuis; aut mingitur tenuis & perturbatur ac crassa fit. Et quidem prior est summe cruda; perturbata vero ac crassior facta coctionem inceptam declarat. Eodem modo & crassa aut funditur spissa & manet ita; vel fluit crassa, subsidens vero tenuis evadit: & quidem illa perturbationem humorum validam in corpore factam ostendit; hæc vero tum sedari perturbationem, tum sanguificationis concoctionem excitari declarat. *Theoph. de urin. cap. 4.* Lottum optimum est, quando sedimentum album fuerit, & læve, & æquale omni tempore, consistentia mediocri, colore aureum, aut subaureum, flavedinis etiam alicujus participes. *ibid. c. 10.* Si sedimentum album quidem fuerit, locum autem mutet, ut sit in medio, *ιν μέσῳ* vocatur ab *ἐν μέσῳ*, quod est  
pen-

*pendere.* Hoc si læve sit & æquale, mediocriter coctum est. non enim valuit natura digerere, ut locum infimum occuparet. Si autem idem supra mediam regionem apparet, superficiem superiorem occupans, dicitur *nubes*, quæ significat naturam adhuc minus digerere, *ibid. c. 12.* Ita ut Enæorema sit imperfectior hypostasis: nam materiâ a natura perfecte coctâ oritur hypostasis, imperfecte vero enæorema & nubes. Enæorema magis coctum quam nubes existit. Ergo ubi sanguis crudus plane est, tenuis aquosæque urina excernitur, nihil nec quod subsideat, nec quod pendeat, in se habens. At vero concoctus ubi ille est, hæc in urina apparent, atque etiam nubeculæ quædam desuper tenues superstant, veluti quæ in summo lacte colligitur, & quæ in summo refrigerati jusculi concrevit. Quod si turbida sit, qualis veterinorum visitur, crudis vocatis humoribus refertas quidem venas indicabit, non tamen cessare naturam, sed eos valenter concoquere. Si vero celeris separatio crassi a liquido cernitur, sitque, quod subsidit, album, læve & æquale omni tempore, i. e. per dies complusculos idem permanens, jam-jam separaturam eos omnes naturam indicabit. Sin quum emingitur, pura sit, protinus vero turbetur, jam crudi succi concoctionem aggredi naturam docet. At si interposito tempore turbetur, non protinus, sed post aggressuram insinuat. Verum omnium quæ turbantur urinarum generalis nota esto ipsius crassi a liquidiori separatio, aut propere aut tarde facta, aut omnino nulla. Ergo si protinus fiat &, quod subsidit, sit album, læve & æquale, superiorem longe naturam succis, quos concoquit, ostendit. Sin bonum sit quod sub-

P f 4

sidit,

fidit, sed quod post longius interpositum tempus colligatur, etiam naturam temporis spatio superaturam succos nunciat. Si vero vel omnino nulla separatio, vel illud, quod subsidit, malum sit, imbecillitas naturæ significatur, egetque ope aliqua ad succos percoquendos. *Galen. de sanit. tuend. l. 4. c. 4.* Urina optima est, in qua per omne tempus, quoad morbus judicatus fuerit, subsidet album, læve, & æquale. Securitatem enim brevemque morbum fore significat. Quod si intermittat, & interdum quidem pura mejatur, interdum etiam subsidet album & læve, diuturnior & minus securus morbus evadit. At urina subrubra, simileque quod subsidet, & læve, hæc longe quidem diuturnior quam prima sit, valde tamen salutaris. *Hippocr. Prognost. n. 11.*

Ex adductis auctorum edictis (iisque cumulat, ut pateat concinens omnis ævi experientia & observatio cum posterioris ætatis experimentis & inde desumptis physico-mechanicis naturæ interpretationibus) constare potest, quam observatu necessaria sit Medico clinico doctrina aphorismi præsentis, & ad quam normam iudicium ferre debeat de urinis morbo-  
sis; ac insuper, quod dicta, quæ cognoscuntur, aut prædicuntur ex urina, certis nitantur fundamentis, nec fere fallant, si alia signa simul advocentur, corporis præsentem statum edocentia: tametsi sint multa alia, quæ uromantæ ex inspecta sola conjiciunt urina ac edicunt, admodum incerta, & ridicula fere; hypocritæ nempe homines, qui de lotio certam scientiam profitentur graviditatis quæ in conspectu non est, tum etiam sexus & partus futuri; quæ ostentatio soboles ignorantiae, fundamentum aliud nullum habet quam aucupandi

di lucri & inanis gloriæ cupiditatem. Vld. *Duzet. in Coac. p. 491.* Enimvero multi sunt morbi, quorum in urinis nec vola quidem observari potest, nec vestigium. Quare morbi, quorum causa aut indicia in vasis sanguiferis, aut meatibus urinariis, minime continentur, ex urinæ inspectione cognosci non possunt. Morbi tales sunt: tumores, luxationes, fracturæ, ulcera, & alii externi, uti malæ conformationis; phthisis; lues venerea; epilepsia; arthritis, omnesque fere morbi chronici. In acutis quidem, num affectus febris sit conjunctus, nec ne, urina interdum potest ostendere; quinam vero sit affectus, sive pleuritis, peripneumonia, angina &c. aut qualis ista febris sit, an continua, an intermittentes &c. ex nuda *apostasi* sciri non potest. Phrenitidem adesse vulgo colligitur, quando urina est magis limpida, & solito albidior, bile nimirum (ut dicunt) ad cerebrum rapta, unde oritur phrenitis. Sed cur de phrenitide potius, quam de *apostasi*, diabete, renum calculo, aut obstructione aliqua in visceribus conjicitur, quum similis urina in omnibus hisce affectibus, & quibusdam aliis, reddi soleat? Imo alicujus morbi indicium esse necessario non sequitur, quum istiusmodi urinas post pleniorē potationem statim mistas passim cernamus. Neque ex urinis aut hoc, aut aliud ullum veneni genus deprehendi potest. Quidam morbis periculosissimis detenti, in ipsius mortis confinio constituti, urinas nihilominus reddunt laudabiles, & nihil, aut parum a sanorum discrepantes. Sic in febribus malignis, pestilentibus, & ipsa peste, urinæ plurimorum, quorum etiam fores pulsat mors, parum ab iis,

Ff 5

quæ



in statu sano minguntur, alteratæ observantur. Urinæ pessimæ, quas deploratas pronunciant, interdum quidem non solum ne tantillum periculi in se continent, sed haud raro ad salutem, potius quam ad mortem, faciunt. Ita excretiones criticæ, nigræ licet, salutare sunt, & febribus quartanis, lienis affectibus, menstruorum aut hæmorrhoidum suppressionibus laborantibus familiares esse solent. Imo quosdam legimus nullo morbo affictos tales reddidisse. Præcipuus ~~us~~ <sup>usus</sup> ~~us~~ <sup>usus</sup> erit in observandis morbi cujusvis statu & progressu, nec non alterationibus versus salutem aut mortem. Etenim in affectionibus chronicis, ex urina quotidie inspecta, Medico innotescat, quibus gradibus ægritudo in dies accrescat; quo tempore remedia purgantia, aut alterantia, erunt magis opportuna, qualia medicamenta sint maxime proficua: hinc observare est, an natura morbo prævaleat, nec ne; certissimum hinc prognosticum elicitur de spe aut periculo convalescentiæ, prout nimirum coctionis aut cruditatis signa in urinis apparent. In morbis acutis hinc status & ~~dup~~ <sup>dup</sup> febris optime prænotatur, quo tempore, & quo successu, speratur; quando evacuationibus, & quando cardiacis tempestive insistendum est. *Guidot. in Proleg. ad Theoph. de urin. Conf. Hildan. Cent. 3. obs. 73.* ubi quatuor exemplis demonstratur, quam incertum & fallax sit iudicium ab urinis desumptum. Urina autem examinanda excipi debet a somno prima & expleta concoctione cibi, eaque universa. Matula alba sit & pellucida, oblonga, ne divulsam hypostasim exhibeat, & magna, quæ totius urinæ sit capax. Obturatur procul a sole, a frigore, & a flatu,

tu, ne vel turbetur, vel crassecat: resideat quæta dum sensim refrixerit, nec tamen supra sex horas asservetur, ne quam corruptionem subeat. *Fernel. Medic. p. 312.*

APHOR. 67.

**Κ**αὶ οἷσι τὰ ὑποχωρήματα, ὡς ἐάσης εἶναι, καὶ μὴ κινήσης, ὑφίσταται ὅιον ζύσματα καὶ ὡς ὀλίγα ἢ, ὀλίγη ἢ νῆσος γίνεται· ὡς δὲ πολλὰ, πολλή. ταῦτοις συμφέρει ὑποκαθῆραι τὴν κοιλίαν. ὡς δὲ μὴ καθαρὴν ποιήσας διδῶς τὰ βοφήματα, ὁκόσω αὖν πλείω διδῶς, μάλλον βλάψεις.

**E**t quibus alvi egestionēs, si residere permiseris, neque moveris, veluti strigmenta subsident: & si pauca sunt, parvus fit morbus; sin vero multa, magnus. His alvum subpurgari conducit. Quod si vero, non purgata alvo, sorbitiones exhibueris, quo plures dederis, eo magis nocebis.

**H**ippocratem non urinarum modo contenta inspicere consuevisse, sed etiam excrementorum alvi, constat, non ex hac sententia tantum, quæ etiam *lib. de judicat. n. 8.* registrata est; verum ex multis aliis, & maxime ex *lib. 2. Epidem. sect. 3. n. 7.* ubi inquit, &  
alvi

alvi turbata ex tenuibus, aquosis, non biliosis, spumosis, multis; quæ aliquando deposita subsidebant; & lib. 4. n. 25. legimus, Quum secessus aquosi sub dio expositi essent, superne læves, tenues, isaridi similes valde fuerunt, inferne vero subsidentiam habebant. Quæ vero specialiter hic referuntur excrementa, duo nobis indicant: tenuitate quidem magnam cruditatem, subsidentia vero humorum exustionem, propter quam excrementa acrimoniam cum crassitudine contrahunt, unde intestinis adhærentia, eorum mucositatem abradunt, quæ unà cum humore exusto fundum petens, sedimentum strigmatibus simile facit: sunt autem strigmata, sordes ex præunctis corporibus strigili deterasæ, quæ quoniam duplici substantia constant, sordibus nempe, & unguentis, ideo prædictum sedimentum ex humore exusto, & mucore conflatum, eis assimilatur. Quare hujusmodi excrementa indicabunt, intestina acris humoribus esse referta, quæ statim subluere oportet, ne ulcerationem inducant, unde morbus deterior fiat: quod eo magis timendum erit, si interim alimentum liquidum, sorbitiones inquam, æger assumat, hæ etenim duplici ratione obesse possunt, & quia facilius corrumpuntur, quam solidum alimentum, & quia alvi fluorem non mediocriter augent, cujus timore, alvi fluoris inquam, lib. 2. de morb. n. 46. in tabe ex pulmonis affectu, iuscula, & intinctus prohibet, cibosque exhibet solidiores; etiam si febris adfit, quos alioqui febrientibus nunquam concedit. Admonet ergo Hippocrates, ut quamprimum alvum infernam subducamus, non quidem pharmaco fortiori, sed vel levissimo, vel  
potius

potius clysmate: quod expresse significavit *L. c. de judicat.* ubi quod hoc in loco ait, *confert subpurgare alvum*, ibi legitur, *his infusum per clysterem adhibere conducit*; ex quo docemur, quid per *subpurgare alvum* in Hippocratis doctrina intelligendum sit. *Martian. p. 478.*

Observatione practica constat, ramenta seu strigmenta interdum inveniri in alvi excrementis, quæ in alvi egestionibus liquidis & ita quiescentibus fundum petunt ac concrescunt, aut in excrementis durioribus externe reliqua excrementa obducunt. Quia vero Auctor monet stare debere in quiete excrementa, facile concipitur, eum intelligere excrementa liquida, qualia in cholera, diarrhœa & dysenteria emittuntur, quando intestinorum mucus utunque liquidus cum excrementis exiens, dein refrigeratus concrescit; & quoniam muci specifica gravitas est major, dum excrementa sunt liquida, ad fundum vasis descendit, & ibi stagnando refrigeratus concrescit in ramenta seu strigmenta, quæ effusis excrementis in fundo vasis conspiciuntur. Ex hoc nunc invento signo majorem & minorem morbi magnitudinem deducit. Naturale enim est in alvi egestionibus, ut ille mucus non exeat; ergo quo major hujus est muci evacuatio, eo major est morbus, quod verum est in omni evacuatione humorum præternaturalium: atque tanta ab-rasio & emissio muci facit, ut intestinum re-ctum omni muco privatum, tangatur ab excrementis, quæ tunc magnum dolorem concitant, & dejectiones augent. Experti sumus, quoties in muco intestinorum hæret acrimonia, instigans intestina ad frequentem dejectionem,

etionem, nos non posse curare irritamentum, nisi ille mucus acris auferatur. Quamobrem ita in dysenteria laudantur purgantia, non solum ore data, verum etiam per clysterem injecta, quibus ille mucus acrior abluatur & expellitur: & ut nuda intestina minus vellicentur, atque in motum concitata ad quietem ducantur, post exhibitum purgans propinamus anodynum mucilaginosum molle; vel post ejectionem clysteris, injicimus novum liquorem mollem, mucilaginosum, anodynum. Quod si vero, non evacuato illo muco, sorbitiones dederis, augebitur morbus, quia illæ ingestæ, muco corrupto mistæ, augebunt corruptelam. *Gorter.*



**APHOR.**

APHOR. 68.

Ό̃κόςτα ἀν̃ κάτω ὤμα̃ διαχωρεῖ , ἀπὸ χολῆς  
μυλαίνης ἐστίν· ὡς πλείονα , πλείονος· ὡς  
ἐλάσσων , ἐλάσσονος.

Quæ cruda deorsum secedunt, ab atra bile sunt: si plura, copiosiore; si pauciora, pauciore.

Hanc sententiam ita legimus *lib. de Judicat.* n. 8. *Quibus vero in egestionem deorsum bilis atra subsidet, si copiosior, major est morbus, si paucior, minor; quæ quidem lectio sicuti sensum, & verum, & rationabilem admittit, ita aphorismi vitium apertum facit, & eo magis, quia a ratione penitus alienum existit id, quod significatur aphorismo, dejectiones crudas ab atra bile dependere. Quare præsens aphorismus in numero eorum reponendus erit, qui, cum ab auctore male decerpti sint, Hippocraticæ dignitati non leviter detrahunt. Martian. p. 479. Aliter sentit Gorterius; juxta quem, facile est ex comparatione locorum colligere, qualem cruditatem Hippocrates intelligat, nempe materiam nigram melancholicam. Hæc materia reliquis excrementis gravior, si exacte non misceatur, & excrementa sint liquida, fundum vasis petit. Quomodo*  
au-

autem hæc nigra dici possunt cruda? Cruditas nomen multas diversas res designat; nam alimenta in ventriculo & intestinis bene præparata si vel per vomitum vel successum deponuntur, cruda vocantur. Ita boni confluentes ad dicta loca humores, destinati ad alimentorum præparationem, si egeruntur, cruda faciunt excrementa. Denique humores corrupti & alieni egesti etiam crudi dicuntur. Inter hos omnes humores gravissimus est, qui vocatur atra bilis, quamobrem etiam fundum vasis petit. Ex copia nunc materiæ crudæ vel atræ bilis, format magnitudinem morbi. Quia atra bilis est humor morbosus, de ejus copia majore & minore egesta ratiocinari possumus, ut de muco intestinorum, ad præced. *aph.* 67: quo enim major copia egeritur, eo majorem quoque collectionem arguit. Quid autem sit sentiendum de egestionem atræ bilis, videre est ad 4 *aph.* 21. 22. 23. 24.



**APHOR.**

APHOR. 69.

**Α**ἱ ἀποχρέμψεις, αἱ ἐν πῖσι πυρετοῖσι τοῖσι μὴ  
διαλείπουσιν, αἱ πελιδναί, καὶ αἱματοδεις,  
καὶ χολώδεις, καὶ δυσώδεις, πᾶσαι κακαί· ἀπο-  
χωρέεσθαι δὲ καλῶς, ἀγαθαί. καὶ κατὰ κοιλίῳ,  
καὶ κύσιν, καὶ ὅκῃ ἂν τι ἀποχωρεῖον ᾖ μὴ κικα-  
ρμμένον, κακόν.

**I**n febris non intermittentibus ex-  
screationes lividæ, & cruentæ, &  
biliosæ, & graveolentes, omnes malæ:  
cum vero probe secedunt, bonæ. Per  
alvum etiam, & vesicam, & ubicunque  
quod secedit substituit non purgatum,  
malum.

**E**st hic aphorismus repetitio istius qui extat  
superius 4 aph. 47.





## APHOR. 70.

**Τ**ὰ σώματα χρεῖ, ὅπως τις βάλεται καθάρει-  
σθαι, ἔνδοξα ποιεῖν. κλῶν μὲν ἄνω βάλῃ  
ἔνδοξα ποιεῖν, εἴσῃσι τλὴ καλίσιν· ἢ δὲ κάτω,  
ὕγρηται.

**C**orpora cum quis repurgare volet,  
fluxilia reddere oportet. Quod  
si supra fluxilia reddere voles, alvus  
sistenda: si vero infra, humectanda.

**P**rior aphorismi pars habetur 2 aph. 9. &  
ibi exposita est. Posteriores Celsus l. 3.  
c. 18. p. 154. ita expressit: *Illud quoque perpe-  
tuum est in omnibus morbis, ubi ab inferiore par-  
te purgandus aliquis est, ventrem ejus ante solven-  
dum esse: ubi a superiore, comprimendum.* Verum  
quando dicitur, quod ad promovendum, sive  
excitandum vomitum, corpus præparari de-  
beat per ea, quæ sistunt alvum, id quidem an  
conveniat doctrinæ Hippocratis, dubitari po-  
test; nam nihil tale quid ab eo alibi prolatum  
esse novimus, imo juxta ipsum vomitus re-  
medio est alvi dejectioni, uti patet in annot.  
ad 6 aph. 15. An compilatori aphorismorum,  
aut librario tribuamus, quod a mente Hippo-  
cratis alienum quid in textum nostrum irre-  
pserit, cum post generalem propositionem,  
quod

quod corpora, quæ quis purgare vult, fluxilia reddi debeant, scribere debuisse, si supra fluxilia reddere voles, corpus replendum? Consul. notata ad 4 aph. 13.

APHOR. 71.

Τῆς πνοῆς, ἀγρυπνίῃ, ἀμφοτέρω μᾶλλον τῷ μετρίῳ γιγνόμενα, νῦντος (κακόν.)

Somnus, vigilia, utraque si modum excesserint, morbus. (malum.)

Repetita hæc est sententia ex 2 aph. 3.

APHOR. 72.

Εἰν ταῖσι μὴ διαλείπασσι πυρετοῖσιν, ἣν τὰ μὲν ἔξω ψυχρὰ ἦ, τὰ δὲ ἔσω καίηται, καὶ δίψαν ἔχῃ, θανάσιμον.

In febribus non intermittentibus, si externa frigeant, interna vera urantur, & sitis vexet, letale.

Isdem verbis exaratus est hic aphorismus supra 4 aph. 48.

## APHOR. 73.

**Ε**ν μὴ διαλείποντι πυρετῷ, ἢν χεῖλος, ἢ ῥίς,  
ἢ ὀφθαλμοὺς, ἢ ὄφρυς διατραφῇ, ἢν μὴ  
βλέπη, ἢν μὴ ακέη, ἢδη ἀσθενὴς εἶναι, ὃ, πᾶν  
ταῦτον, γένηται, θανάσιμον.

**I**n febre non intermittente, si labrum,  
aut nasus, aut oculus, aut superci-  
lium pervertatur, si neque videat, ne-  
que audiat, & jam debilis sit, horum  
quicquid acciderit, letale.

**V**ide eandem sententiam in præcedentibus,  
4 aph. 49.



APHOR.

## APHOR. 74.

**Ε**πὶ λευκῇ φλέγματι ὕδρωψ ἐπιγίγνεται.

**A**lbæ pituitæ hydrops supervenit.

**A** Leucophlegmatia oriri hydropem dixit sæpius Hippocrates; vid. *lib. de affection. n. 20 & 23. de intern. affect. n. 24. lib. 1. de morb. n. 3.*

Leucophlegmatia cum sit cachexia corporis universi, quæ venit ex caeochymia pituitosæ sanguinis, unde tota cutis & caro tumescit atque turgescit, si per initia non fuerit curata, corruptione sanguinis incremente, transitus fit ex leviori morbo in graviolem. Consule dicta ad 7 *apb. 29.*



## APHOR. 75.

**E**πὶ διάρροϊᾳ δυσεντερίῃ.

**A**b alvi profluvio intestinorum difficultas.

**E**xplicata habetur hæc sententia superius  
7 aph. 23.

## APHOR. 76.

**E**πὶ δυσεντερίᾳ λειαντερίᾳ (ἐπιγίνεται.)

**I**ntestinorum difficultati lævitas intestinorum (succedit.)

**A**phorismus hic legitur *lib. 1. de morb. n. 3.*  
& apud Celsum *l. 2. c. 7. p. 64. & l. 4. c. 16. p. 226.* Sensus ejus patet ex dictis ad  
6 aph. 43.



**APHOR.**

## APHOR. 77.

Επὶ σφαιλισμῷ ἀπόσσεσις ὀστέα.

**A** fideratione abscessus ossis.

**V**ariis revera nodis spinosus videtur hic aphorismus ita sonans: *Ex* (seu potius in & cum) *sphacelismo ossis abscessus*. Hunc quippe Viscerus & Heurnius explicant, quasi docentem; a gangræna os subjectum carie corrumpi. Verum mentem ejusdem haud ita tetigisse videntur. Nam *Vestiar. n. 17*. Hippocrates sphacelissimum suum a gangræna, venarum seu vasorum sanguineorum morbo, satis aperte distinguit, eundem ossium potius esse detegens. Neque vero praxis chirurgica testatur, semper aut sæpius gangrænam, ad sphacelum, etiam nostrorum temporum, perniciose declinantem, os subjectum mox carie corrumpere; cum contrà magis secundum 7 *aph. 2. ex ossi ægrotante* (i. e. carioso) *caro fiat livida*. Vox etiam ἀπόσσεσις seu *abscessus* Hippocrati non tam cariem, quam separationem significat, & accipitur (1) de separatione integri cujusdam membri, quo modo *Prognost. n. 8. Coac. sect. 3. n. 351. (2) 6 aph. 45.* ita habet: *Ulcera quacunq; annua fiunt, aut diutius tempore durant, necesse est os abscedere & cicatrices cavas fieri.* conf. his *Coac. sect. 3. p. 376. sect. 2. n. 156. lib. 6.*

Gg 4

Epid.

*Epidem. sect. 4. n. 18.* quæ loca magis de carie simplici & ossis ex eadem separatione conveniunt, neque prorsus inepte aphorismus de sphacelismo per cariem, & melius, quam per gangrænam, potest explicari. (3) vero Hippocrati abscessus significat non simplicem separationem, sed talem quæ fit cum collectione morborum, haud raro maligni, humoris. Vid. l. 5. *Epidem. n. 21.* Et secundum hanc abscessus acceptionem optime aphorismus præsens explicatur, ita ut in sphacelismo abscessum cum collectione humoris morborum ossa ipsa patiantur; utpote ex quo capite spina ventosa seu Hippocratis sphacelismus præcipue distinguitur a carie communi, & ea quidem non solum superficialia, sed etiam profunda, & licet totius cujusdam ossis. ut scilicet minime, secus ac hæc; carnis ulcus prius sequatur, sed etiam in osse humoris adsit collectio, unde cartilago accrescit, imo illud ipsum præter naturam & haud raro plurimum increscit; hinc etenim ille tumor ipsius, huic malo essentialis, quem Avicenna *additionem ejus* vocat, *corruptentem ossis partem unam post alteram.* Quæ juxta sphacelismus seu spina ventosa non est, sed simplex caries, ossibus integris etiam pluribus corruptis. Ossa ipsa vero a propriis abscessibus, etiam inflammatoriis, haud esse immunia, patet ex *lib. 2. Epidem. sect. 1. n. 45. & 52.* Dicitur ergo Hippocrati sphacelismus morbus, quem ex *Celsi l. 8. c. 10. p. 532. Tulpius l. 4. c. 13.* appositissimo, totamque naturam ejusdem exhaustiente, nomine canceri ossis exprimere voluit. Sequens autem Arabum barbaries hunc affectum spinæ ventositatis titulo

titulo proposuit, quas voces invertendo, recentiores magis spinæ ventosæ nomine vocarunt. Significat autem ventositas inflationem sive tumorem, sicut illis œdema ventositas alba dicitur. Severinus eidem huic malo nomen Prædarthrocaces imposuit; quod pueros tantum corrumpat. Verum alii morbum hunc pueris quidem & adolescentibus, ob maiorem ossis mollitudinem, inprimis infestum admittentes, attamen adultiores etiam invadere urgent. Vid. *Tulp. l. c.* Constat ergo, Hippocrati spinam ventosam sub nomine sphacelismi jam olim fuisse cognitam. Vid. *Obs. Hal. T. 8. p. 266 sq.* Conf. *Heister Chir. p. 389 sq.* Os se ipsum non nutrit & manet vitale sine partibus ambientibus, sed ex istis in suo periosteo accipit vasa vitalia, quæ adducunt & reducunt sanguinem, ex quo periosteum & os sua vasa vitalia accipiunt. Quoties igitur in partibus ambientibus sphacelatis fit extincta circulatio, ipsum os circulatione hac privatum mori debet. *Gorter.*





## APHOR. 78.

**Ε**πὶ αἵματος ἐμέτω φθὴν, καὶ τὸ πῦρ κάθα-  
 ρις αἶν. ἐπὶ φθὴν ρεῦμα ἐκ τῆς κεφαλῆς.  
 ἐπὶ τῷ ρεῦματι διάρροια. ἐπὶ διάρροίᾳ σχέσις τῆς  
 αἰῶς καθάρσιος. ἐπὶ τῇ σχέσει θάνατος.

**A** sanguinis vomitu tabes, & puris  
 purgatio per superiora. A tabe  
 fluxus ex capite. A fluxu profluvium  
 alvi. Ab alvi profluvio suppressio pur-  
 gationis per superiora. A suppressione  
 mors.

**E**xplicata legi hæc possunt sub 7 apb. 15. 16.  
 & 5 apb. 12. 14.



APHOR.

APHOR. 79.

**Ο**μοία καὶ ἐν ταῖσι κατὰ τῶν κύσιν, καὶ ἐν ταῖσι κατὰ τὸ κοιλίῳ ὑποχωρήμασι, καὶ ἐν ταῖσι κατὰ τὰς σάρκας σκεπτέον, καὶ ἢν πῃ ἄλλῃ τῆς φύσις ἐκβαίνει τὸ σῶμα. ἢν ὀλίγον, ὀλίγη ἢ ἔσθ' ἢ γίγνεται ἢν δὲ πολὺ, πολλή· ἢν πάνυ πολὺ, θανάσιμον τὸ τοιοῦτον.

**Q**ualia etiam quæ per vesicam, & alvum, & carnes excernuntur, & sicubi alias corpus a natura reces-  
ferit, inspicere oportet. Si parum, parvus est morbus: si multum, magnus: si admodum multum, letale istud est.

**S**apientissimum, quod in structurâ microcosmicæ machinæ apparet, artificium maxime in eo positum est, ut innumera organa velut officinæ sint, quarum beneficio per continuum tritum, motum, elaterium, ingesta subiguntur, attenuantur & inter se invicem probe miscentur; postea innumera quoque organa colatoria & emunctoria extant, per quæ materia supervacua, inutilis & mixturæ animalī ac vitæ aliena, corpore ejicitur. Quamdiu igitur vacuationes, seu excretiones istæ fiunt secundum naturam, sanitatem attestantur: contra

tra vero ubi vitio laborant, seu in quantitate, seu in qualitate, morbo affici corpus arguunt, eoque minore, majore, prout plus, minusve a naturali tramite recesserint. Vid. *Hoffm. Med. rat. T. 2. p. 402 sq.* Et hoc est, quod præsens innuit generatim aphorismus. Passim vero in præcedentibus particulatim vidimus de excretionibus per alvum, per vesicam, per cutis poros, per uterum, &c.



HIPPO-

**HIPPOCRATIS**  
**APHORISMORUM**  
**SECTIO OCTAVA.**



# HIPPOCRATIS

## APHORISMORUM

### SECTIO OCTAVA.

#### APHOR I.

**Ο**ἰκίαι ὑπὲρ τὰ πσσαράκοντα ἔτια φρενι-  
τοκοὶ γίνονται, & πάνυ τοὶ ὑγιάζονται·  
ἤσσαν γὰρ κινδυνεύουσιν, οἷσιν ἂν οἰκείη τῆς φύσεως  
καὶ τῆς ἡλικίης ἢ νῦν ᾖ.

**Q**ui seniores annis quadraginta phre-  
nitici fiunt, non admodum con-  
valescunt: minus enim periclitan-  
tur ii, quorum naturæ & ætati morbus  
fuerit familiaris.

**A**b anno decimo quarto ad quadagesimum  
secundum usque, natura omnis generis  
morborum corporis ferax est. *Hippocr. Coac.*  
*sect. 3. n. 397.* Viris febres ardentes, & qui-  
cunque acuti morbi (*ex quibus certe est phrenitis*)  
censentur, raro contingunt. *de aër. loc. & aq.*  
*n. 4.* Verum 3 *aph. 30.* phrenitides familiares  
dicuntur ætati, quæ juvenilem consequitur,  
ad

ad quem locum annotavimus, quod intelligendus sit de ætate consistente seu virili, inter juventutem & senectutem media. Ergo non videbitur ad incongruos pertinere morbos phrenitis etiam post quadragesimum secundum contingens, h. e. virili ætati, quæ extenditur minimum ad quadragesimum nonum. Neque vero ex annorum numero ætas definienda venit, sed ex constitutione seu conditione solidarum corporis nostri partium, ita, ut tunc demum dicatur incongruus morbus phrenitis, cum jam languescere incipiunt fibræ vasorum motrices, & fluida minus vegete impelli in vasa minima, quæ duæ conditiones ad generationem acutorum morborum requiruntur, & quandoque jam mox post quadragesimum secundum annum adsunt. Quare tunc demum verus erit aphorismus. Uti autem morbi naturæ & ætati congruentes minus sunt periculosi, quoniam minorem recessum a sanitatis statu ostendunt: ita contra difficilior sanabiles existunt, qui non secundum naturam contingunt, quia arguunt potentiorē causam, quæ nempe dissimilem omnino & ætati & naturæ seu temperiei potuerit inferre morbum. Consule nota ad 2 *aph.* 34.



**APHOR.**

## APHOR. 2.

Ὅστις ἐν τῇσιν ἀρρώσισιν οἱ ὀφθαλμοὶ  
κατὰ προαίρεσιν δακρύουσιν, ἀγαθόν· ὁκό-  
στις δὲ ἀνευ προαιρέσεως, κακόν.

Quibuscunq; oculi in morbis lacry-  
mantur voluntarie, bonum : qui-  
bus vero sine voluntate, malum.

Exposita est hæc sententia supra 4 aph. 52.

## APHOR. 3.

Ὅστις ἐν τοῖσι πυρετοῖσι παρταίσιζεν ἱᾶ-  
σιν αἷμα ἐκ τῶν ριγῶν ρυῖν, πονηρόν.

Quibus in febribus quartanis sanguis  
e naribus fluxerit, malum.

Hæc sententia Hippocraticæ doctrinæ con-  
venire non videtur, verum decerpta esse  
ex iis locis ubi de hæmorrhagia agitur con-  
tingente in morbis die quarto, quæ difficilem  
judicationem ostendit. Vid. *lib. de Judicat. n.*  
*10. lib. 6. Epidem. sect. 2. n. 40. Coac. sect. 2.*  
*n. 38. sect. 3. n. 433.* de qua re consuli possunt  
*Vol. II.* H h dicta



dicta ad 4 *aph.* 74. Neque etiam experientia confirmat, quod singulariter malum sit sanguis e naribus fluens in febre quartana, cui frequenter supervenit. Vid. *Hoffm. Med. rat. T. 4. P. 2. p. 13.* & conf. *Nard. Noct. gen. p. 442.*

Nunquam memini me observasse, febrem quartanam vel hæmorrhagiis vel venæ sectione fuisse sublatam, sed qui multum sanguinis effuderunt, facti fuere leucophlegmatici vel hydropici: habuerunt quidem illi paroxysmos mitiores, verum simul diutius durantes, & magis periculosos, ut febris illa vehemens videretur commutata in mitiorem, sed malignam. Si secundum nostram sententiam febris quartanæ materia ponatur in succo illo arteriarum, quæ latera arteriarum intus obtegit, quæque materia, uti semina malæ herbæ, ad maturitatem veniens febris paroxysmum concitat; facile concipi potest, neque hæmorrhagiam, neque venæ sectionem tollere posse hanc febrem, sed corpus disponere ad suscipiendos morbos ex debilitate virium & defectu sanguinis nascendos. Si enim sanguis fluit vel sponte vel arte, ille secum non educit succum arteriarum, qui febris materiem continet, sed sanguinem purum & bonum, per arterias & venas fluentem. Qui morbi impetu majore sua mala producant, ut morbi inflammatorii, hi evacuatione sanguinis egregie compescuntur, sed febris quartana vel simplex vel duplicata, non infert mala majore circulatione, verum summo inducto potius frigore, & non minuitur cum diminuta quantitate sanguinis, uti morbi inflammatorii. Igitur nunquam ex sanguinis fluxu in Quartanis curatio est speranda.

Atque

Atque post talem spontaneam vel artificialem sanguinis evacuationem destruitur æquilibrium, humores liquescent, solida laxantur, atque ita sæpe fiunt leucophlegmatici vel hydropici, quod sæpe in praxi observavimus, sub quibus dein morbis febris quartana latitat. Monemur ergo, non sine gravi ratione in febre quartana venam esse secandam. *Gorter.*

## APHOR. 4.

**Ι**δρῶτες ἐν τῇσι κρίσιμοις ἡμέρησι γιγνόμενοι σφοδροὶ καὶ ταχέες, ἐπικίνδυνοι καὶ ἐὼθέμενοι ἐκ τοῦ μετώπου, ὥσπερ σαλαγμοὶ καὶ κρενοὶ, καὶ ψυχροὶ σφοδρὰ καὶ πολλοί. ἀνάγκη γὰρ τὸν πῖτον ἰδρῶτα πρεῦεῖν μετὰ βίης, καὶ πόνου ὑπερβολῆς, καὶ ἐκθλίψεως πολυχρονίας.

**S**udores in diebus judicatoriis oborientes vehementes & veloces, periculosi sunt: & qui expelluntur ex fronte, velut guttæ & aquæ scaturientes, & frigidi valde ac multi. Necessè est enim ejusmodi sudorem prodire cum violentia, & laboris excessu, ac expressione diuturna.

**S**udores hic memorati 1. vehementes & veloces; 2. velut guttæ & aquæ salientes ex fronte expulsi; 3. frigidi valde ac multi; coactæ sunt naturæ effectus, exsolutionis partium

H h 2

argu-

argumenta, spasticæque solidorum adstrictio-  
nis violentæ expressiones; seu, ut exprimit  
aphorismus, notant *violentiam*, & *laboris exces-  
sum*, & *expressionem diuturnam*. Ideo periculosi.  
Sunt enim ex illorum genere, qui fiunt propter  
corporis exsolutionem, & inflammationis vi-  
gorem, ut loquitur Hippocrates *Prognost. n. 5.*  
quales damnantur, utpote præ suffocatione,  
& impetu ac violentia, superantibus morbis  
facti, *de vict. acut. n. 53.* Omne quippe nimium  
naturæ est inimicum, juxta 2 *aph. 51.* Sudo-  
res paulatim fientes profunt, acervati vero læ-  
dunt, *Coac. sect. 3. n. 90.* Boni, qui guttatim  
& cum exhalatione fiunt: boni sunt, qui toto  
corpore oriuntur; pessimi autem frigidi, qui-  
que circa caput tantummodo, faciem & cer-  
vicem exoriuntur, *Prognost. n. 5.* Vid. etiam  
*lib. de Judicat. n. 6. Coac. sect. 4. n. 38.* & con-  
sul. notata ad 4 *aph. 36. 37. & 42.*



APHOR.

## APHOR. 5.

**Ε**πὶ χρενίᾳ νησέματι κοιλίης κατὰφορῇ, κα-  
κόν.

**Ex** morbo diuturno alvi fluor, ma-  
lum.

**H**ic non est sermo de alvi fluxu in morbo diuturno, ubi certe salutaris esse potest, ut in leucophlegmatia, quam solvit diarrhœa; 7<sup>a</sup> aph. 29: sed de alvi fluxu, ex morbo diuturno, unde intelligitur, sub morbis diuturnis malum esse alvi fluxum, quando a lassata aut fatiscente natura, seu fracto fibrarum tono, non item quando vi tuentis & expedientis se naturæ prorumpit. Tabes exemplo est, quæ, ubi diarrhœa contingit, ruit in perniciem. *Hecquet.* Alvi fluor hoc loco non significat solam evacuationem contentorum ex intestinis, qua tollitur cacoehylia, sed copiosiore & continuatam dejectionem, quæ arguit non solum evacuari ea contenta, verum etiam omnes humores bonos in intestina confluentes. Omnis ergo diarrhœa, dysenteria, cholera & lenteria, in morbis chronicis damnantur ob sequentes rationes. Si continuo ingens copia corruptorum humorum ejicitur, signum est, magnam etiam intus esse malorum humorum collectionem, quod malum præbet signum. Si vero hujusmodi corrupti humores ejiciuntur,  
H h 3 quia

quia boni humores in intestina confluentes cito convertuntur in corruptelam, hoc etiam malum est, nam ita metuendum, ne omnes reliqui boni humores in corruptelam convertantur. Si vero boni humores continuo emittuntur, uti in lienteria, & interdum in diarrhoea, bonorum nimia evacuatione corpus debilitabitur, in cachexiam vel leucophlegmatiam incidet, vel exhaustis humoribus emaciabitur & tabe atque febre hectica consumetur. Conducit ergo in chronicis, ut alvus liquefscens reddat cacochyliam, sed fluxus non debet continuare: conducit etiam semel aut bis alvum ducere, ut corrupta ex cavo intestinorum & ventriculi eliminentur, sed damnanda est ea methodus, qua contendunt continuo datis purgantibus totum corpus depurare. *Görter.*



**APHOR.**

## APHOR. 6.

Ὅλα φάρμακα ἐκ ἰῆται, σίδηρος ἰῆται·  
ὅσα σίδηρος ἐκ ἰῆται, πῦρ ἰῆται· ὅσα δὲ  
πῦρ ἐκ ἰῆται, ταῦτα χρὴ νομίζειν ἀνίατα.

Quæcunque non sanant medicamenta,  
ea ferrum sanat: quæ ferrum non  
sanat, ea ignis sanat: quæ ignis  
non sanat, ea incurabilia judicare oportet.

Quia Galenus hunc aphorismum non posuit  
in suis codicibus, ubi reliquos omnes  
commentariis illustravit, propterea ab  
editoribus spuris adnumeratur. Sed ut κατὰ  
τὸ πρῶτον non sit ab Hippocrate profectus, rem  
tamen ejus apprime convenire, docere nos  
potest *lib. de arte n. 13.* Merito omnes apho-  
rismos claudit. Nam cum tria sint Medici in-  
strumenta, ratio victus, medicamentum, &  
manus operatio, juxta *lib. de dec. orn. n. 6:* quæ  
ergo non sanantur victus ratione, medicamen-  
to indigent; quæ non sanantur medicamento,  
ferro. Manifestum autem est, quod per ferrum  
non intelligit cucurbitulas, aut venæ sectio-  
nem, quanquam hæc manu administrentur.  
Sed ferrum dicimus, cum quod corruptum  
est, aufertur. Sectio enim venæ & cucurbitula  
sunt communia auxilia, & sæpe adhibentur  
ante medicamenta: ferrum autem posterius

H h 4

esse

esse debet medicamentis. Hinc ferro dicitur curari, quod præscinditur: at hoc est extremum, cum sit periculosissimum, aut maximam adferat jacturam, aut utrumque: igitur hoc posterius esse debet medicamentis omnibus. Igne utitur Medicus, quando non solum oportet auferre quod peccat, sed circumjacentes partes emendare ac temperare: aut ob timorem effluxionis sanguinis. *Cardan. p. 847.* Est itaque extremum omnium remedium ignis seu cauterium actuale, antiquissimi certe usus, ut vel ex Hippocratis lectione discere licet. De ratione operandi cauteriorum, modo adhibendi, multiplicative utilitate, consuli possunt Scriptores Chirurgici.

[Atque hic desinimus cum *Jano Cornario & Anutio Foesio*, qui posterior sectionis hujus octavæ aphorismos omnes *spurios* appellat atque *nothos*: neque habet reliquos, qui istis superadditi reperiuntur apud *van der Linden*: qui etiam certe non ab Hippocrate profecti videntur, nisi forte excipere velis qui extat num. 7, sed qui est idem cum 5 *aph. 9.*]



# INDEX

## APHORISMORUM.

[*Numerus major Sectionem, minor aphorismum indicat.*]

### A.

**A** *Blumen* in quovis morbo crassum præstat tenui & tabesfacto. II. 35.

*Abortus* quo anni tempore timendus. III. 12.

- - - contingit gracilibus præter naturam. V. 44.

- - - febrientibus, quando vehementer extenuantur.

V. 55. quando mammae gracilescent. V. 37. 38. 53.

quando fiat mediocriter carnosæ. V. 45. a venæ sectione. V. 31. a diarrhœa. V. 34. a tenesmo. VII. 27.

*Abscessus futuri* significantur, quibus in febribus lassitudinis sensus est. IV. 31. in convalescentibus, in parte dolente. IV. 32. in parte, qua ante morbum doloris sensus fuit. IV. 33. *Febribus superuenientes*, febrem non solventes, morbi longitudinem significant. IV. 51. *Nephriticis fieri*, quibus signis manifestum sit. VII. 36. *Abscessu ad articulos*, qui expectatur in febribus, liberat urina copiosa, crassa & alba, quarto die, maxime, si etiam hæmorrhagia narium contingat. IV. 74.

*Conf. Suppuratio.*

*Adolescentes* optime degunt vere & prima æstate. III. 18.

minime tolerant jejunium. I. 13. 14. quibus morbis maxime obnoxii. III. 27.

*Adstringentia* conveniunt in vomitu cruento. VII. 37.

*Æstas* victum pleniorē gravissime fert. I. 18. non omnibus naturis æque confert. III. 2. quæ *Veri similis* est, copiosos in febribus movet sudores. III. 6. *Sicca & aquilonia*, si eam secutus fuerit autumnus pluvius & austrinus, quos det morbos. III. 13.

*Æstate* per superiora purgandum. IV. 4. *æstate prima optime*



- time degunt pueri & adolescentes: III. 18. *adulti*, senes. III. 18.
- Ætate* qui regnent morbi. III. 21.
- Ætas* prima. Vid. *Pueri*.
- - - secunda. Vid. *Adolescentes*.
- - - tertia. Vid. *Juvenes & Viri*.
- - - quarta. Vid. *Senes*.
- - - quæ magis apta tolerando jejuniò. I. 13.
- Ætatis consideratio* necessaria in evacuationibus. I. 2. & in præscriptione victus. I. 17. *mutatio* liberationem adfert juvenibus comitialibus. II. 45.
- Ætates* aliæ ad alias anni tempestates, & loca, & victus rationes, bene, vel male habent. III. 3.
- Alimentum*. Vid. *Vitus*.
- Alvus dura* fit ab aquilonia tempestate. III. 5.
- - - *humida* per juventutem, exsiccatur senescentibus; & contra. II. 20. Juvenibus magis confert, quam sicca; contra in senectute II. 53. Senibus est morbus. III. 31. fit ab austrina aëris constitutione. III. 17. ab hæmorrhagiâ copiosa in febribus. IV. 27.
- Alvi fluxus* a morbo diuturno, malum. VIII. 5.
- - - *perurbationes* sponte evenientes, quæ conducant. I. 2.
- - - *dejectio paucæ* significatur, ubi urina multa noctur redditur. IV. 83.
- - - *dejectiones* morbos indicant fore judicatu faciles vel difficiles, breves vel longos. I. 12. Earum *mutationes* quando juvent, II. 14. *Biliose*, oborta surditate cessant, & iisdem exortis surditas finitur. IV. 28. 6c.
- Crudæ* sunt ab atra bile. VII. 68. *Sincere* in longo morbo, malum. VII. 6. ab his dysenteria, malum. VII. 23. *Spumose* in diarrhoeis, ex capite defluunt. VII. 30. *Nigræ*, pessimæ. IV. 21. Quæ habent *sedimenta* strigmatibus similia, quid indicent. VII. 67.
- Ib *dejectionibus biliosis* lac dare, malum. V. 64.
- - - *profluvium*. Vid. *Diarrhœa*.
- Ambidextra* non est foemina. VII. 43.
- Angina* repente in febre accidens, nullo tumore se manifestans, lethalis. IV. 35. intra pulmones translata, in septem diebus interficit, vel fit suppuratio. V. 10.
- Angina* (In) tumor, bonum. VI. 37. VII. 49.
- Anginæ* fiunt per pluviosas anni tempestates. III. 16. regnant vere. III. 20. & autumno. III. 22.

*Animæ*

*Animi deliquium* inducitur a calido frequenter usurpato. V. 16. fit a rupto intus tuberculo. VII. 8. accedens fluentibus menſtruis, malum. V. 56. Crebro & vehementer contingens citra manifestam cauſam, ſubitam adfert mortem. II. 41.

*Anni tempora.* Vid. *Tempeſtates*.

*Ano* amicum eſt calidum. V. 22.

*Anxietudinem* ſolvit potio vini aqua temperati. VII. 56.

*Apbonia.* Vid. *Murus*.

*Apbiba* pueris familiares ſunt. III. 24.

*Apoplexia* fit ab atra bile. VI. 56. VII. 40.

- - - ab iſtu in capite, malum. VII. 14.

*Apoplexiam ſolvere* vehementem, impoſſibile; debilem, non facile. II. 42.

*Apoplexie* ſunt per pluuiolaſ tempeſtates. III. 16. hieme. III. 23. Senibus III. 31. maxime ea ætate, quæ eſt a quadageſimo ad ſexageſimum. VI. 57.

*Appetitus deſectus* per initia morbi præſtat vegeto. II. 32. ſine febre, indicat vomitorium. IV. 17. in longa dyſenteria, malum. VI. 3. in morbo diuturno, malum. VII. 6.

*Aqua* quæ leviffima. V. 26.

- - - calida. Vid. *Calidum*.

- - - frigida. Vid. *Frigidum*.

- - - inter cutem, Vid. *Hydrops*.

*Aquilonia aëris conſtitutio* corpora denſat, roborat, &c. ſed habet & ſua incommoda III. 17. quos inducat morbos. III. 15.

*Arteribus* (Ex) vehementibus convuſio, aut tetanus, malum. VII. 13.

*Arſ medica longa.* I. 1. Quid ad eam requiratur. *ibid*.

*Aribritis* regnant per tempeſtatum magnas ſiccitates. III. 16. Vere. III. 20. infeſtant Senes. III. 31.

*Articulorum tumores* & dolores frigida affuſa levât. V. 25.

*Ascarides.* Vid. *Vermes*.

*Aſhmata* gignuntur autumnno. III. 22. contingant ætati puerili III. 26. virili. III. 30.

*Aſhma* (Ex) gibboſi ante pubertatem, moriuntur. VI. 46.

*Atbie* indigent multo alimento. I. 15. eorum valetudo eſt lubrica. I. 3.

*Atra bilis.* Vide *Bilis atra*.

*Attabilarii.* Vid. *Melancholici*.

*At-*

*Attenuata.* Vid. *Extenuata.*

*Auditus deficiens* in febre continua, imbecillo jam corpore, in propinquo mors est. IV. 49. *gravis* fit ab austriana aëris constitutione. III. 5. 17. ei obnoxia est ætas senilis. III. 31.

*Aurium dolores* regnant æstate. III. 21. *humiditates* pueris sunt familiares. III. 24.

*Austrina aëris constitutio* corpora exsolvit, humectat, & varios inducit morbos. III. 5. 17.

*Autumnus* viduum plenorem gravissime fert. I. 18. tabidis malus est. III. 10. *pluvius & austrinus*, succedens ætati sicce & aquiloniæ quos generet morbos. III. 13. *aquilonius & sine pluvii*, commodus natura humidioribus & mulieribus, reliquis morbosus. III. 14.

*Autumno* qui regnent morbi III. 22. podagra fere movetur. VI. 55. morbi sunt acutissimi & maxime exitiales. III. 9. *primo* optime degunt senes. III. 18. *adulto* juvenes & viri. *ibid.*

## B.

**B**albi maxime corripuntur longis diarrhœis. VI. 32.

*Balbus* subita, ab atra bile. VII. 40.

*Balneum* solvit oculorum dolores. VI. 31. VII. 46.

*Bilis atra* per morborum initia supra vel inferius prodians, lethale. IV. 22. 23. Conf. *Melancholia.*

*Borealis aëris constitutio.* Vid. *Aquilonia.*

*Bubonibus* (Ex) febres omnes mala, præter diarias. IV. 55.

## C.

**C**achexia incidunt in ætatem senilem. III. 31.

*Cacitas* ex melancholia. VI. 56.

*Calculi* gignuntur in puerili ætate. III. 26.

*Calculus vesicae* notatur ab urina, in qua arenosæ subsistentiæ. IV. 79.

*Calefacere* oportet perfrigerata &c. V. 19.

- - - confertim, & repente, periculosam. II. 51.

*Calidum* quibus corporis partibus utile. V. 18.

*Callidum* quæ præstet corpori commoda. V. 22. frequenter usurpatum quas adferat noxas. V. 16. aqua calida capiti affusa solvit febrem. VII. 42.

Cæ

- Calor natus plurimus hieme & vere. I. 15* qua parte corporis sentitur, ibi morbus est. IV. 39. vehemens internorum, dum externa frigent, in febribus continuis, lethale. IV. 48. VII. 72.
- Calvis non fiunt varices magni, &c. VI. 34.*
- Calvisio non tentantur eunuchi. VI. 28.*
- Cancros occultos curare non oportet. VI. 38.*
- Capiti affusa aqua calida solvit febrem. VII. 42.*
- Capitis dolores gignuntur hieme. III. 23.* post autumnum pluvium & austrinum, quem præcesserit æstas sicca & aquilonia III. 13. arguuntur præsentēs, vel significantur futuri in febribus, prodeuntibus urinis subjugalibus. IV. 70. Sanis derепente contingentes, cum defectione vocis & stertore, intra septem dies adferunt mortem, nisi febris superveniat. VI. 51. *salvatur* pure, aut aqua, aut sanguine, per nares. vel os, vel aures effluente. VI. 10. in iis incisa vena in fronte prodest. V. 68. lac exhibere, malum. V. 64.
- Capitis gravitas ab austrina aëris constitutione. III. 5* 17. a suffitu odoramentorum. V. 28. Eam solvit calidum. V. 22. Ab ictu in capite stupor, aut delirium, malum. VII. 14.
- Cardialgia in febribus, malum. IV. 65.* citra febrem, indicat vomitorium. IV. 17.
- Caro livida ex osse ægrotante, malum, VII. 2.*
- Carnium effeminatio a calido frequenter adhibito. V. 16.*
- Cartilaginis vulnera non consolidantur. VI. 19.* VII. 28.
- Catarrhi brevi interficientes post hiemem austrinam & pluviam, cui successerit ver siccum & aquilonium. III. 12.* in thorace in 20 diebus suppurantur. VII. 38.
- Catarrhis tussiculosi obnoxia est senectus. III. 31.*
- Cathartica. Vid. Purgantia.*
- Cephalalgia. Vid. Capitis dolores.*
- Cerebrum concussum, vocis defectionem inducit. VII. 58.*
- sphecelatum, in tribus diebus mortem adfert. VII. 50.*
- Cerebri vulnera sunt lethalia. VI. 18.*
- Cerebro vulnerato & febris & bilis vomitio supervenit. VI. 50.*
- Cerebro inimicum est frigidum, utile calidum. V. 18.*
- Cholerae incidunt in virilem ætatem. III. 30.*
- Cibus. Vid. Viæus.*
- Cibi fastidium. Vid. Appetitus dejectus.*
- Cicatrices cavæ fiunt ab ulceribus inveteratis. VI. 45.*

*Cosa,*

- Codæ*, non cruda; educenda sunt, &c. I. 22.
- Collum* repente intortum, ut deglutitio fieri nequeat, in febre, nullo existente tumore, lethale. IV. 35.
- Comitialis morbus*. Vid. *Epilepsia*.
- Conceptus*. Vid. *Gravida*.
- Consuetudo* facit, ut etiam deteriora minus turbent. II. 50. & ut senes, ac invalidi, facilius ferant labores, quam juvenes, & robusti, illis minus assueti. II. 50.
- Consuetudini* aliquid concedendum in præscribenda viæ ratione. I. 17.
- Contrarietas* in morbis remedio est. II. 22.
- Convalescentes* cur vires non recipiant. II. 8. 31. quæ parte dolent, in ea habebunt abscessum. IV. 32.
- Convulsio* ex repletione aut vacuatione oritur. VI. 39. a Veratro, IV. 16. eaque letalis, V. 1. a purgante medicamento, letale. VII. 25. ex profusa purgatione, malum. V. 4. ex vulnere, letalis V. 2. ex hæmorrhagia, malum. V. 3. VII. 9. ex melancholia, VI. 56. ex volvulo, malum. VII. 10. ex vigilia, malum. VII. 18. ex vehementibus ardoribus, malum. VII. 13. in febribus, malum. IV. 67. in febribus acutis, malum. IV. 66. a frigido. V. 17. 20. superveniens menstrialis fluentibus, malum. V. 56. quando tumores in ulceribus derepente disparent. V. 65.
- Convulsionem* indicat spiritus offensans (seu respiratio molesta) in febribus. IV. 68.
- Convulsioni* febrem advenire præstat, quam convulsionem febris. II. 26.
- Convulsionem solvis* superveniens febris. IV. 57. frigida affusa. V. 25. febris quartana V. 70. *mitigat* calidum, V. 22.
- Convulsionem pueris* familiares sunt. III. 25.
- Cordis vulnera* letalia sunt. VI. 18.
- Coryzæ*. Vid. *Gravedines*.
- Coxendicum dolores*. Vid. *Ischiades*.
- Craffi* celerius intereunt, quam graciles. II. 44.
- Craffa* præter naturam *feminae*, quare non concipiant. V. 46.
- Crisis difficilis* in febribus, quibus sexto die rigores contingunt. IV. 29. in febre, quæ quotidie eadem hora revertitur. IV. 30.
- Crisis* septimo die contingens, indicatur quarto, *urina* prodeunte rubra, nubeculam habente. IV. 71. per sudores

fudores in febribus, quibus diebus fiat. IV. 36.

*Crisi solvuntur morbi pueriles.* III. 28.

*Crisin indicantes dies.* Vid. *Dies.*

*Crisis* (Ante) de ciborum accessione detrahendum I. 19.

*Crisin* præcedit nox gravior, sequitur levior. II. 13.

*Crisi* (in), & jam perfecta crisi, nihil movendum. I. 20.

*Crisin* (post) quæ relinquuntur, recidivas faciunt. II. 12.

*Cucurbitula* ad mammas apposita sistit menstrua. V. 50.  
*Curaciones.* Vid. *Remedia.*

*Cutis* emollitur, extenuatur, a calido. V. 22.

*Cutem* habentes *aridam* & *duram*, sine sudore moriuntur; contra, quibus illa est *laxa* & *rara*. V. 71.

D.

**D***efusiones.* Vid. *Catarrhi.*

*Deglutitio* abolita, collo repente intorto, in febre, letale. IV. 35.

*Dejectiones.* Vid. *Alvi* dejectiones.

*Deliquium* animi. Vid. *Animi deliquium.*

*Delirium* fit ab osse perfecto. VII. 24. ex multo potu, malum. VII. 7. ab hæmorrhagia, malum. VII. 9. ex volvulo, malum. VII. 10. ab ictu in capite, malum. VII. 14. ex vigilia, malum. VII. 18. in febre continua cum asthma, letale. IV. 50.

*Delirium solvis* tremores in febribus ardentibus. VI. 26.  
*solvisur* somno. II. 2.

*Deliria cum risu* tutiora; cum studio adhibito, periculosiora. VI. 53.

*Dentibus inimicum* est frigidum, calidum utile. V. 18.

- - - adnascentes sordes glutinosæ, in febre, vehementiorem fore morbum significant. IV. 53.

*Desipientia.* Vid. *Delirium.*

*Diata.* Vid. *Vidus.*

*Diaphragmatis vulnera* letalia sunt. VI. 18. *dolores supra diaphragma* vomitorium indicant: *infra* illud, purgans per alvum. IV. 18.

*Diarrhæa solvis* leucophlegmatiam. VII. 29. in lippitudine prodest. VI. 17. in pleuritide, & peripneumonia, malum. VI. 16. succedit puris sputo. VII. 16.  
tabidis

- tabidis superveniens, letalis. V. 14.  
*Diarrhœam solvit* sponte superveniens vomitus. VI. 15.  
*Diarrhœa* (a) dysenteria. VII. 75.  
*Diarrhœa* regnant æstate. III. 21. pluviosis anni tempestacibus. III. 16. pueris sunt familiares. III. 25.  
*Diarrhœis diuturnis* obnoxii sunt inprimis balbi. VI. 32. & ætas virilis. III. 30.  
 - - - - (in) defectionum mutationes juvant, nisi in pravas commutentur. II. 14. excrementa spumosa, ex capite defluunt. VII. 30.  
*Dies indices*, seu crisis indicantes. II. 24.  
*Dysentia nervorum*. Vid. *Tetanus*.  
*Dolor* qua parte sentitur convalescentibus, illic futurus significatur abscessus. IV. 32. qua parte ante morbum fuerit, illic futurum abscessum notatur. IV. 33. quibus non sentitur, iis mens ægrotat. II. 6.  
*Dolores* num multum inter se differant, considerandum est. VI. 5. *vehementes circa viscera*, in febribus, malum. IV. 66. *ad articulos* fiunt post longas febres. IV. 44. VII. 63. & notant ægrum copiosioribus cibis uti. IV. 45. VII. 64. *laterum acuti* fiunt, quando tumores in ulceribus derepente evanescent. V. 65. *ad ventrem*, si sublimes, sunt leviores; non sublimes, vehementiores. VI. 7.  
*Dolore diuturno* (a) partium circa ventrem, suppuratio. VII. 22. *a vehementi* partium ad ventrem, extemporum frigus, malum. VII. 26.  
*Dolorem solvit* calidum, V. 22. torpor modicus, V. 25. ad hypochondrium sine inflammatione, febris superveniens. VI. 40. hepatis, febris. VII. 52.  
*Doloribus* (in) supra septum transversum, indicantur vomitoria; infra illud, purgantia. IV. 18.  
 - - - - (ex duobus), vehementior alterum obscurat. II. 46.  
*Dysenteria* fit a diarrhœa. VII. 75. quando tumores in ulceribus derepente evanescent. V. 65. ab atra bile ortum ducens, letalis. IV. 24. a sincera defectionis, malum. VII. 23. a mania, bonum. VII. 5. lienosis superveniens, bonum. VI. 48.  
*Dysenteria longa* lienosorum terminatur in hydropem, aut lenteriam, & hinc in mortem. VI. 43.  
*Dysenteria* regnant autumno. III. 22. post hiemen siccam & aquiloniam, cui successerit Ver pluvium & austrinum. III.

III. 11. post hiemem austrinam ac pluviam, si secutum fuerit Ver siccum & aquilonium, III. 12. in magnis siccitatibus. III. 16.

*Dysenteris* obnoxia est ætas virilis. III. 30.

- - - *longis* (in) appetitus prostratus, malum.

VI. 3.

*Dysenteria* (a) fit lienteria. VII. 76.

*Dysenterici* si veluti carunculas dejiciant, malum. IV. 26.

*Dyspnœa* in febre continua, letale. IV. 50.

*Dyspnœa* senibus familiares sunt. III. 31.

*Dysuria* ab aquilonia anni tempestate, III. 5. senibus est familiaris. III. 31.

*Dysuriam* solvit venæ sectio. VI. 36. VII. 48. vini potio. VII. 48.

E.

**E**brus derepente mutus factus, moritur convulsus, nisi &c. V. 5.

*Ectasis* a mania, bonum. VII. 5.

*Efflorescentiæ*. Vid. *Pustula*.

*Elleborus albus*. Vid. *Veratrum*.

*Emerica*. Vid. *Pomitoria*.

*Epilepsiæ* regnant Vere, III. 20. autumno, III. 22. per pluviosas anni tempestates. III. 16. familiares sunt Juvenibus. III. 29. qui liberationem accipiunt mutatione ætatis, & regionum, & victuum. II. 45. ante pubertatem contingentes, depositionem accipiunt; commoriuntur, quibus accidunt viginti quinque annos natis. V. 7.

*Erysipelas* fit ab ossis denudatione. VIII. 19. intro verti, malum; contrarium, bonum. VI. 25. in utero gravidæ, letale. V. 43.

*Erysipelati* utile frigidum. V. 23.

*Erysipelati* (ab) putredo, aut suppuratio, malum. VII. 20.

*Evacuatiōe* curantur morbi ex repletionē. II. 22.

*Evacuatiōes* quæ utiles. I. 2. 23. 25. ad extremum deductæ, periculosæ. I. 3. ducendæ sunt per loca convenientia, quo maxime vergunt. I. 21. ad animi defectionem quando fieri debeant. I. 23. Multæ & repentini, periculosæ. II. 51. Convalescentibus quando conferant. II. 8.

*Vol. II.*

I i

*Eunuchi*



*Eunuchi* neque podagra laborant, neque calvescunt. VI. 28.

*Exanthemata*. Vid. *Pustula*.

*Excrementa alvi*. Vid. *Alvi dejectiones*.

*Excretiones* per vesicam, alvum, & carnes &c. consideranda sunt, VII. 79. cum fauces ægrotant, aut tubercula in corpore exoriantur. II. 15. celeres fiunt a cibis multum & celeriter nutrientibus. II. 18. In febribus continuis quæ bonæ, quæ malæ. IV. 47.

*Exercitatio* Vid. *Labor*.

*Experientia fallax*. I. 1.

*Extenuata* corpora, quæ celeriter, quæ lente reficere oporteat. II. 7. In febribus magnis non extenuari, vel magis quam ratio postulat, quid significet. II. 28.

*Externa frigida*, dum interna uruntur, in febribus continuis, letale. IV. 48. VII. 72.

*Extrema*, in acutis morbis frigida, malum VII. 1. a vehementi dolore partium ad ventrem, malum. VII. 26.

## F.

**F**acies partes perversæ in febre continua, corpore jam imbecillo, mors in propinquo est. IV. 49. VII. 73.

*Faces alvinæ*. Vid. *Alvi dejectiones*.

*Fames* exsiccatur. VII. 59. Quibus conveniat. *ibid*. Nimiæ, non bonum. II. 4.

*Fame* (in) laborare non convenit. II. 16.

*Famen* solvit Vini potio. II. 21.

Conf. *Jejunium*.

*Fasidium cibi*. Vid. *Appetitus defectus*.

*Fauces* exasperantur ab aquilonia tempestate. III. 5. In earum affectibus, excretiones considerandæ sunt. II. 15.

*Febris* cerebro vulnerato supervenit. VI. 50. fluente sudore non remittens, malum. IV. 56. Revertitur, quæ non diebus imparibus demiserit. IV. 61. prehensens ebrium, qui derepente mutus factus, solvit malum. V. 5. superveniens vulvulo, ex stranguria orto, morbum tollit. VI. 44. Convulsioni, & tetano superveniens, solvit morbum. IV. 57. dolores ad hypochondrium citra inflammationem, solvit. VI. 40. Solvit capitis dolores derepente sanis contingentes. VI. 51. Solvit item hepatis dolorem. VII. 52.

*Febrem*

*Febrim* convulsioni advenire præstat, quam febrî convulsionem. II. 26.

- - - solvit aqua calida capiti affusa. VII. 42.

*Febres*, quibus sexto die rigores contingunt, difficilem habent judicationem. IV. 29.

- - - quæ quotidie eadem hora revertuntur, difficilem habent judicationem. IV. 30.

- - - quibus abscessus superveniunt, si primis judicationibus non solvantur, morbi longitudinem significant. IV. 51.

- - - in quibus quotidie rigores, quotidie solvuntur. IV. 63.

- - - pueris familiares sunt. III. 25.

- - - ex bubonibus omnes malæ, præter diarias. IV. 55.

*Febris* (in) copiosos sudores expectare oportet; cum ætas Veri similis est. III. 6.

- - - qui sudores boni IV. 36.

- - - lassitudinis sensus, significat futuros abscessus. IV. 31.

- - - fordes glutinosæ ad dentes, vehementiores fore febres designant. IV. 53.

- - - îsterus ante diem septimum obortus, malum; IV. 62. bonum contra, si die septimo, & postea, contingat. IV. 64.

- - - cardialgia, malum. IV. 65.

- - - pavores per somnos, aut convulsiones, malum. IV. 67.

- - - spiritus offensans, malum. IV. 68. VI. 54.

- - - *Urinæ* juvantes, quales. IV. 69. quæ habent sedimenta crassiori farinæ similia, longum fore morbum denunciant. VII. 31. subjugales quid notent. IV. 70.

- - - hypochondria sublata, murmurantia, quid significant. IV. 73.

- - - qui expectatur abscessus ad articulos, non fit, si quarto die fuit urina multa, &c. IV. 74.

*Febres acute* per squalores fiunt. III. 7. & ab autumno æquilonio ac sine pluviis. III. 14. item post hiemem siccam & æquiloniam, ac Ver pluviam & austrinum. III. 11. contingunt Juvenibus. III. 29.

*Febris acutis* (in) sudores frigidi mortem significant; in mitioribus, diurnitatem morbi. IV. 37.

- Febribus acutis* (in) convulsiones & circa viscera dolores vehementes, malum. IV. 66.
- - - lac dare, malum. V. 64.
- Febris ardens* a superveniente rigore solvitur. IV. 58.
- Febres ardentes* æstate. III. 21. iisque obnoxia ætas virilis. III. 30.
- Febribus ardentibus* (in) non multum sitiunt, qui patiuntur tussiculam siccam. IV. 54. contingentes tremores delirium solvit. VI. 26.
- Febres continuæ* regnant æstate. III. 21.
- - - tertia quaque die vehementius affligentes, periculosa: secus, si intermiserint. IV. 43. VII. 62.
- Febre continua* (in) rigor frequenter incidens, ægro jam debili, letale est. IV. 46. dyspnœa, & delirium, letale. IV. 50.
- - - faciei partes spasmò affectæ, deficientibus jam visu & auditu, corpore imbecillo, mors in propinquo est. IV. 49. VII. 73.
- Febribus continuis* (in) quæ excretionibus bonæ quæ malæ. IV. 47.
- - - Si partes externæ frigeant, internæ urantur, cum siti, letale est. IV. 48. VII. 72.
- Febris diuturna* adolescentibus familiares sunt. III. 27.
- - - erraticæ gignuntur autumno. III. 22.
- - - longæ in pluviosis anni tempestatibus accidunt. III. 16. tubercula ad articulos, vel dolores nunciant. IV. 44. VII. 63.
- Febribus longis* (in) lac dare convenit. V. 64.
- Febris tertiana exquisita* septem circuitibus judicatur. IV. 59.
- Febres tertianæ* regnant æstate. III. 21.
- - - *quartanæ* regnant æstate. III. 21. autumno. III. 22. æstivæ sunt breves, autumnales longæ. II. 25.
- - - *quartanæ* solvunt convulsionem. V. 70.
- Febribus quartanis* (in) hæmorrhagia narium, malum. VIII. 3.
- Febricitantium* corpora non extenuari, vel magis quam ratio postulat, malum. II. 28.
- Febricitantibus* lac malum. V. 64.
- - - - - cibis non dandus. VII. 65.
- Flatibus* non multum vexantur iſterici. V. 72.
- Fecunditas*. Vid. *Femina*.

*Femina*

*Femina* non est ambidextra. VII. 43. non tentatur podagra, nisi menses ipsi defecerint. VI. 29.

- - - num sterilis sit, an fœcunda, experimentum. V. 59.

*Femina* quæ sint steriles. V. 46. 62. quæ fœcundæ. V. 62.

*Fomentum* solvit oculorum dolores. VI. 31.

*Fractura*. Vid. *Ossa*.

*Frigidum* quæ inducat corpori mala. V. 17. 20. 24. quibus corporis partibus inimicum sit. V. 18. quando utile in tetano. V. 21. quæ adferat corpori commoda. V. 23. 25.

*Frigus* qua parte corporis sentitur, ibi morbus est. IV. 39.

- - - externorum, dum interna uruntur, in febribus continuis, letale. IV. 48. VII. 72.

- - - extremorum in acutis morbis, malum. VII. 1.

- - - a vehementi partium ad ventrem dolore, malum. VII. 26.

*Frigore* (a) morientibus partibus calidum gratum. V. 22. Conf. *Refrigerantia*.

*Furor*. Vid. *Mania*.

G.

*Gena* vulnus non coalescit. VI. 19.

*Genitalium* putredines gignuntur æstate. III. 21.

*Genitalibus* amicum calidum. V. 22.

*Geniura* humidior notat morbosam sanitatem. VI. 2.

*Genuum* gravitas indicat medicamentum catharticum. IV. 20.

*Gibbosi* ex asthma & tussi ante pubertatem, moriuntur. VI. 46.

*Gingivarum* pruritus, pueris familiares. III. 25.

*Glandularum* tumores. Vid. *Bubones*.

*Glaucedines* in senilem ætatem incidunt. III. 31.

*Graciles* non tam cito intereunt, quam crassi. II. 44.

*Gracilibus* vomitoria conducunt. IV. 6.

- - - - præter rationem, lac dare convenit. V. 64.

*Gravidines* gignuntur post autumnum pluvium & austrinum, quem præcesserit æstas sicca & aquilonia. III. 13. diuturnæ ab autumnio aquilonio & sine pluviis. III. 14.

- Gravidines* regnant Vere. III. 20. hieme, III. 23.  
 - - - in senibus non coquantur. II. 49.  
*Gravida* an sit foemina, qui cognoscatur. V. 41. 61.  
 marem, an foeminam gestet. V. 42.  
*Gravida* graciles præter naturam, abortiunt. V. 44.  
 mediocriter carnosæ quare abortiant. V. 45.  
 - - - non sunt foeminæ, quæ præter naturam sunt  
 crassæ. V. 46.  
 - - - febrientes, si vehementer attenuantur, difficul-  
 ter pariunt, vel abortiunt. V. 55.  
*Gravidarum* (e) mammis lac copiosum effluens, foetum  
 imbecillum significat. V. 52.  
*Gravidis* purgantia medicamenta quando exhibenda. IV.  
 I. V. 29.  
 - - - morbi acuti letales sunt. V. 30.  
 - - - venæ sectio abortum facit. V. 31. item diar-  
 rhœa. V. 34.  
 - - - abortionis periculum est, quando mammæ  
 gracilescent. V. 37. 53.  
 - - - erysipelas in utero, letale. V. 43.  
 - - - uteri os connivet. V. 51.  
 - - - si prodeant menstrua, foetus non bene valet.  
 V. 60.  
 - - - superveniens tenesmus abortum facit. VII. 27.

## H.

**H**abitus athleticus ad summum progressus solvi debet.  
 I. 3.

*Hamopyres* Juvenibus familiares sunt. III. 29.

*Hamorrhagia* in ulceribus, malum. VII. 21.

*Hamorrhagia* regnant Vere. III. 20.

- - - fiunt a calido frequenter usurpato. V. 16.

*Hamorrhagiis* superveniens convulsio, vel singultus,  
 malum. V. 3. VII. 9.

- - - frigidum utile. V. 23. lac malum. V. 64.

*Hamorrhagias* (post) in febribus, alvi humectantur. IV.

27.

*Hamorrhagia* narium solvit surditatem in febribus. IV.

60. & capitis dolorem. VI. 10.

- - - in foeminis, deficientibus menstruis, bo-  
 num. V. 33.

- - - in quartanis, malum. VIII. 3.

*Hamor-*

*Hæmorrhagia narium* adolescentibus familiares sunt. III.

27.

*Hæmorrhoides* incidunt in ætatem virilem. III. 30.

- - - solvunt maniam. VI. 21.

- - - supervenientes melancholicis, & nephriticis, bonum. VI. 11.

*Hæmorrhoidium* fluxum improvide suppressum consequi solet hydrops, vel tabes. VI. 12.

*Helleborus albus* Vid. *Veratrum*.

*Hepar* in istericis durum, malum. VI. 42.

- - aqua plenum, liquore in cavum abdominis effuso, æger moritur. VII. 55.

*Hepatis* vulnera letalia sunt. VI. 18.

- - - dolorem febris solvit. VII. 52.

*Hepate* (ab) inflammato singultus. V. 58. VII. 17.

*Herpetibus* exedentibus calidum utile. V. 22.

*Hiems* non omnibus æque utilis est. III. 2.

- - victum copiosum facillime fert. I. 15. 18.

*Hiemem* (post) siccam & aquiloniam, sequente vere pluvio & austrino, qui fiant morbi. III. 11.

- - austrinam & pluviam, succedente vere sicco & aquilonio, qui gignantur morbi. III. 12.

*Hieme* ventres sunt calidissimi. I. 15.

- - somni longissimi. *ibid.*

- - qui regnent morbi. III. 23.

- - per inferiora purgandum. IV. 4.

*Horror* a sudore, non bonum. VII. 4.

*Horrores* fiunt ab aquilonia tempestate. III. 5.

*Horrorem* solvit vini potio aqua temperati. VII. 56.

*Humidis* corporibus fames utilis. VII. 59.

*Hydrops* a leucophlegmatia. VII. 74.

- - ab hæmorrhoidibus improvide suppressis. VI. 12.

- - lienosorum superveniens longæ dysenterię, mortem adfert. VI. 43.

- - a Mania, bonum. VII. 5.

*Hydropem* solvit aqua ex venis in ventrem confluens. VI. 14.

*Hydopes* gignantur autumnio. III. 22.

*Hydrops* siccus quando timendus. IV. 11.

*Hydropici*, quibus omnis aqua simultanee educitur, omnino moriuntur. VI. 27.

*Hydropicorum* ulcera difficilia sanatu. VI. 8.

- Hydropicis* tussis superveniens, malum. VI. 35. VII. 47.  
*Hypochondria* sublata, murmurantia in febribus, quid futurum significant. IV. 73.  
 - - - - - elevata & murmurantia habentibus lac dare non convenit. V. 64.  
*Hypochondrii* dolores sine inflammatione, febris superveniens solvit. VI. 40.  
*Hysterica* passioni pellendæ conducit sternutatio. V. 35.

## I.

- I**ctus in febribus ante septimum diem, malum. IV. 62. bonum, si die septimo, &c. IV. 64.  
*Ictici* non multum flatulenti sunt. V. 72.  
*Ictericis* si hepar durum, malum. VI. 42.  
*Ieiunium* qua ætate magis vel minus toleretur. I. 13.  
*Ileus*. Vid. *Volvulus*.  
*Impetigines* regnant Vere III. 20.  
*Impura* corpora quo magis nutriuntur, eo magis læduntur. II. 10.  
*Infantes*. Vid. *Pueri*.  
*Inflammationibus* recentibus frigidum utile. V. 23.  
*Insania*. Vid. *Mania*.  
*Intestinorum* difficultas. Vid. *Dysenteria*.  
 - - - - - dolores indicant catharticum. IV. 20.  
 - - - - - levitas. Vid. *Lienteria*.  
 - - - - - tenuium vulnera letalia sunt. VI. 18. 24.  
*Intestino recto* (ab) inflammato fit stranguria. V. 58.  
*Ischiades* gignuntur autumno. III. 22.  
*Ischiata* diuturna detentis, si caput femoris ex suo articulo decidit & rursus incidit, iis mucores innascuntur. VI. 59. & sequitur tabes cruris, aut claudicatio. VI. 60.  
*Judicatio*. Vid. *Crisis*.  
*Judicium* difficile. I. 1.  
*Juvenes* melius degunt cum alvo humida, quam sicca. II. 53. magis ægrotant, quam senes. II. 39. optime degunt autumno adulto & hieme. III. 18. quibus morbis sint obnoxii. III. 29. *comitiales* liberationem accipiunt mutatione ætatis, regionis, victuum. II. 45.

Labor

L.

- L**abor non convenit in fame. II. 16.  
*Labores consuevi* facilius feruntur, etiam ab invalidis &  
 senibus, quam a robustis & juvenibus, qui illis non  
 assueti. II. 49.  
*Lac* quibus exhibere conveniat, quibus non. V. 64.  
*Lac in mammis* virginum a defectu menstruorum. V.  
 39.  
 --- copiosum e mammis gravidarum effluens, sætum  
 imbecillum significat. V. 52.  
*Lacrymæ* voluntariæ nihil mali portendant, contra,  
 quæ fiunt præter voluntatem. IV. 52. VIII. 2.  
*Languor*. Vid. *Torpor*.  
*Lassiitudines* sponte abortæ, morbos prænunciant. II. 5.  
*Lassiitudinis* a labore, quies remedium. II. 48.  
 - - - sensus in febribus, significat futuros absces-  
 sus. IV. 31.  
*Laterum dolor*. Vid. *Pleuritis*.  
*Lepra* regnant Vere. III. 20.  
*Leibargi* gignuntur hieme. III. 23. iis est obnoxia ætas  
 virilis. III. 30.  
*Leucoplegmatiam* diarrhœa solvit. VII. 29.  
*Leucoplegmatia* (a) hydrops. VII. 74.  
*Lichenæ*. Vid. *Impetigines*.  
*Lienes* magni gignuntur autumn. III. 22.  
*Lienosi*, superveniente longa dysenteria, hydropici  
 fiunt, aut lienterici, & pereunt. VI. 43.  
*Lienosis* superveniens dysenteria, bonum. VI. 48.  
*Lienteria* a dysenteria. VII. 76.  
 - - - lienosorum superveniens longæ dysenteria,  
 mortem adfert. VI. 43.  
*Lienteria* gignuntur autumn. III. 22. iis obnoxia est  
 ætas virilis. III. 30.  
*Lientericis* hieme non dandum vomitorium. IV. 12.  
 - - - superveniens ructus acidus, bonum est.  
 V. 1.  
*Lingua* de repente incontinens, atram bilem indicat.  
 VII. 40.  
*Lipobytmia*. Vid. *Animi deliquium*.  
*Lippiitudines* regnant æstate. III. 21. post hiemem siccam  
 &



- & aquiloniam, quam secutum fuerit Ver pluvium ac austrinum. III. 11. per magnas siccitates. III. 16.  
*Lippiudines arida*, post hiemem austrinam & pluviam, cui successerit Ver siccum & aquilonium. III. 12. ab autumno aquilonio ac sine pluviis. III. 14.  
*Lippienisibus* diarrhoea prodest. VI. 17.  
*Lumborum* dolor citra febrem, indicat medicamentum catharticum. IV. 20.  
 - - - dolores gignuntur hieme. III. 23.  
*Lumbrici*. Vid. *Vermes*.

## M.

- M***acilenti*. Vid. *Graciles*.  
*Mammæ* in gravidis *gracilescentes*, quid portendant. V. 37. 38. 53.  
*Mammæ solidae* in gravidis, valentem foetum significant. V. 52.  
*Mammis* (ex) gravidarum lac copiosum effluens, foetum imbecillum significat. V. 52.  
 - - - (in) collectus sanguis, maniam significat. V. 40.  
 - - - (in) virginum lac, notat menstruorum defectum. V. 39.  
*Mania* ex melancholia. VI. 56.  
 - - - significatur foeminis, quibus sanguis in mammis colligitur. V. 40.  
*Mania* regnant Vere, III. 20. autumno. III. 22.  
 - - - oriuntur, quando tumores in ulceribus derepente disparent. V. 65.  
*Maniam* solvunt supervenientes varices, vel hamorrhoides. VI. 21.  
*Mania* (a) dysenteria, aut hydrops, aut ectasis, bonum. VII. 5.  
*Mas*, an foemina, in utero gestetur, qui cognoscitur. V. 42. Mares uteri dextra parte, foemina sinistra magis gestantur. V. 48.  
*Medulla spinali* inimicum est frigidum, utile calidum. V. 18.  
*Melancholia* gignuntur Vere, III. 20. autumno. III. 22. autumno aquilonio & sine pluviis. III. 14.  
*Melancholiam* notant metus & tristitia, si diu perseverent. VI. 23. Me-

*Melancholia* (ex) apoplexia, aut convulsio, aut mania, aut cæcitas. VI. 56.

*Melancholici* largius per inferiora purgandi sunt. IV. 9.

*Melancholicis* supervenientes hæmorrhoides, bonum. VI. 11.

*Mens agrotat* iis, qui dolorem præsentem non sentiunt. II. 6.

*Mentis supor* a calido frequenter usurpato. V. 16.

*Mentis vehemens emotio*. Vid. *Ectasis*.

*Mente constare*, quovis in morbo bonum. II. 33.

*Menstrua baud debite prodeuntia*, & *decolorata*, purgationem indicant necessariam esse. V. 36.

- - - *fistuntur* apposita ad mammas cucurbitula. V. 50.

- - - si fluant in *gravida*, fœtus non bene valet. V. 60.

- - - non *prodeuntia*, quando notent fœminam esse gravidam. V. 61.

*Menstruorum* (circa) eruptionem solvuntur morbi pueriles. III. 28.

*Menstruis ducendis* apti sunt suffitus odoramentorum. V. 28.

- - - erumpentibus sistitur vomitus cruentus. V. 32.

- - - fluentibus accedens convulsio, & animi deliquium, malum. V. 56.

- - - fluentibus copiosioribus, & non prodeuntibus, eveniunt morbi. V. 57.

- - - deficientibus hæmorrhagiam nariam contingere, bonum. V. 33.

- - - deficientibus, lac in mammis. V. 39.

*Methodus medendi* non temere mutanda. II. 52.

*Melus* perseverans melancholiam notat. VI. 23.

*Micus sanguinis* significat venulam in renibus ruptam. IV. 78. cum grumis, cum stranguria, doloreque in imo ventre & interfœmineo, partium circa vesicam vitium notat. IV. 80. VII. 39.

*Morbus est*, qua parte corporis sudor est. IV. 38. qua parte corporis calor est, aut frigus. IV. 39.

*Morbi summa vehementia* tenuissimum postulat victum. I. 8.

*Morbi vigorem* (ante) quo victu utendum. I. 9. 10. & in ejus exacerbationibus. I. 11. & ante ejus judicationem.

I. 19. *Morbi*

*Morbi longitudo* nunciatur, ubi corpus alternatim & refrigeratur & incalescit, vel color alius ex alio oritur.

IV. 40. VII. 60. quando febrientibus fluunt urinæ cum sedimentis crassiori farinæ similibus. VII. 31.

*Morbo diuturno* (in) ciborum fastidium, malum. VII. 6.

- - - *diuturno* (a) alvi fluor, malum. VIII. 5.

*Morbi eveniunt* a menstribus non prodeuntibus, & ab iis fluentibus copiosioribus. V. 57. a tempestatibus anni III. 1.

- - - alii *ad alias anni tempestates* bene, vel male habent. III. 3.

- - - an *futuri* iudicatu *difficiles* vel faciles, *breves* vel longi, indicant urinæ, alvi excrementa & sudores. I. 12.

- - - *constantes* & *faciles* fiunt iudicatu in tempestatibus anni tempestivis & constantibus; contra in inconstantibus. III. 8.

- - - *summi* summas postulant curationes. I. 6.

- - - *ex repletione* curantur evacuatione. II. 22.

*Morborum consideratio necessaria* in evacuationibus. I. 2.

- - - *accessiones* & conditiones, per quæ indicentur. I. 12.

- - - *initia*, (per) si quid movendum videtur, moveri debet: cum vero vigent, quiescere præstat. II. 29. Ratio. II. 30.

- - - bilem atram supra, vel infra prodire, letale. IV. 22.

- - - *initia* (circa) cibum fastidientes melius degunt, quam qui illum bene sumunt. II. 32.

- - - *reversiones*. Vid. *Recidiva*.

*Morbos prænunciant* lassitudines sponte obortæ. II. 5.

*Morbis* (in) quæ præter rationem eveniunt mala, non admodum timenda, nec bonis fidendum. II. 27.

- - - minus periclitantur, quorum naturæ, ætati, habitui & anni tempestati illi magis fuerint cognati. II. 34. VIII. 1.

*Morbi acuti* intra dies quatuordecim iudicatione terminantur. II. 23. raro ferunt purgationes. I. 24. gravis sunt letales. V. 30.

*Morbum acutum* significant urinæ cum sedimentis biliosis, supra tenuibus. VII. 32.

*Morborum acutorum prædictiones* non certæ sunt. II. 19

*Morbis*

- Morbis acutis* (in) quando purgandum. I. 24.  
 - - - extrema frigida, malum. VII. 1.  
*Morbis peracutus* statim extremos habet labores, & extreme tenuissimum requirit viſum. I. 7.  
 - - - valde acutis (in) quando purgante medicamento utendum. IV. 10.  
*Morbi acutissimi* sunt per autumnum. III. 9.  
*Morbos autumnales* per anni tempestates expectare convenit, quando eodem die modo calor, modo frigus fit. III. 4.  
*Morbis lateralis*. Vid. *Pleuritis*.  
*Morbi pueriles* judicatione solvantur &c. III. 28.  
*Morbis regius*. Vid. *Icterus*.  
*Mors subita* expectat eos, qui frequenter &c. animo linquantur. II. 41.  
*Mors corporis* convenit a veratro sumpto. IV. 14. 15.  
 Conf. *Labor*.  
*Mulier*. Vid. *Femina*.  
*Mutationes paulatim inducæ* securæ sunt. II. 51.  
 - - - in corpore contingentes caloris & frigoris, morbi longitudinem significant. IV. 40. VII. 60.  
 - - - frigoris, & caloris, in tempeſtatibus anni, morbos pariunt. III. 1.  
*Mutus* fit, cui cerebrum concuſſum. VII. 58.  
 - - - ab ebrietate, convuſus moritur niſi eum febris prehendaſ, &c. V. 5.  
*Muti a capitis doloribus* derepente in ſanitate contingentibus, liberantur ſuperveniente febre, alias intra ſeptem dies pereunt. VI. 51.

N.

- N***ares natura humidiores* ſunt valetudinariis. VI. 2.  
*Narium humiditates* familiares ætati ſenili. III. 31.  
 - - - hæmorrhagia. Vid. *Hæmorrhagia*.  
*Nares* (per) effluens pus, aut aqua, aut ſanguis, ſolvit capitis dolorem. VI. 10.  
*Naturæ* aliæ ad æſtatem, aliæ ad hiemen bene, vel male habent. III. 2.  
*Nephræides* incidunt in ætatem ſenilem. III. 31.  
*Nephræicis* ſupervenientes hæmorrhoides, bonum. VI. 11. abſceſſus fieri ad externa, vel interna loca, quibus doceatur ſignis. VII. 36. *Nervi*

- Nervi vulnerati* non coalescunt. VI. 19. VII. 28.  
*Nervorum distensio.* Vid. *Titanus*.  
 - - - - *impotentia* a calido frequenter usurpato. V.  
 16.  
*Nervis inimicum* est frigidum, utile calidum. V. 18.  
*Nigredines* a frigido. V. 17. 20.  
*Nimum* omne naturæ inimicum. II. 51. 4. in visu. I.  
 4. II. 4. 17. in somno & vigilia. II. 3. VII. 71.  
*Nox* crisin præcedens gravis, sequens levior. II. 13.

## O.

- O***bsessi.* Vid. *Craffi*.  
*Occasio* præcept. I. 1.  
*Oculi rubentes* a vomitu, malum. VII. 3.  
*Oculorum humiditates* sunt in ætate senili. III. 31.  
 - - - *dolores* solvit meri potio, aut balneum, aut  
 fomentum, aut venæ sectio, aut medicamentum pur-  
 gans. VI. 31. VII. 46.  
*Oculis* (ex) subapparens album in somno, pravum si-  
 gnum est. VI. 52.  
*Conf. Visus*.  
*Omentum* excidens computrescat necesse est. VI. 58.  
 - - - os uteri comprimens, impedit conceptum. V.  
 46.  
*Ophthalmia.* Vid. *Lippitudines*.  
*Oris* exulcerationes regnant ætate. III. 21.  
 - - - ulcera serpentina. Vid. *Aphisa*.  
*Os amarulentum* indicat vomitorium. IV. 17.  
*Osse denudatione* (ab) erysipelas. VII. 19.  
*Osse agrotante* (ex) caro livida, malum. VII. 2.  
 - - *persecutio* (ab) delirium, &c. VII. 24.  
*Ossum vulnera* non consolidantur. VI. 19. VII. 28.  
 - - - *fracturis* confert calidum. V. 22.  
 - - - *abscessus* ab ulceribus inveteratis. VI. 45. ex spha-  
 celismo. VII. 77.  
*Ossibus inimicum* est frigidum, utile calidum. V. 18.  
*Oscitationem* solvit potio vini aqua temperati. VII. 56.

## P.

- P***alpebra* non commissæ per somnum, signum pravum  
 est. VI. 52.  
*Papula*

*Papule.* Vid. *Pustulae*.

*Partus difficilis* expectandus est, quando gravida febriens vehementer extenuatur. V. 55.

*Partus difficili* (in) conducit sternutatio. V. 35.

*Partus* imbecilli, & morboſi, quali anni tempeſtate expectandi. III. 12.

*Pavores* pueris familiares ſunt. III. 24. per ſomnos in febris, malum. IV. 67.

*Pectori* inimica frigida. V. 24.

*Pectorum dolores* gignuntur hieme. III. 23.

*Perfrigerata.* Vid. *Refrigerata*.

*Peripneumonia* ex pleuritide, malum. VII. 11.

*Peripneumonia* obnoxia ætas virilis. III. 30.

- - - ſupervenienti diarrhœa, malum. VI. 16.

*Peripneumonia* (ex) phrenitis, malum. VII. 12.

*Peripneumonia* gignuntur hieme. III. 23.

*Phlegma.* Vid. *Pituita*.

*Phrenitis* ex peripneumonia, malum VII. 12.

- - - in ætate quadraginta annis majore, non admodum ſanatur. VIII. 1.

- - - incidit in virilem ætatem III. 30.

*Phreniticorum urina* pellucidæ, albæ. IV. 72.

*Phibifis.* Vid. *Tabes*.

*Pingues.* Vid. *Craſſi*.

*Pituita* inter diaphragma & ventrem concluſa, dolorem exhibens, per venas in veſicam verſa morbum ſolvit. VII. 54.

*Plenitudines* ad extremum progreſſæ, graves ſunt I. 4.

*Pleuritis* longa, an brevis futura, qui per ſputum judicetur. I. 12. niſi ſuperne expurgetur intra quatuordecim dies, in ſuppurationem abit. V. 8. quando in tabem tranſeat. V. 15.

- - - oritur ab aquilonia tempeſtate. III. 5.

*Pleuritides* regnant hieme. III. 23.

*Pleuritidi* obnoxia ætas virilis. III. 30. non admodum obnoxii, qui acidum eructant. VI. 33.

- - - ſupervenienti diarrhœa, malum. VI. 16.

*Pleuritide* (ex) peripneumonia, malum. VII. 11.

*Podagra* vere & autumno fere movetur. VI. 55.

- - - in quadraginta diebus decedit. VI. 49.

*Podagram* minuit aſuſa frigida. V. 25.

*Podagra* non tentantur eunuchi. VI. 28. nec mulieres, niſi cum menſtrua defecerint. VI. 29. nec pueri ante Veneris uſum. VI. 30.

*Potus*

- Potus suavior*, etſi pejor, meliori ſed minus grato antepo-  
nendus. II. 38.
- Potu repleti*, quam cibo, proclivius eſt. II. 11.
- Potu multo* (ex) rigor, & delirium, malum. VII. 7.
- Præcordia*. Vid. *Hypochondria*.
- Pregnantes*. Vid. *Gravida*.
- Preputii* vulnus non coaleſcit. VI. 19.
- Pruritus* totius corporis familiaris ſenibus. III. 31.
- Pubertatem* (circa) ſolvuntur morbi pueriles. III. 28.
- Pudenda*. Vid. *Genitalia*.
- Pueri* minime omnium tolerant jejunium. I. 13. ratio.  
I. 14. optime degunt verè & prima æſtate. III. 18.  
non tentantur podagra ante Veneris uſum. VI. 30.
- Puerorum morbi*. III. 24. 25. 26. qui ſolvantur judicatione.  
III. 28.
- Pulmonum inflammatio*. Vid. *Peripneumonia*.
- Purgandum* æſtate per ſuperiora, hieme per inferiora.  
IV. 4.
- Purgans medicamentum* ſolvit oculorum dolores. VI. 31.  
Vere exhibendum eſt. VI. 47.
- Purgantia medicamenta* quando gravidis exhibenda. IV.  
1. V. 29. ſub canis ortum, & ante illum, moleſta ſunt.  
IV. 5. modice carnoſis conveniunt. IV. 7. conveniunt  
melancholicis. IV. 9. quando conferant in valde acutis.  
IV. 10. quando indicentur. IV. 18. 20. conveniunt in menſtruis non debite prodeuntibus, & decoloratis. V. 36.
- Purgante medicamento* ſumto, purgandi finis non fit donec ſentiatuſ ſitis. IV. 19.
- - - medicamento (a) convuſſio, letale. VII. 25.
- Purgatio* quæ bona. I. 2. 23. 25. IV. 2. 3.
- - - coctorum, non crudorum, neque per initia, fieri debet. I. 22.
- - - in morbis acutis raro confert. I. 24.
- - - requirit corpora ad fluxum præparata. II. 9.  
VII. 70.
- - - non convenit ſanis, nec iis qui pravo utuntur cibo. II. 36. 37.
- Purgationem* (ad) parum tutus eſt venter imus tenuis. II. 35.
- Purgatione immodica* (a) convuſſio, aut ſingultus, malum. V. 4. VII. 41.
- Pus* in thorace collectum quibus ſimultanee omne evacuat, omnino moriuntur. VI. 27. *Puris*

*Puris collectio* fit, quando tumores in ulceribus derepente evanescunt. V. 65.

- - - *nota*. boni, atque pravi. VII. 44. 45.

- - - *generationem* impedit frigidum. V. 20. calidum promovet. V. 22.

- - - *generationem* (circa) dolores & febres contingunt magis, quam pure confecto. II. 47.

*Conf. Suppuratio.*

*Pusula lata* raro pruriginosa. VI. 9.

- - - *ulcerosa* regnant vere. III. 20.

*Putredo* ab erysipelate, malum. VII. 20.

*Putredines* fiunt in pluviosis anni tempestatibus. III. 16.

Q.

**Q***uartana.* Vid. inter *Febres*.

*Quies*, lassitudinis a labore remedium. II. 48.

R.

**R***aucedines* fiunt post autumnum pluvium & austrinum, quem præcesserit æstas sicca & aquilonia. III. 13. regnante vere, III. 20. autumno. III. 23.

*Raucedines* in senibus non coquuntur. II. 40.

*Recidiva* fiunt a relictis post crisin. II. 12.

*Recidiva febris* expectanda est, quæ non diebus imparibus dimiserit. IV. 61.

*Refeciones* ad summum progressæ, periculosa. I. 3. Quibus conferant celeres, quibus lentæ. II. 7.

*Refrigerantia* conveniunt in vomitu cruento. VII. 37.

*Refrigerare* confertim & repente, periculosum. II. 51.

*Refrigerata* calefacere oportet, &c. V. 19.

*Regionis consideratio* necessaria est in evacuationibus. I. 2. & in præscriptione victus. I. 17.

*Regionum mutatio* juvenibus comitialibus liberationem adfert. II. 45.

*Remedia* sunt, quæ morbis contraria sunt. II. 22.

- - - summa conveniunt in summis morbis. I. 6.

- - - extrema sunt ferrum & ignis. VIII. 6.

*Renum dolores.* Vid. *Nepbritides*.

- - - exulceratio significatur, si cum urina sanguis, aut pus, redditur. IV. 75.

*Vol. II.*

K k

*Renum*



*Renum* vitium notatur, quando cum urina crassa carunculae, aut veluti pilli simul exeunt. IV. 76.

- - - morbum longum significant urinæ cum bullis.

VII. 34. morbum acutum, urina pinguis. VII. 35.

- - - *viis in senibus* ægre curantur. VI. 6.

*Renibus* (a) suppuratis stranguria. V. 58.

- - - (in) venulam ruptam esse, significat mictus sanguinis. IV. 78.

*Repleri* confertim & repente, periculosum. II. 51.

*Repletiones* facilius fiunt potu, quam cibo. II. 11.

*Repletionis* (ex) facti morbi curantur evacuatione. II. 22.

Conf. *Plenitudines*.

*Respiratio difficilis*. Vid. *Dyspnœa*.

- - - *molesta* in febribus, malum est, convulsionem enim indicat. IV. 68. VI. 54.

*Rigor* ex multo potu, malum. VII. 7.

- - - superveniens febri ardenti, solvit morbum. IV. 58.

- - - frequenter incidens, in febre continua, ægro jam debili, letale. IV. 46.

*Rigores ex qua parte* corporis incipiant in mulieribus, & in viris. V. 69.

- - - *febriles* a frigido. V. 17. 20.

- - - *sexto die* in febribus contingentes, difficilem faciunt judicationem. IV. 29.

- - - *quotidie* in febribus fientes, quotidie illas solvunt. IV. 63.

- - - *mitigat* calidum. V. 22.

*Ructus acidus* lenterix superveniens, bonum est signum. VI. 1.

*Ructibus acidis obnoxii* non admodum pleuritici fiunt. VI. 33.

*Rupta*, quæ ex dorso ad cubitos descendunt, venæ sectio solvit. VI. 22.

## S.

*Sanguis sursum ejectus*, malum; deorsum decedens, bonum. IV. 25.

*Sanguis spumans* spuitione rejectus, venit ex pulmone. V. 13.

- - - *in ventrem effusus*, in pus vertitur. VI. 20.

*Sanguinis profusio*. Vid. *Hæmorrhagia*.

- - - *spuitiones*. Vid. *Hæmoptyses*.

*Sand*

*Sani* moleste ferunt medicamenta purgantia. II. 36. 37.  
iis periculosum Veratrum. IV. 16.

*Saritas nimia*, non bonum. II. 4.

*Saryriasm* gignuntur in ætate puerili. III. 26.

*Scrophula*. Vid. *Siruma*.

*Secundinis* excludendis conducit sternutatio. V. 49.

*Sedes*. Vid. *Anus*.

*Semen*. Vid. *Genitura*.

*Senes* facillime jejunium tolerant. I. 13. ratio. I. 14.

- - - Juvenibus minus ægrotant, at morbis correpti  
chronicis, commoriuntur. II. 39.

- - - optime degunt adulta ætate, & autumnò primo.  
III. 18. pejus degunt cum alvo humida, quam sicca.

II. 53.

- - - quam ob rem non adeo obnoxii febribus acutis.  
I. 14.

- - - Quibus pateant morbis. III. 31.

*Senibus* a nimia purgatione supervenit singultus. VII.

41.

- - - (in) raucedines & gravedines non coquantur.  
II. 40.

- - - renum & vesicæ vitia ægre curantur. VI. 6.

*Septum transversum*. Vid. *Diaphragma*.

*Siccitas aëris* ex vehementi æstu, febres facit. III. 7.

*Singultus* fit a repletionem, aut vacuationem. VI. 39. ab  
hepate inflammato. V. 58. VII. 17.

- - - a magna hæmorrhagia, malum. V. 3.

- - - ab immodica purgatione, malum. V. 4. VII.

41.

- - - a vomitu, malum. VII. 3.

- - - ex ileo, malum. VII. 10.

*Singulum solvit* sternutatio. VI. 13.

*Sitis in febribus* continuis, cum externa frigent & in-  
terna urantur, letale. IV. 48. VII. 72.

- - - a sumptu cathartico, completam purgationem signi-  
ficat. IV. 19.

*Sitim nocturnam* somnus sedat. V. 27.

*Siti* non multum vexantur in febribus ardentibus, qui  
patiuntur tussiculam siccam. IV. 54.

*Siticulosi* lac dare, malum. V. 64.

*Somnus* in morbo laborem faciens, letale. II. 1.

- - - modum excedens, malum denunciat. II. 3. VII.

71.

- Somnus* delirium sedat. II. 2. & sitim. V. 27.  
 - - - sistit operationem veratri. IV. 15.  
*Somni* longissimi hieme & vere. I. 15.  
*Somno* (in) palpebræ non commissæ, prævum signum.  
 VI. 52.  
*Sorbtiones* non purgata alvo datæ nocent. VII. 67.  
*Spasmus*. Vid. *Convulso*.  
*Sphacelismo* (ex) ossis abscessus. VII. 77.  
*Splenesici*. Vid. *Lienosi*.  
*Sputum pleuriticorum* quomodo brevem aut longum futurum morbum denunciet. I. 12.  
*Sputi* exscreationes in *febris* *continuis* quæ bonæ, quæ malæ. IV. 47. VII. 69.  
*Sputo sanguinis* (ex), sputum puris, malum. VII. 15. 78.  
 - - - *puris*, tabes & fluxus: si illud sistitur, æger moritur. VII. 16.  
*Squalor*. Vid. *Siccitas aëris*, &c.  
*Satura corporis longa*, decora in juventute; inutilis, & brevitate deterior, in senectute. II. 54.  
*Sterilitas*. Vid. *Famina* & *Viri*.  
*Sternutatio* utilis in hysterica passione & in difficili partu. V. 35. conducit secundinis excludendis. V. 49. solvit singultum. VI. 13.  
 - - - - quo modo fiat. VII. 51.  
*Strangulati*, & dissoluti, nec dum mortui, non redeunt ad vitam, si spuma circa os. II. 43.  
*Stranguria* fit ab inflammatione intestini recti, & uteri, item a renibus purulentis. V. 58. regnat in tempore anni magnis siccitatibus. III. 16. in autumno. III. 22. infestat maxime ætatem puerilem, III. 26. & senilem. III. 31.  
*Stranguriam solvit* vini potio, & venæ sectio. VII. 48.  
*Stranguria* (ex) Volvulus in septem diebus occidit, &c. VI. 44.  
*Struma* gignuntur in puerili ætate. III. 26.  
*Stupor*. Vid. *Apoplexia*.  
*Sudamina*, seu papulæ sudorose, æstate fiunt. III. 21.  
*Suder* qua parte corporis, ibi morbus. IV. 38.  
 - - - in febre, si non levat, malum. IV. 56.  
 - - - *multus*, humoris copiam significat. VII. 61.  
 - - - a somno citra causam manifestam, quid significet. IV. 41. semper fluens, si frigidus, majorem morbum significat, si calidus, minorem. IV. 42.

Suder

*Sudor frigidus* in febre acuta, mortem; in mitiori, morbi longitudinem significat. IV. 37.

*Sudores indicant* morbos fore judicatu faciles vel difficiles, breves vel longos. I. 12.

- - - *critici*, quales. VIII. 4. in febribus, quibus diebus contingant. IV. 36.

*Sudore* (a) horror, non bonum. VII. 4.

*Suffusus* odoramentorum menstruis ducendis apti habentur; sed inferunt capitis gravitatem. V. 28.

*Suppuratio* ab erysipelate, malum. VII. 20.

- - - a diuturno dolore partium circa ventrem, malum. VII. 22.

- - - a catarrhis fit in viginti diebus. VII. 38.

*Suppuratum* quid in corpore existens, quando nullum sui signum præbeat. VI. 41.

Conf. *Pus*.

*Surditas* finitur exortis biliosis alvi defectionibus, & eadem oborta, illæ cessant. IV. 28. in febribus, solvitur superveniente hæmorrhagia narium. aut alvi profluvio. IV. 60.

T.

*T*abes ab hæmorrhoidibus improvide suppressis. VI. 12. ex puris sputo. VII. 16. ex sanguinis vomitu.

VII. 78. quando ex pleuritide expectanda. V. 15. quibus signis notetur letalis. V. 11. 12. 14.

*Tabes* contingit post autumnum pluvium & austrinum, qui successerit æstati sicca & aquilonia, III. 13. & per magnas siccitates. III. 16.

- - - regnat autumnus. III. 22.

- - - juvenilem maxime ætatem occupat. III. 29. ab anno 18 ad 35. V. 9.

*Tabem* (ad) a natura dispositis non conveniunt vomitoria. IV. 8.

*Tabidis* autumnus malus. III. 10.

- - - lac dare convenit. V. 64.

*Tempestatum anni* consideratio necessaria in evacuationibus, I. 2. & in victus ratione præscribenda. I. 15. 17. 18.

- - - mutationes, morbos pariunt, vel exacerbant. III. 1. 19. aliæ aliis morbis, & aliis ætatibus, utiles sunt. III. 3.

*Tempestates anni* (per), quando eodem die modo calor, modo

- modo frigus fit, morbi producuntur autumnales. III. 4.
- Tempestasibus* (in) constantibus & tempestivis, morbi constantes & judicatu sunt faciles; & contra. III. 8. in universum siccae pluviosis sunt salubriores. III. 15. per pluviosas qui morbi, & per siccas. III. 16.
- Tensismus* mulieri gravidæ superveniens, abortum facit. VII. 27.
- Tertiana*. Vid. *Febris*.
- Tetanus* a frigido. V. 17. 20. quando tumores in ulceribus derepente disparent. V. 65.
- - - ex vehementibus ardoribus, malum. VII. 13.
  - - - interficit intra quatuor dies. V. 6.
- Tetanus* solvit superveniens febris. IV. 57.
- - - mitigat calidum. V. 22.
- Tetano* (in) quando frigidæ affusio utilis. V. 21.
- Tonillarum* inflammationes pueris familiares. III. 26.
- Torpor* corporis ab austrina aëris constitutione. III. 5. 17.
- - - mediocris, dolorem solvendi facultatem habet. V. 25.
- Tremores* in febribus ardentibus delirium solvunt. VI. 26.
- Tristitia* perseverans melancholiam notat. VI. 23.
- Tubercula* in corpore, requirunt considerationem excretionum. II. 15.
- - - regnant Vere. III. 20.
  - - - sunt pueris familiaria. III. 26.
  - - - ad articulos fiunt a febribus longis. IV. 44.
- VII. 63. significant ægrum copiosioribus cibis uti. IV. 45.
- Tuberculo* (a) intus rupto exsolutio, vomitus & animi deliquium. VII. 8.
- Tuberculo, urethra* (de). vid. *Urethra*.
- Tumores in ulceribus*, bonum; derepente autem disparentes, malum. V. 65.
- - - in vulneribus, qui boni, qui mali. V. 67.
- Tumorum absentia* in vulneribus, ingens malum. V. 66.
- Tussis hydropicis* superveniens, malum. VI. 35. VII. 47.
- Tusses* ab aquilonia tempestate. III. 5. post autumnum pluvium & austrinum, quem præcesserit æstas sicca & aquilonia. III. 13.
- - - regnant Vere, III. 20. hieme. III. 23.

*Tusses*

*Tusses* pueris familiares sunt, III. 24. & senibus. III.

31.

*Tuss* (ex) qui gibbosi fiunt, ante pubertatem moriuntur. VI. 46.

V.

*Valetudinarii* habent nares humidiores, & genituram humidiores. VI. 2.

*Varices* solvunt maniam. VI. 21.

- - - magni non fiunt calvis. VI. 34.

*Vena sectio* gravidis abortum facit. V. 31.

- - - in fronte prodest adversus capitis dolores. V. 68.

- - - solvit rupta, VI. 22. oculorum dolores, VI. 31.

VII. 46. dysuriam, VI. 36. VII. 48. stranguriam, VII. 48.

- - - Vere fieri debet. VI. 47. VII. 53.

*Venter imus*. Vid. *Abdomen*.

*Ventres calidissimi* hieme & Vere. I. 15.

*Ventriculi oris morsus*. Vid. *Cardialgia*.

*Ventriculi vulnera* letalia sunt. VI. 18.

*Ver* visum copiosum fert, post hiemen, facillime. I. 15. 18.

--- saluberrimum est, & minime letale. III. 9.

--- pluvium & austrinum, succedens hiemi siccae & aquiloniae, quales producat morbos. III. 11. siccum & aquilonium, succedens hiemi austrinae & pluviae, quos faciat morbos. III. 12.

*Vere* qui regnent morbi. III. 20.

- - - podagra ut plurimum movetur. VI. 55.

- - - ventres calidissimi sunt, & somni longissimi. I. 15.

- - - optime degunt pueri & adolescentes. III. 18.

- - - venam secare & medicamentum purgans exhibere convenit. VI. 47. VII. 53.

*Veratrum* sanis periculosum, convulsionem enim inducit. IV. 16.

*Veratri sumpti* actio uti promoveatur. IV. 14. ante illius potionem qui corpus præparandum. IV. 13.

- - - nimia operatio quomodo sistenda. IV. 15.

*Veratro* (ex) convulsio letalis. V. 1.

*Vermes* gignuntur in ætate puerili. III. 26.

*Verruca* peniles familiares pueris. III. 26.

*Vertebra* ad occipitium luxationes contingunt pueris. III. 26.

*Virigines* ab austrina aëris constitutione. III. 17. regnant hieme. III. 23. infestant senilem ætatem. III. 31.

*Vesicae exulceratio* significatur, si cum urina sanguis, aut pus, redditur. IV. 75. 81.

- - - *scabies* denotatur, quando cum urina crassa fursuri similia quædam simul exeunt. IV. 77.

- - - amicam calidum. V. 22.

- - - vitia in senibus ægre curantur. VI. 6.

- - - vulnera letalia sunt. VI. 18.

- - - quæ per *Vescicam* prodeunt, considerata sunt. VII. 66.

*Vigius tenuis* & exquisitus in morbis parum tutus, I. 4. etiam sanis parum tutus est, & periculosior, quam paulo plenior. I. 5.

- - - *extreme tenuissimus* convenit in morbo peracuto, I. 7. & in morbi summa vehementia. I. 8.

- - - *paulo plenior* sanos minus lædit, quam tenuis & accuratus, I. 5. ac convenit in morbo, qui ab extremis recessit. I. 7. convalescentibus est inutilis. II. 8. lædit impura corpora. II. 10.

- - - *plenior* convenit hieme, & vere. I. 15.

- - - morbum creat. II. 17. tubercula producit atque dolores ad articulos. IV. 45. VII. 64.

- - - *conferit & celeriter nutriens*, celeres facit excretiones. II. 18.

- - - *humidus* quibus conferat. I. 16.

- - - *suavior, etsi peior*, meliori, ast minus grato, anteponendus. II. 38.

- - - *ratio* ante morbi vigorem. I. 9. 10. in exacerbationibus. I. 11. ante crisin. I. 19.

- - - *ratione* (in) præscribenda concedendum est aliquid tempori, regioni, ætati & consuetudini. I. 17.

- - - *mutatio* juvenibus comitialibus liberationem adfert. II. 45.

*Vigilia modum excedens*, malum denunciat. II. 3. VII. 71.

*Vigilia pueris familiares*, III. 24. & senibus. III. 31.

*Vigiliis* (ex) convulsio, vel dilirium, malum. VII. 18.

*Vini potio sol it famem*. II. 21. oculorum dolores. VI. 31. VII. 46. stranguriam & dysuriam. VII. 48. anxietatem, oscitationem, horrorem. VII. 56.

*Viri* optime degunt autumnò adulto, & hieme. III. 18. quibus sint obnoxii morbis. III. 30. quibus de causis steriles IV. 63.

*Virium*

*Virium exsolutio* contingit a rupto intus tuberculo.  
VII. 8.

*Virus caligo*, ab austrina aëris constitutione. III. 5. fe-  
nili ætati est familiaris. III. 31.

*Virus deficiens*, in febre continua, corpore jam imbe-  
cillo, mortem notat in propinquo. IV. 49.

*Vita brevis* est. I. 1.

*Vinligines* regnant vere. III. 20.

*Ulcera circum glabra* sunt maligna. VI. 4.

- - - *hydropicorum* non facile sanantur. VII. 8.

*Ulcus frigidum* mordax est. V. 20, confert *calidum*.  
V. 22.

- - - (in) *tumores*, bonum: qui si derepente evane-  
scant, malum. V. 65.

- - - a forti arteriæ pulsu sanguinis eruptio, malum.  
VII. 21.

*Ulcus inveteratis* (ab) ossium abscessus, & cicatrices  
cavæ. VI. 45.

*Umbilici inflammationes* ætati puerili familiares sunt. III.  
24.

*Vocis defectio*. Vid. *Mutus*.

*Volulus ex stranguria* in septem diebus occidit, nisi fe-  
bre accedente copiosa urina fluat. VI. 44.

*Voluli* gignuntur autumnus. III. 22.

*Volulo* (ex) vomitus, aut singultus, aut convulsio,  
aut delirium, malum. VII. 10.

*Vomitiva* æstate convenient. IV. 4. conferunt gracili-  
bus. IV. 6.

- - - quando indicentur. IV. 17. 18. ante ea qui  
corpus præparandum. VII. 70.

- - - reformidanda sunt ad tabem a natura disposi-  
tis, IV. 8. & lientericis. IV. 12.

*Vomitum spontaneum* qualis conducat. I. 2.

- - - solvit diurnam diarrhoeam. VI. 15.

- - - regnat æstate. III. 21.

- - - ætati puerili est familiaris. III. 24.

- - - accidit a rupto intus tuberculo. VII. 8.

- - - ex illo, malum. VII. 10.

- - - *bilis* cerebro vulnerato supervenit. VI. 50.

- - - *cruentus* citra febrem, salutaris, cum febre ma-  
lus: curandus refrigerantibus & adstringentibus.  
VII. 37.

- - - *cruentus seminarum* sistitur erumpentibus men-  
struis. V. 32.

K k 5

*Vomitum*



*Vomitu* (a) singultus & oculi rubentes, malum. VII. 3.  
 - - - *sanguinis* (a) tabea & puris excreatio. VII. 78.  
*Urebra tuberculum* ubi suppuratur & rumpitur, solutio  
 fit. IV. 82. VII. 57.

*Urina multa* noctu reddita, paucam alvi dejectionem significat. IV. 83.

*Urina* morbos judicatu faciles vel difficiles, breves vel longos fore indicant. l. 12.

- - - *in febris juvantes* quales esse debeant. IV. 69.

- - - *subjugales* in febris, quid notent. IV. 70.

*Urina rubra nubeculam* habens, quarto die fluens, crisin septimo die futuram indicat. IV. 71.

*Urina pellucida*, albæ, malæ: quales præcipue in phreniticis apparent. IV. 72.

*Urina copiosa, crassa & alba*, quarto die fluens, in febris, abscessu liberat aliàs ad articulos futuro. IV. 74.

- - - (cum) si *sanguis* aut *pus* redditur, renum aut vesicæ exulceratio significatur. IV. 75.

- - - (cum) *crassa coruncula* aut veluti *capilli* exeuntes, vitium in renibus notatur. IV. 76.

- - - (cum) *sursuri similia* exeuntia, vesicam scabiosam denotant. IV. 77.

- - - (cum) qui *sanguinem effundunt*, iis in renibus venulam ruptam esse significat. IV. 78.

- - - (in) *arenosa subsidencia*, vesicæ calculum notant. IV. 79.

- - - *sanguinem habens* & grumos, si adsit stranguria, & dolor in imo ventre ac interfœmineo, notat partes ad vesicam pertinentes laborare. IV. 80.

- - - *habens sanguinem, pus* & squamulas, cum gravi odore, vesicæ exulcerationem significat. IV. 81.

- - - *abunde fluens*, cum febre, in volvulo ex stranguria orto, morbum solvit. VI. 44.

*Urina febrientium cum sedimentis farinæ* crassiori similibus, longum morbum significant. VII. 31.

- - - *cum biliosis sedimentis*, supra vero tenuibus, acutum morbum indicant. VII. 32.

- - - *disparata*, vehementem in corpore turbationem notant. VII. 33.

- - - *cum bullis*, renum morbum, eumque longum significant. VII. 34.

*Urina pinguis*, renum morbum acutum ostendit. VII. 35.

*Urine*

*Urina difficultas.* Vid. *Dysuria*.

- - - *stilitidium.* Vid. *Stranguria*.

*Uterus suppuratus* quomodo tractandus. V. 47.

*Uteri vitia conceptum* impediencia. V. 62.

- - - *os* in gravidis connivet. V. 51.

- - - *durum* connivet. V. 54.

*Utero amicum* calidum. V. 22.

- - - (in) *gravidæ erysipelas*, letale. V. 43.

- - - *morbi* (ab) proveniunt, quando non prodeunt  
menstrua. V. 57.

- - - *inflammato* (ab) *stranguria*. V. 58.

*Vulneri* superveniens *convulso*, letale. V. 2.

*Vulnera* quarum partium *letalia*. Vl. 18.

- - - quarum partium *non consolidantur*. Vl. 19.

*Vulneribus* (in) *magnis tumorum absentia*, ingens malum.  
V. 66.

*Vulneribus* (in) *tumores qui boni, qui mali*. V. 67.



# INDEX RERUM MEMORABILIMUM

*Quæ in Notationibus occurrunt.*

[Numeri designant paginas. Literæ a & b numeris præpositæ denotant Volumen I. & II. Ubi neutra harum literarum adest, intelligi debet proxime antecedens.]

## A.

**A**bdominis constitutio crassior, an tenuior, in morbis laudabilior. a. 271.

- - - dolores qui aliis leviores. b. 210.

**Abortus** sub quo æris statu metuendi. a. 365.

- - - a thoracibus nimium constrictis. b. 96.

- - - ex plethora uterina. 99.

- - - ex muci in utero abundantia. 99 sq.

- - - ex fluentibus menstruis. 137.

- - - ex tenesmo. 366 sq.

**Abscessus critici** in febribus quando expectandi. a. 99 sq.

**Abscessuum** post morbos futurorum signa. 187.

- - - per febres futurorum signa. 560.

**Abscessus** convalescentium ubi, & unde. 561.

**Abscessus** in febribus imperfectam notantes crisin. 596.

- - - ad articulos in febribus fieri prohibet urina copiosa, crassa, alba. 651 sq.

- - - intus rupti signa. b. 343.

- - - fientis signum. 362.

**Abstinencia.** Vid. *Inedia*.

**Acuti morbi.** Vid. *Morbi*.

**Adolescentia** quibus definiatur annis. a. 69. 419.

**Adolescens** constitutio. 71 sq.

**Adolescentes** cur non ferant inediam. 72.

*Adolescentes*

*Adolescentis* quibus inprimis expositi excretionibus. 27.  
 - - - quibus tententur morbis. 419.

Eorum prophylaxis. 459 *sq.*

*Aegroti* sæpius mortem incurrunt, cum Medicorum imperatis non obediunt. 12.

*Aër humidus & calidus* quos producat morbos. a. 345 *sq.*  
 --- quibus conferat. *ibid.*

--- quibus inprimis noceat. 347.

--- qualem victum poscat atque medicinam. *ibid.*

--- *æstuosus & udus* quam poscat diætam. 382.

--- *frigidus & siccus* quos faciat morbos. 348.

--- quibus utilis sit. 349.

--- Ejus noxis quomodo occurrendum. 349 *sq.*

*Aëris* extreme *sicci* atque *æstuantis* effectus in corpus humanum. 352.

- - - *sicci* beneficia. 377.

- - - *humidi* noxæ. 379.

- - - *frigidi* effectus in corpus humanum. 384. 405 *sq.*

- - - *inconstantia* quos pariat morbos. 354.

*Æquinoctialia* tempora disponunt ad sanguinis fluxiones. 25.

*Æstatis* victus. 87 *sq.*

- - - *morbi* proprii. 398.

- - - cur præ ceteris celeres ac breves. 247.

- - - post hiemem siccam, æquiloniamque, & ver calidum pluviosumque. 362.

- - - post hiemem humidam, tepidamque, & Ver frigidum siccumque. 364.

- - - in autumnum incidentes. 401 *sq.*

*Ætas* consistens. Vid. *Virilis ætas*.

*Ætatum diversitas* diversas exhibet sanguinis excretiones. a. 27.

- - - copiosum vel parcum requirit victum. 68.

- - - *termini* non in omnibus hominibus æquales. 69.

- - - *differentia*. *ib.*

- - - *diversarum morbi* differunt potissimum a parte affecta. 456.

*Ætates* quæ quibus anni temporibus melius degant. 386.

*Ætatis mutatio* ab epilepsia aliisque capitis morbis liberat. 312 *sq.*

*Assulguratio*. Vid. *Apoplexia*.

*Alimentorum coctio* promovetur somni tempore. a. 77.

*Alimentorum*

*Alimentorum copia nimia, & deficiens quos pariat morbos.* 163 sq.

- - - quæ cuique optima. 165 sq.

*Alfabet Arabum.* 398.

*Alvi dejectiones spontaneæ, quæ bonæ, quæ malæ.* a. 17 sq.

--- senibus familiares. 27.

--- quibus in morbis profint, vel obfint. 28 sq.

--- solvunt borborygmus. 649.

--- biliosa quæ. 546.

--- *meracæ* seu *sinceræ*, in chronicis morbis. b. 341.

--- *squamosæ*. 372.

--- Medico inspiciendæ. 459. 463.

--- *dejectionem criticam* quæ præcedant. a. 198. 200.

--- dejectionum criticarum mutationes quando salutes. 201.

--- niger, aliique colores quid portendant. 531.

--- *profluvia* in pleuritide, & in variolis, nocent. 107.

--- in febribus quomodo dirigenda. 108.

--- Vid. etiam *Diarrhæa*.

*Angina vernalis.* a. 392.

- - - sine tumore evidente. 564.

*Anginæ infausta transmutatio.* b. 18.

- - - quæ species. 20.

*Anima.* Vid. *Mens*.

*Animi deliquium.* Vid. *Liposymia*.

*Anni tempora diversa varios pariunt morbos.* a. 336. 387.

--- quomodo ab Hippocrate dividantur. 337 sq.

--- *temporum*, in evacuationibus, cur habenda ratio.

25. & in concedenda alimentorum quantitate. 75.

--- *climaterici*. 454.

*Anxietatis descriptio & medela.* b. 431.

*Aphonia* ab ebrietate. 9.

*Aporismus* quid. a. 3.

*Apoplexia* qualis morbus. 282.

- - - Qui illi obnoxii. b. 323.

*Apoplexia sanguinea*, præsertim circa tempora æquinoctialia fiunt. a. 25.

*Aqua calida* usus externus in curatione morborum. b.

46. 49. 405 sq.

- - - *frigida* externus usus in medicina. 51 sq. 55.

- - - levitas qui exploretur. 60.

*Arthritis* generis, juxta Hippocratem. 262.

*Arthritis*

*Arthritis* causæ variæ. 263 sq.

*Articularum dolores*. a. 396.

- - - in senili ætate. 444.

- - - an applicata aqua frigida tractandi. b. 55sq.

*Ascides*. Vide *Hydrops*.

*Asibletarum* institutum pedissequam habet repletionem

- - - summam periculosam, quæ evacuationem indicat. a. 31 & seq.

- - - Quibus morbis corripi solebant. 34.

*Atra bilis*. Vide *Bilis*.

*Atrabilarii*. Vid. *Melancholici*.

*Aurigo*. Vid. *Iærus*.

*Aurium vitia* alvum poscunt liquidam. a. 545. Vide & 610.

- - - dolores a calore æstivo. 400.

*Autumni effectus* in corpus humanum. 358. 402.

- - - vitæ. 87 sq.

- - - morbi. 403. quomodo evitentur. 88. 404. quomodo præcaveantur. b. 307. qui dicantur morbi autumnales. a. 341. & quis eorum genius. 355.

*Autumnus* quibus noceat. 404.

## B.

**B**albi diarrhœis obnoxii. b. 277.

*Bilis duplex* Veterum. a. 374 sq. Conf. 535 sq.

- - - beneficia in œconomia animali. 504.

- - - atra commota exitialis. 539.

*Biliofi* qui dicantur. 366.

*Biliosum* Veteribus idem quod flavum. b. 379.

*Barborygni* in febribus quid significant. a. 648.

*Britannia* (Magnæ) incolæ magis iteratas quam largas requirant venæ sectiones. 25.

*Bulla* quid. b. 382.

## C.

**C**achexia unde convalescentibus ex morbo oriatur. a. 45:

*Cacoclylia* quid. 44.

*Cacocymia* quid. ib.

*Calculi cystidis felles* quibus contingant. 443.

- - - vesicæ indicia, & exploratio. 675 sq.

*Calculus vesicæ* frequens apud pueros. 416.

*Calculus*

- Calculus vesicae & renum* apud senes. 443.  
*Calculoforum urina* qualis. *b.* 385.  
*Calidi* exterius admoti noxae. 31. ejus beneficia. 46.  
 - - - Vid. etiam *Aqua calida*.  
*Calor innatus* quid notet. *a.* 70.  
*Caloris* in hum. corpore causa. 71.  
*Calvi* an varicibus obnoxii. *b.* 279.  
*Calvitium* unde. 268.  
*Cancer*, Celso quid. 290.  
*Cancris oculis* qui, apud Hippocratem. 288. 290.  
 - - - *manifesti* vel ulcerosi. 290.  
*Capitis dolor*. Vid. *Cephalalgia*.  
 - - - *percussio*. *b.* 352.  
*Cardialgia* in febribus. *a.* 626.  
*Carnes assae*, & *elixae*, quibus anni temporibus congruant. 76.  
*Catarrhi* quare ægre coquantur in senili corpore. *a.* 279.  
 - - - an in suppurationem abeant. *b.* 400.  
*Catarrbus suffocativus* quis. *a.* 565.  
*Cathartica*. Vid. *Purgantia*.  
*Caruncularum* nomine quid intelligat Hippocrates. *a.* 663. vid. & 666 *sq.*  
*Castrati* qui dicantur. *b.* 265.  
*Castrationis* genus duplex apud Veteres. 267.  
*Cauterium actuale*. vid. *Ufio*.  
*Cephalalgia* cur non ferat lactis usum. 159.  
 - - - quomodo tractanda. 182.  
 - - - quibus evacuationibus solvatur. 212.  
*Cerebri concussi* confectarium vocis privatio. 484.  
 - - - *sphacelus* quid Veteribus. 419.  
 - - - *vulnera*. 232. Quibus stipentur symptomatibus. 310.  
*Cibus* qui magis conducat in sanitate, & morbo, semel vel sæpius, copiosus aut parvus, de die ingestus. *a.* 85. 89.  
 - - liquidus cur facilius seu citius nutriat, quam solidus. 181.  
*Cibi appetentia* in morbis quando bona, quando mala. 264.  
 - - nascente morbo cur mala. 265 *sq.*  
 - - *fastidium* in longis morbis. *b.* 341.  
 - - Vid. *Alimentum*, & *Vitus*.  
*Circuitus*. Vid. *Periodus*.

*Codio*,

**Cæcio**, & **Coctum**, in morbis quid, & quomodo cognoscatur. *a.* 119 *sq.* Conf. 136.

**Cæcio** quibus adjuvetur remediis. 122 *sq.*

**Concubitus** an epilepsiæ remedium. 311. 313 *sq.*

**Confidentia** Vid. *Fiducia*.

**Congelatorum** curatio. *b.* 49.

**Consuetudinis** vis in victu. *a.* 84.

- - - magna vis generatim considerata. 322.

**Contraria** non semper contrariis curantur. *a.* 216.

**Convulsio** ex Veratro. *b.* 5.

- - - ex vulnere. 9.

- - - ex hæmorrhagia. 7.

- - - ex multa purgatione. 8.

- - - ex vigilia. 355.

- - - ex medicamento purgante. 364.

- - - *bysserica* ex fluentibus menstribus. 124.

**Convulsiones** solvuntur superveniente febre, & quandoque febrem sedant. *a.* 251 *sq.*

- - - in febribus acutis. 628. *b.* 351.

**Convulsionum** natura. *a.* 251.

- - - causæ variæ. *b.* 292.

**Cordis** vulnera. *b.* 233.

**Coryza**. Vid. *Gravedo*.

**Craffi** seu obesi quibus malis obnoxii. *a.* 305.

- - - difficilius ferunt sanguinis detractionem quam graciles. 140.

- - - purgancia ferunt. 487.

**Crisis** in morbis quid. 91. 241.

- - - contingit certis temporibus. 92. 96. quæ tamen variare possunt. 93.

- - - in quot dies incidere soleat, & qui illius sint dies indices. Vid. *Dies*.

- - - cur hodie rara, quæ frequentissima erat antiquis. 92 *sq.*

- - - qui promoveatur. 98. 101.

Ejus fientis signa. 99.

Eam perfectam salutaremve factam quæ declarent.

100.

Ejus imperfectæ exitus, morbi recidiva. 188.

**Criseos μεταστικῆς** eventus. 189.

**Crisim** quæ præcedunt. 195 *sq.*

**Crisim** quæ sequuntur. *ibid.*

*Vol. II.*

L 1

*Cruditas,*



*Cruditās, crudum*, in morbis quid, & quomodo cognoscatur. *a.* 119. 136.

Multiplex harum vocum significatio. *b.* 464.

*Cynanche* cum tumore, & sine eo. 287.

## D.

**D***ebilitas* partis alicujus unde. *a.* 563.

*Dejectiones* alvinæ. Vid. *Alvi dejectiones*.

*Delirantes* somno indigent. *a.* 150.

- - - non sensum habent doloris. 172.

*Deliria* cum risu, cum studio, quid notent. *b.* 317.

*Delirium* seu Phrenitis symptomatica in quo consistat  
*a.* 150.

- - - ecstaticum. *b.* 338.

- - - ex peripneumonia. 349.

- - - ex vigilia. 355.

- - - ex cranii fractura. 363.

*Dentes* fordibus inquinati quid significant. *a.* 598.

*Dentitionis* historia. 411.

*Dieta* post copiosas evacuationes quæ temperanda sit. 16.

- - exquisita & tenuis, ut & nimis plena, in morbis  
noxia. 39 *sq.*

- - tenuior, quam plenior, magis lædit & sanos &  
ægros. 45 *sq.*

- - quæ sit plenior, quæ tenuis. 41.

Ejus mensura optima unde petitur. 43.

- - præscribenda sanis pro labore. 46.

- - tenuis in summis morbis servari debet. 47.

- - plenior quando in acutis morbis conveniat. 49.

- - in morbi incremento. 53 *sq.*

- - in morbi paroxysmis. 59. 85. 89.

- - in crisi, & ante crisin. 89 *sq.*

- - copiosa vel parca præscribenda pro ætatum di-  
versitate. 68. & pro anni temporum diversitate. 75.  
84.

- - æstate & autumno. 87.

- - sub æstuosa & uda æris intemperie. 382.

- - quæ conveniens sit se exercentibus. 75.

- - - humida quibus conveniat. 79.

- - variare debet pro ratione regionum seu locorum,  
& consuetudinis. 84.

- - - læta *b.* 167.

*Diarrhœa*

- Diarrhoea* malum in pleuritide & peripneumonia. *b.* 224.  
 - - - in ophthalmia prodest. 227.  
 - - - leucophlegmatiam solvens. 368 *sq.*  
 - - - ex morbo diuturno metuenda. 485.  
*Diarrhoea* remedium vomitio. 222.  
*Diarrhoea aëstiva.* *a.* 400.  
 Vid. etiam *Alvi defectiones.*  
*Diaphragmatis* vulnera. *b.* 234.  
*Dies critici* qui sint. *a.* 221. 239 *sq.*  
 Eorum ratio ad mentem Martiani. 233.  
 - - *indices* seu indicatorii. *a.* 221.  
 Quibus doctrina de diebus crit. & indic. innitatur  
 fundamentis, ex sententia Mead. 238. juxta Gorter.  
 245. 641. secundum Grashuis. 242.  
 Utrorumque ratio commentitia ex sententia Toz-  
 zi. 227 *sq.*  
 - - *impar* apud Hippocratem quid proprie significet.  
 231.  
 - - *medicinales* seu vacui qui. 223.  
*Diuretica* post morbos quando conferant. 192.  
*Dolor* dolore levatur. 317.  
 - - ad articulos a longa febre. 584.  
*Dolorum* in lateribus & pectorum natura. *b.* 208.  
*Dysenteriae* idea. *a.* 540.  
*Dysenteria* ab atra bile mortifera. *ibid.*  
 - - - cum carunculis cur letalis. 542.  
 - - - ex metastasi. *b.* 180.  
 - - - ex mania. 336.  
 - - - ex sicca alvi egestionem. 363.  
 - - - vernalis. 366.  
*Dysuria* causæ & remedia. 415.

## E.

- E***cbrietas* noxa. *b.* 9. 342.  
*Ectasis* quid. 337.  
*Ellebori albi* usum quid precedere debeat. *a.* 513.  
 Ejus operatio qui facilitetur. 514.  
 Quomodo eadem sistatur. 515.  
 Quare ejus usus sanis non administrandus. 516.  
*Empysematis* quis morbus. 566.  
*Empyema* quid. *b.* 15.

- Epilepsia* qualis morbus. a. 309.  
 - - - unde gignatur. 310 311 *sq.*  
 - - - quando sanabilis per ætatis mutationem. 314.  
 - - - in quam præcipue cadat ætatem. 428.  
 - - - qua ætate sanabilis, vel non. b. 10.  
 - - - vernalis. a. 391.  
*Epileptici* quæ obliunt, quæ conferant. 316.  
*Equitatio* producit mictum cruentum. 672.  
*Erbina* quibus in affectibus aurium & oculorum no-  
 ceant. 105.  
*Erysipelatis* natura. b. 253 *seq.*  
*Erysipelas* quomodo tractandum. 53.  
 - - - in utero. 91.  
 - - - offi denudato superveniens. 358.  
*Evacuantiæ* quo tempore morbi exhibenda. a. 260.  
 - - - in fine morbi necessaria. 190.  
*Evacuantiis* remedijs præparantiæ præmitti debent. 176.  
 178.  
*Evacuationes*, ad præcavendos a plethora oriundos mor-  
 bos, qua mensura administrandæ. 35 *sq.*  
 - - - an in principio morborum facere conve-  
 niat. 127.  
 - - - copiosæ quando nihil mali significant. 208.  
*Evacuationum* sponte fientium consideratio respectu re-  
 gionum. 24.  
     intuitu temporum anni. 25.  
     ratione ætatum. 27.  
     respectu habito ad morbos. 28.  
*Evacuationibus* inter initia & incrementa morborum ad-  
 venientibus non fidendum. 256.  
*Eunuchorum* varia genera. b. 265.  
     Qui ex illis non laborent podagra. 266.  
*Exercitatione* utentibus quis conveniens cibus. a. 75.  
 - - - non utendum in fame. 87.  
*Excrementa* alvina. Vid. *Alvi dejectiones*.  
*Exhalationes* animalium juniorum Senibus utiles. a. 472.  
*Experientia* medica fallax. 8.

## F.

- F**æces alvinæ. Vid. *Alvi dejectiones*.  
*Fames* quid sit. a. 205.  
     Ejus causa quæ. 213.

*Fomes*

*Fames* prohibet exercitia corporis. 205.

- quibus vini potione solvatur. 213.

- quibus augeatur. 214.

- deleta unde. 167.

*Fastidium* alimentorum unde. b. 204.

*Fatuitas*. a. 390.

*Fauces* quæ dicantur. 202.

- quibus malis afficiantur, & cur tunc excretiones considerandæ. 203.

*Febris solvis* aphoniam ab ebrietate. b. 9.

- apoplecticam affectionem. 314.

- quomodo arte excitetur. a. 198. 252.

Ejus solutio perfectissima cur per sudorem fiat.

141. quibus signis & quibus diebus. 226.

Qualem solvat aqua calida capiti affusa. b. 405

*sq.*

- recidiva quando fieri soleat. a. 612.

- longitudo quando prædicitur. 257.

- diu durans quid arguat. 583.

- acuta quæ. 220.

- tempore hiemali, prægressa æstate frigida siccaque, & autumno simili. 376.

- biliosa quæ Hippocrati. 617.

*Febres* a bile apud Veteres quæ. b. 406.

- continuæ quando solutu difficiles. a. 558.

- intermittentes per initia emeticis & laxantibus tractandæ. 260.

Earum paroxysmi singuli tanquam integri morbi acuti considerari possunt. 52. & cibum tenuissimum postulant. 61.

Earum periodi duæ partes, accessio & remissio.

61 *sq.*

Ipstarum accessiones singulæ quomodo solvantur.

103.

- *xeroides*. 168.

- *lenta*, post intermittentes male curatas, quomodo tractandæ. 261.

*Febris lypyria*. 589.

- *tristaphya*. 580 *sq.*

*Febribus* (in) quales non exhibendi cibi. b. 439.

- - - *viscus* humidus confert. a. 79 *sq.*

- - - quare non dandum *lac*. b. 160.

- - - quando *abscessus* expectandi. a. 100.

L I 3

*Febribus*

- Febribus* (in) quando *purgantia* profunt. 102.  
*Febres* (post) an medicamentum deorsum *purgans* semper necessarium. 190 sq.  
*Femoris* luxatio. b. 325. 327.  
*Fiducia* ægroti in Medico non parvi momenti res. a. 3.  
*Femine* an podagra laborent. b. 270.  
*Fradurarum* recidivæ quando contingant. a. 194.  
*Frisio*, ad discutiendas morbi reliquias, utilis. a. 191.  
*Frigidi exterius admoti* damna. b. 32. 37. 40. 41. 54.  
 - - - usus in tetano. 42.  
 Vid. *Aqua frigida*.  
*Frigus* extremorum in acutis morbis quid notet. b. 331.

## G.

- G**alli evacuationes ferunt largas, tam per alvum, quam per venæ sectionem. a. 24 sq.  
*Galli* in febre ardente minus periclitantur quam Angli & Scoti. 262.  
*Gelatorum* curatio. b. 40.  
 Vid. *Pernio*.  
*Genitalium* putredo a calore æstivo. a. 400 sq.  
*Genuum* gravitas a cacoehylia. 530.  
*Germani* emetica remedia facile ferunt. 24.  
*Gibbosos* ante pubertatem factos quæ maneat fors. b. 305.  
*Graciles* facilius ferunt sanguinis detractionem quam crassi. a. 140.  
*Gracilium* conditio. 306.  
*Gracilibus* vomitoria conveniunt. 485 sq.  
*Grovedo* qualis affectio. 270.  
 - - - unde. 371.  
 - - - cur in senibus ægre coquatur. 270.  
 - - - vernalis. 392.  
*Gravida* quando purgandæ. a. 479.  
 - - - quando venæ sectionem ferant. 482.  
 - - - habitus gracilis, abortui obnoxia. b. 94.  
 - - - febre detentæ quando periclitentur. 121.  
 - - - experiuntur menstruorum fluxum. 137.  
*Gravidarum mamma* subito gracilescentes quid denotent. 82.  
 Eadem lacte manantes quid significant. 115.  
 - - - duræ quid indicent. 117.  
*Gravidis* num morbi acuti letales. 67.

*Gravidis*

*Gravidis* num venæ sectio conveniat. 69.

- - - dejectiones alvinæ nimix abortum faciunt. 75.

*Graviditas* ex quo æstimanda. 114.

Ejus signa incerta. 138 sq.

*Gutta*. Vid. *Apoplexia*.

## H.

**H**emoptoꝝ quibus signis a sputo & vomitu cruento dignoscatur. b. 25.

*Hemoptoꝝ* quando recrudescat. 40.

*Hemoptoicis* lac. 165.

*Hæmorrhagia spontanea* quæ bonæ, quæ malæ. a. 21 sq.

541.

- - - quomodo se habeant respectu regionum.

24.

- - - intuitu anni temporum. 25.

- - - juxta diversas ætates. 27.

- - - sunt inprimis Vere frequentes. 392.

- - - quando alvum humectent. 543.

- - - in morbis quando salutare. 657.

- - - præsentis aut futuræ quomodo applicata aqua frigida tractandæ. b. 52.

*Hæmorrhagiarum* confectaria mala. 344.

- - - criticarum futurarum signa. a. 198.

*Hæmorrhoides* solvunt maniam. b. 246.

Earum fluxu solvuntur affectus melancholici & nephritici. 214.

- - - sunt salutare in variis aliis casibus. 215.

a. 22. 28. 29.

- - - quibus sint familiares. 106. 431.

- - - Earum nimius fluxus quomodo compescendus. b. 216.

Ætas consistens iis est obnoxia. 27.

- - - in Græcia salutare. a. 432.

Criticarum futurarum signa. 199.

Molimina hæmorrhoidalia unde. 431.

*Hætica*. Vid. *Tabes*.

*Helleborus*. Vid. *Elleborus*.

*Hepatis* vulnera. b. 242.

*Hiems* quos gignat morbos. a. 405.

*Hiemis morbi* post ætatem siccam frigidamque, & autumnum pluviosum tepidumque. 369.

L 1 4

*Hiemis*

*Hiemis morbi* post æstatem siccam frigidamque, & autumnum similem. 373.

- - - *vidus*. 76.

*Hispanis* vomitus biliosi cum febris, diarrhœæ ac dysenteriz exitiales frequentissime superveniunt. 25.

*Hollandia* (in) cur frequentes vomitæ ac phthises. 359.

*Horripilatio*. Vid. *Horror*.

*Horror* ex sudore. b. 535.

Quando contingant horrores. a. 552.

*Horroris* medela. b. 431.

- - - *idea*, juxta Hippocratem. a. 553.

ex mente Galeni. 553 sq. Celsi. b. 34.

*Hydrops* curatur fomentis, & propinatis medicamentis. a. 105.

- - - *ex mania*. b. 336.

- - - *ascites* ab hepate, malum. 430.

- - - *siccus* Vid. *Tympanites*.

*Hypercatharsis* quæ producat mala. b. 8.

*Hypnotica* medicamenta quibus in morbis conferant. a. 148 sq.

*Hypochondriacis* num conveniat lac. b. 161.

*Hypochondrium* quid. 295.

Ejus dolor solvitur a febre. 296.

*Hystericum* malum. Vid. *Passio hystérica*.

# I.

**I***aerus* qualis morbus. a. 613.

*Iaerus* superveniens quando febrem solvat. 616. 622.

- - - quando perniciosus. 618.

- - - difficile est malum in acutis. 623.

*Iaus*. Vid. *Apoplexia*.

*Ileus*. Vid. *Volvulus*.

*Impetigines*. Vid. *Lichenes*.

*Impotentia* virilis. Vid. *Sterilitas virilis*.

*Impura* corpora quæ. a. 179.

*Inedia* vis medicinalis. b. 435.

*Infantibus* familiares morbi qui. a. 407 sq.

Iisdem præservandis, ac tollendis, aptum medicamentum. 409.

Eorum morbi a dentitione. 411.

Vid. *Pueri*.

*Ingesta*

- Ingesta* quando corrumpantur in corpore nostro 45.  
 - - - cito conficienda celeres faciunt evacuaticnes. 207.  
*Insania*. Vid. *Mania*.  
*Intestinorum* vulnera. *b.* 236.  
*Ipecacoanha* laudabile vomitorium. *a.* 518. 520.  
*Iscbiadicus* dolor qualis. *b.* 325.  
*Judicatio* vel iudicium in morbis. Vid. *Crisis*.  
*Juvenes* quibus morbis præcipue obnoxii. *a.* 27. 424.  
 - - - cur frequentius senibus ægrotent. 277 *sq.*  
 - - - rarius, quam pueri, epilepsiam patiuntur. 310.  
     Ils confert alvus fluida. 331.  
 - - - quomodo præserventur a pulmonum morbis.  
     460.  
*Juventus* quibus includatur annis. 69. 424.

## L.

- L**ac quibus conveniat, quibus non. *b.* 175.  
 Ejus differentia secundum animalia. 169. usus in  
 medicina apud Antiquos. 152.  
*Lactis asini* virtus. 153. 156. 169.  
*Lachrymare* sine voluntate quid denotet. *a.* 597.  
*Lassitudo* quid sit, & ejus species. 168 *sq.*  
*Lassitudinis* remedium. 320.  
 - - - sensus in febribus quid futurum significet. 559.  
*Lepra* Græcorum. 392.  
*Leucoplegmatia* quid. *b.* 369.  
 - - - quomodo solvatur. 370.  
*Lichenes*. *a.* 399.  
*Lienosi* qui. *b.* 299.  
*Lienosis* dysenteria quæ bona, quæ mala. *ibid.*  
*Lienteria* qualis morbus. *a.* 511.  
     Ejus curatio. 512.  
*Ligari*, intuitu impotentia virilis, qui dicantur, & quid  
     sit *Ligatura*. *b.* 145. 148.  
*Lipothymia* vehemens & crebra quid arguat. *a.* 281.  
 - - - a rupto intus abscessu. *b.* 343.  
*Literatis* unde frequens de oculis querela. *a.* 154.  
 - - - somnus meridianus utilis. 159.  
*Lumborum* dolor a cacochoylia. 530.  
 - - - ab aliis causis. 650.  
*Lunatici* qui dicantur. 309.



*Lusitanis* vomitus biliosi cum febris, diarrhoeæ ac dysenteriae exitiales frequentissime superveniunt. 25.  
*Luxationum* recidivæ quando fiant. 193.

## M.

**M***acilensi*. Vid. *Graciles*.

*Mammarum* cum utero consensus. *b.* 84.

- - - - cum cerebro an detur consensus. 88.

*Mania* qualis morbus. *a.* 390.

- - an a mammarum morbis. *b.* 88.

- - per revulsionem solvitur. 246.

Quæ supervenientia ipsi salutaria. 336.

*Marasmus*. *a.* 438.

*Marasmi* *senilis* curatio. 474.

*Medicamenta*. Vid. *Remedia*.

*Medicina* ars longa est. *a.* 5.

- - - brevem habet occasionem seu temporis opportunitatem. 6.

- - - ars est conjecturalis. 8.

*Medici* in quibusdam rebus gratificari debent ægrotis. 14.

- - - quando ministri naturæ, quando magistri esse debeant. 107.

- - - plus interdum quiete, quam movendo atque agendo proficiunt. 101.

*Medicis* imputantur ægrotorum errores. 12.

*Melancholia* Veterum. 375.

- - - est Maniæ species. 390.

- - - sedatur convulsionibus. 254.

*Melancholici* qui. 490.

Ipsis conveniunt purgantia. *ibid.*

*Melancholicorum* morborum periculosi decubitus. *b.* 320.

*Menstrua* a naturali statu abeuntia. 80.

- - - fluunt gravidis. 137.

*Menstruorum* fluentium salubritas. *a.* 21.

- - - criticorum instantium signa. 199.

- - - immoderatorum remedia. *b.* III.

- - - non recte procedentium mala quomodo declinanda. *a.* 460.

- - - per ætatem cessantium confectaria quomodo præcaveantur. 464 sq.

*Menstruorum*

*Menstruorum fluxus suffitus* ciendus. *b.* 64.

*Menstruis fluentibus* superveniens convulsio aut lipothymia. 123.

- - - *nimiis* qui superveniant morbi. 126.

- - - *suppressis* vel iusto parcius fluentibus quæ mala contingant. 127.

- - - *obstruatis* an vomitoria? 72.

- - - an hæmorrhagia narium? 73.

*Mente valere* seu constare quid significet. *a.* 266.

*Mentis functiones* se habent ut sanguis & humorum ad cerebrum motus. 150.

*Metus effectus* in corp. hum. *b.* 251.

*Miasus cruentus* plus autumnus quam vere incidit. *a.* 25.

- - - unde. 660 sq. 672. 680.

*Morror.* Vid. *Tristitia.*

*Morbillis* (in) quando indicentur vomitoria. 520.

*Morbillos* (post) evacuancia & roborancia administranda sunt. 190.

*Morbi acuti* qui. *a.* 208.

eorum divisio. 219.

ipsorum prædictiones incertæ. 208 sq.

- - - *valde acuti* qui. 492.

in iis quando purgandum. *ibid.*

*Morbi chronici* seu longi qui. 217.

- - - *congruentes.* 260.

- - - *a plethora.* 33 sq. quomodo præveniendi. 37.

- - - qui *recidivant.* 186.

- - - *cum vigent nil movendum* esse, qui intelligi debeat. 262.

*Morborum diagnosi* ex quibus facienda sit. 10 sq.

- - - *tempora* quatuor. 52.

- - - *brevitas* vel *longitudo* qui prænoscat. 64. 573.

- - - *principium*, quomodo intelligendum. 110. 113.

- - - *reliquiæ* faciunt *recidivas.* 182. quomodo tractandæ, 190 sq.

*Morbus morbo levatur.* 317.

- - - *arquatus.* Vid. *Icterus.*

- - - *attonitus.* Vid. *Apoplexia.*

- - - *caducus.* 307.

- - - *comitialis.* 308.

- - - *constans*, *inconstans.* 354 sq.

- - - *divinus.* 309.

- - - *Herculeus.* *ibid.*

*Morbus*

*Morbus lunaris.* ibid.

----- *magnus.* ibid.

----- *regius.* Vid. *Icterus.*

----- *sacer.* 309.

----- *sonicus.* 308.

----- qui *spuat.* ibid.

*Mors naturalis,* senilis, sine morbo. 437.

- - - *repentina* evenit iis, qui sæpe syncopen patiuntur.  
281.

*Mulieres.* Vid. *Feminae.*

## N.

**N**arcotica. Vid. *Hypnotica.*

*Narium hæmorrhagia* pueris familiaris est a. 27. Ejus salubritas. 21. pravitas. 22.

- - - in multis morbis prodest, in aliis obest. 29.  
solvit surditatem. 610. compescit febres. 611. quando  
febris solutionem indicet. 653. solvit obstructionem  
menstruorum. b. 73.

- - - an conferat in Quartana. 482.

- - - *hæmorrhagia critica* instantis signa. a. 199.

*Napoli* ægrotantes ægre ferunt sanguinis missionem. a.  
24.

*Nervorum vulnera.* b. 244.

## O.

**O**besi. Vid. *Crassi.*

*Obstupescencia.* Vid. *Apoplexia.*

*Oculi* in somno conniventes quid arguant. b. 315.

----- rubentes a vomitu. 334.

*Oculorum dolentium* remedia. 411.

*Omentum* describitur. 101.

- - - per vulnus foras excidens. 324.

*Ophthalmia sicca* a quali temporis constitutione. a. 375.

*Ophthalmia epidemica* quando imprimis. 353.

*Opiata* purgantibus admiscere confert. 176.

*Orgasmus humorum.* Vide *Turgere.*

*Oris exulcerationes* a calore æstivo. a. 400.

*Os carie* infectum qui se manifestet. b. 332 sq.

*Ossum*

*Offum* ab ulceribus *corruptio*. 304.  
*Qcisationis* descriptio & medela. 431.

## P.

- P** *adartibrocace* Hippocrati non ignota. *b.* 473.  
*Paroxysmus* quid. *a.* 59.  
*Parus* instans uti exploretur. *b.* 120.  
*Passto hypericus* pellitur sternutatione. 77.  
 Ejus *genius*. 78.  
*Pavores* in febribus. *a.* 629.  
*Periotus* seu circuitus in morbis quid. 61.  
*Peripneumonis* ex pleuritide. *b.* 348.  
*Pernionum* curatio. 37 *sq.*  
*Perspiratio* somni tempore fit parciore. *a.* 77. 147.  
 - - - - impedita lassitudinem spontaneam creat. 169.  
*Pessilentia* educandæ alendæque quæ faveat aëris con-  
 stitutio. *a.* 381. An in ea profint vomitoria. 519.  
 520.  
*Pharmacopœorum* culpa, & fraus, nocet & ægroto &  
 medico. 15.  
*Phrenitis*. Vid. *Delirium*.  
 Quid proprio sensu *Phrenitis* significet. *b.* 419.  
*Phibiscorum* ultima scena. 22 *sq.*  
 - - - - alvi profluvium exitiale. 27.  
 Conf. *Tabet*.  
*Pingues*. Vid. *Craffi*.  
*Piruita salsa* Veterum. *a.* 371.  
*Pletbora* quos creet effectus morbosos. 33.  
 - - - quando per administrata evacuantia solvi de-  
 beat. 36. 37.  
*Pleurisidis* veræ ingenium. *b.* 15 *sq.* 29 *sq.* 347.  
*Pleuritis* in quibus regionibus bene ferant venæ sectio-  
 nem, in quibus contra. *a.* 24.  
*Pleuritis* nocivum est alvi profluvium. 107.  
 - - - quando alvus ducenda. 105.  
 - - - quando venæ sectio instituenda. 104.  
*Podagra* qui sint obnoxii. *b.* 59. Ejus terminus ul-  
 mus. 309. Quibus anni temporibus vigeat. 318.  
 - - - *causa*, mucilago abundans. 319.  
 - - - *curatio* applicatione aquæ frigidæ. 59.  
*Poloni* facile ferunt sanguinis missiones. *a.* 24.  
*Polypi* adest suspicio in iis, qui sæpe patiuntur synco-  
 pen. 281. Quibus *etatibus* imprimis fiant polypi. 425.  
*Potius*

*Porus frigidi noxa. b. 38.*

*Prædictiones salutis vel mortis in morbis sunt incertæ. a. 208.*

unde desumuntur. 209 sq.

*Pueri cur inediam ferre nesciant. a. 72.*

- - - an arthritidi obnoxii. b. 274.

*Puerorum constitutio. a. 71.*

- - - morbi quomodo solvantur. 421. eorundem ætiologia. 457. & prophylaxis. 458.

*Pueris familiares morbi qui. 416. 420.*

- - - frequens epilepsia. 310.

- - - quæ frequentissimæ evacuationes. 27.

- - - victus convenit humidus. 80.

*Pueritia quibus finiatur annis. 69.*

*Pulmonum inflammatio. Vid. Peripneumonia.*

- - - morbis obnoxii imprimis Juvenes. a. 426.

*Purgantia per alvum an sanis conferant. 273.*

- - - quando indicentur. 523 sq. 525 sq.

- - - præcedere debet venæ sectio. 526. 528.

- - - qua anni tempestate magis conveniant. 482.

- - - qualia in æstate, 485. conveniunt crassi, 487. extenuatis cur non conveniant. 272. quando gravidis conferant. 479 sq.

- - - an debite operata, quando dejectur muci copia, & æger insigniter se debilitatum sentit. 138.

- - - fortia quibus stipentur symptomatibus. 274. iis præmittenda sunt præparantia. 176. 177.

- - - quando valentiora in morbis conferant, quando debilia. 139.

- - - aliquando data in febribus promovent crisin, 102. in principio morbi quando prohibeantur, 107. an in principio febrium putridarum exhibenda sint, 118. qualia in principio morborum exhiberi possint, 129 sq.

- - - in morbis acutis quando danda, quando vitanda, 112 sq.

- - - quando conducant ad præcidendas morborum recidivas, quando non. 191 sq.

*Purgantibus opiata admiscere convenit. 176.*

*Purgatio nimia. Vid. Hypercatharsis.*

*Pus non fit sine febre ac dolore. a. 318.*

- - an a materia catarrhofa. b. 400 sq.

*Puris boni, & mali, qualitas. 409.*

*Pustula ulcerosæ vernaes. a. 394.*

*Quartana*

## Q.

**Q**uartana considerata. *a.* 247. Ejus contumacia unde. 249. An semper salutaris. *b.* 190. an hæmorrhagiis, vel venæ sectione, pellatur. 482.

## R.

**R**aucitas qualis affectio. *a.* 279. unde fiat. 371. in senibus quomodo curanda. 280.

*Recidiva* morborum quid. *a.* 182. 187. Tres earum species, 187. aliæ aliis tutiores, 187 *sq.* quomodo præcavendæ. 190 *sq.*

*Recidivarum* metuendarum signa. 185 *sq.*

*Reconvalescentibus* ex morbo quare oblit victus plenior. *a.* 45.

*Refectio* extenuatorum quomodo fieri debeat. 173.

- - - post morbum, quando pariat recidivam. 184.

*Regiones* non omnes eadem ferunt in morbis auxilia. 23.

- - - crisi in morbis acutis faventes. 93. eidem impedimenta ponentes. *ibid.*

*Regionis* mutatio epilepticis prodest. 315.

*Remedia* immutanda in morbo, non medendi ratio. 328.

- - - heroica quæ, & quibus opponenda morbis. 48.

*Remediis* calidis in morbo calido utitur Hippocrates. 95.

*Repletio.* Vid. *Plethora.*

*Resolutio nervorum* apud Celsum. *a.* 282.

*Respiratio* difficilis in febribus quid indicet. 630.

*Rigor* generaliter quid notet. *b.* 34 *sq.*

- - - apud Hippocratem. *a.* 553.

- - - ex mente Galeni. 554.

- - - in paroxysmis febrium intermittentiam ex Sydenhamo, *ibid.*

Ejus in febribus continuis idea. 547 *sq.* tres species in febribus. 555 *sq.*

- - - plethoricus. 556.

- - - in febre continua frequenter incidens quid arguat. 586.

- - - in febre ardente criticus. 605.

- - - periodicus febres intermitt. solvit. 620 *sq.*

*Rigoris* origo in lumbis. *b.* 188.

*Roma* vomitoria & purgantia fortia non bene cedunt. *a.* 24.

*Rome*

*Rome* pleuriticis venæ sectio obest. *ibid.*  
*Rudus* post assumptos cibos & potus. 163.  
 - - - in lienteria. *b.* 197 *sq.*  
*Rupta* quæ dicantur. 250.

## S.

**S***alivæ* nimix in os affluxus in ætate senili. *a.* 445.  
*Sanguinis* abundantia nimia. Vid. *Plethora*.  
 - - - missio. Vid. *Venæ sectio*.  
 - - - profluvia. Vid. *Hæmorrhagia*.  
 - - - ex pulmonibus rejectio. Vid. *Hæmoptoe*.  
*Sani* an purgari per alvum debeant. *a.* 273.  
*Sanitatis conservatio* per evacuantia quando locum habeat.  
 37.  
*Satyriasm.* 417.  
*Scabias* sicca senum unde. 442.  
*Secundinarum* extractio. *b.* 110.  
*Smedus* prima aut cruda quæ. *a.* 69.  
*Smedusis* differentia. 72.  
 - - - tres periodi. 433.  
 - - - descriptio in *S. Literis*. 446.  
 - - - retardatio. 471.  
*Senum constitutio*. 72. 434.  
*Senes* qui *inediam* ferant, qui non. 72.  
 - - - cur *febris acuta* non adeo sint obnoxii. 73.  
 - - - qui habeant *alvum siccam*, qui *humidam*. 212.  
 - - - quibus morbis imprimis obnoxii, 277. 434 *sq.*  
 - - - quos non patiantur morbos. 460 *sq.*  
 Morborum ipsis familiarium *prophylaxis*. 461 *sq.*  
*Senibus* familiares frequentes *alvi defectiones*. 27.  
 - - - *carnes & vinum* conferunt. 280.  
 - - - frequens *dormitio* conducit. 160.  
 - - - non facile *epilepsia* accidit. 360  
 - - - propria *alvus sicca*. 331.  
 - - - raro *hæmorrhoides*. 431.  
 - - - sub qua *aëris constitutione* metuenda *mors sub-*  
*sana, hemiplexia*. 361.  
 - - - conveniens *diæta*. 467 *sq.*  
*Sensu* doloris vel morbi qui non afficiantur. 172.  
*Septenarius* numerus corpori humano veluti *crismus*. 452.  
*Seri laetis* usus ad purgandam. *b.* 153.  
*Sideratio*. Vid. *Apoplexia*  
*Singultus* ex hæmorrhagia. *b.* 7. *Singultus*

*Singultus* ex purgatione multa. 8. 403.

- - - ab inflammato jecore. 132. 136.

- - - a vomitu. 334.

- - - remedia. 220.

*Siticulosus* an lac. 162.

*Sitis* a sumto purgante quid notet. a. 524.

- - tollitur citra potum. b. 62.

*Solstitia* periculi plena sunt, præcipue æstivum. a. 86.

*Somnifera* medicamenta. Vid. *Hypnotica*.

*Somnus* quid sit a. 147.

- - - delirantibus necessarius est. 150.

- - - meridianus quibus conferat. 159.

- - - sicim tollit. b. 62.

*Somni* tempore alimentorum promovetur *coctio*, sed *perspiratio* insensibilis fit parcius. a. 77. 147.

- - - nimii vel immodici causæ. 152. & effectus, 158.

*Somno* quam diu sanos indulgere conveniat. 156 sq.

- - - (ex) in morbis quæ *prognosis* haberi potest. 146.

*Spadones* qui sint. b. 265.

*Spasmus*. Vid. *Convulso*.

*Sphacelum* inter & necrosin Veterum differentia. b. 419.

*Sphacelismus* ossis Hippocrati quid. 472.

*Spina ventosa* Hippocrati, sub nomine sphacelismi, cognita fuit. 473.

*Spuma* quid. 381.

- - - circa os strangulorum an mortis indicium. a. 286 sq. Quid illam constituat. 289.

*Sputa* ex quibus proveniant locis. b. 23 sq.

- - - in febribus continuis qualia bona, vel mala. a. 587.

*Sputum puris* ex sanguinis sputo. b. 353.

*Sterilitas feminarum* ab omento. 103.

Ejus causæ aliæ. 141.

*Sterilitatis virorum* causæ. 144.

*Stermnatio* quomodo fiat. 422.

- - - in passione hysterica, in difficili partu con-  
ducit. 77. 79. an ad expellendas secundinas. 110.

- - - damnosa sceminis statim a coïtu. 77 sq.

- - - est singultus remedium. 218.

Vid. *Errbina*.

*Strangulati* quo genere mortis pereant. a. 290.

- - - revocantur ad vitam. 286. 288 sq.

*Stranguria* tres causæ. b. 130. 415.

*Vol. II.*

M m

*Stranguria*



- Stranguria* an venæ sectio? 284. 416.  
 - - - an vini potio? 416.  
*Submersi* an aquam potent. a. 295. 304.  
 - - - revocantur ad lucis usuram. 297.  
*Submersis* fere suffocatis quomodo succurrendum. 299.  
*Submersione* factæ suffocationis indicia. 292 sq.  
*Sudamina*. 398.  
*Sudoris* materia eadem quæ urina. 568.  
*Sudor multus* a somno in sanis, quid significet. 575.  
 - - - semper fluens cur significat morbum. 576 sq.  
 - - - febricitantium *symptomaticus*. 604.  
*Sudore* cur perfectissime solvatur *febris*, 241. & quando salutariter, quibusque signis id cognoscatur. 568.  
*Sudores* in *febribus* qui boni, 568. qui mali. 569.  
 - - - *frigidi* sub acuta febre quid portentant. 570.  
 - - - *particulares* quid notent, 572.  
 - - - in *diabys* *judicatoriis* qui mali, & qui boni. b. 483 sq.  
 - - - qua ratione *ciendi*. a. 351.  
*Sudorum criticorum* instantium signa. 199.  
*Sudoriferorum* usus post venæ sectionem & purgationem tutior & efficacior. 527.  
*Suffus* aromatum usus in medicina. b. 64.  
*Suffocatio* ab externa violentia quotuplex. a. 287.  
 - - - submerforum. Vid. *Submersi*.  
 - - - strangulorum. Vid. *Strangulati*.  
*Suppuratio* quando non innotescat. b. 297.  
*Surditas* a bile flava. a. 545.  
 - - - tollitur dejectionibus biliosis. 546. 548.  
*Symptomata* in morbis vehementia, maligna, mitia seu benigna. 55.  
 - - - critica quæ, & quomodo distinguantur a morbofis, 196. 197.  
*Syncope* quid. 281.

## T.

- T** *abes catarrhosa* seu colligativa. a. 371.  
*Tabescensibus* cur autumnus funestus. 359.  
 - - - - quales purgationes. 488.  
 - - - - an lac? b. 163.  
*Temulentia*. Vid. *Ebrietas*.  
*Tenesmus* quid. 367.

*Transfusio*

*Tenesmus* in foeminis est causa abortus. 366.

*Tertianæ*. In hac febre quando medicamentum deorsum purgans proficit. *a.* 263.

- - - *autumnalis* cur difficilis sanationis. 249.

*Tertianæ exquisita* genius. 606 *sq.*

*Titonus* quid. *b.* 12. 34. 42.

- - - curatur affusione frigida. 43.

*Tladiæ*, Thlasiæ qui. 265.

*Tumor*. Vid. *Morus*

*Transpiratio*. Vid. *Perspiratio*.

*Tremor* quid apud Hippocratem. *a.* 553.

Ejus natura explicatur. *b.* 35.

*Tremores* delirio solvuntur. 257.

*Trichiass* quid significet apud Practicos. *a.* 663.

*Tristiæ* effectus in C. H. *b.* 251.

*Tubercula*. *a.* 395.

- - - ad articulos a longa febre. 583.

- - - non semper erroribus in victu imputanda.

586.

*Tuberculorum* in meatu urinario malitia. 683.

*Tumores* glandularum in febribus qui mali. *a.* 602 *sq.*

*Turgore* quando humores corporis nostri dicuntur. 125.

Hæc vox duplicem sensum habet. 481.

Vid. etiam 492.

*Tussis* causa efficiens. *b.* 423.

*Tussis serina* quæ. *a.* 601.

- - - *hydropicorum*. *b.* 280.

- - - *siccæ* quæ in febribus ardentibus non faciant siccam

*a.* 600.

*Tympanites* quid. 498. 504. Ejus signa. 502. 506.

Juuantia & nocentia in hoc morbo, juxta

Baglivum. 500.

*Tympanites* multiplex. 505.

- - - qui distinguatur ab ascite. 507.

Ejus curatio varia. 508 *sq.*

*Typus* a periodo in morbis differt. 62.

## V.

**V***arices* in cruribus solvunt maniam. *b.* 246.

*Variolæ* eruptionem præcedentes *convulsiones*, ut & illis jam prodeuntibus supervenientes, non semper malæ. *a.* 253 *sq.*

M m a

*Variolæ*

*Variolis* alvi fluxio obest. 107.

- - - quando conferant *hymetica*. 148.

- - - quando *vomitaria*. 520.

- - - quando *purgantia*, & qualia. 529.

*Variolas* (post) evacuantes & roborantes administrandas sunt. 190.

- - - numerosas venam secant Sydenham. 192.

*Vena scia* quibus in regionibus bene feratur, in quibus contra. 24.

- in plethoricis quando & qualis fieri debeat. 35.

- a quibus facilius feratur. 139. 140.

- ad animi deliquium instituta quando conveniat.

139 *sq.*

- in febribus exanthematum eruptionem accelerat. 102.

- in pleuritide quando conveniat. 104.

- in morbis acutis quando instituenda. 132. 136. 139.

- prævenit morborum inflammatoriorum suppurationem. 657 *sq.*

- post variolas numerosas Sydenhamo probatur. 192.

- medicamento purganti præmitti debet. 176. & quare, 526. 528.

- fieri debet ante usum sudoriferorum. 527.

- in gravidis quando instituenda. 482.

*Ventriculus* nimis repletus quas inferat corpori noxas. 43.

*Ventriculi vulnera*. b. 237.

*Ventriculum* roborantibus opus habent convalescentes. a. 190.

*Vensorum* consideratio. 343 *sq.*

*Ver* quando saluberrimum. 357. quando malum. 359. quos gignat morbos. 389 *sq.*

*Veris* victus. 76.

*Vernales morbi* quomodo præcaveantur. b. 307 *sq.*

*Veratrum*. Vid. *Ellaborus albus*.

*Vermes* in pueris unde. a. 417.

*Verigo* quid. 384. 522.

- - - ab astringina constitutione. 385.

- - - *tenebrosa*, per consensum, culpâ contentorum in ventriculo. 521 *seq.*

*Vesica* urinariæ scabies. 670. vulnera. b. 231.

*Vestes* gravidarum adstrictæ foetui nocivæ. 96.

*Vidus* mutatio epilepticis confert. a. 316.

Vid. *Dista*.

*Vigilia*

*Vigilia* quid. 155.

*Vigilia nimia* causæ, & noxæ. 153 *sq.*

*Vinum* quomodo lac fenum. 470.

*Vini* potio quibus famem solvat, quibus augeat. 213 *sq.*

*Vinâ* quæ epilepticis obsint. 316.

*Vinorum Græcorum* natura. *b.* 342.

*Vires corporis* ex quo æstimandæ. *a.* 140.

*Virilis* seu consistens ætas quæ. 68. 430.

Ejus constitutio. 72. Inediam seu tenuiorem  
victum sustinere potest. 72 *sq.*

- - - Sanguinis evacuationi per hæmorrhoides obno-  
xia est. 27.

*Virilis ætatis morbi.* 429.

*Vita* humanæ brevitæ. 4.

*Viriliginis.* 394.

*Ulcus* a vulnere distinctio. *b.* 361.

*Ulcera* interna lacte curanda. 173.

- - - tumentia. 177.

- - - glabra. 206.

- - - sanguinem fundentia. 361.

*Ulcus recursus* quando evenit. *a.* 194.

*Uvulus* quis morbus. 403. *b.* 345.

- - - curatur a febre accedente cum copiosa urinæ  
excretionē. 301.

*Vomitiva* qua anni tempestate magis conveniant. *a.* 482.  
486.

- - - an gracilibus? 485 *sq.*

- - - quando indicentur. 517 *sq.* 523.

Eorum facilis ut sit operatio, corpora præ-  
humeſcari debent. 177.

- - - an conferunt in acutorum principio? 133 *sq.*

- - - prohibentur formati jam a natura per bubo-  
nes & carbunculos crissibus & abscessibus. 519.

*Vomitus spontaneus* quis utilis, quis pravus. 20.

- - - plus autumnno quam Vere incidit. 25.

- - - a calore æstivo. 400.

- - - quibus in morbis conferat vel obsit. 29. 106.

- - - *criticus* cur salutaris. 20. quibus signis futurus  
indicetur. 198. 200.

- - - solvit diarrhœam. *b.* 222.

- - - ex rupto ad interiora abscessu. 343.

- - - *cruentus* salutaris, vel malus. 395. uti curandus.  
397. foeminarum quomodo solvatur. 7.

M m 3

*Voracitas.*

# 550. INDEX RERUM.

*Voracitas*, causa præcipua morborum puerilium. a. 416.

*Vox* deficiens. Vid. *Aphonia*.

*Urina* varia diverso tempore, b. 441. variorum hominum. 443 sq.

- - hominis perfecte sani. a. 640.
- - crassa in febribus. 632 sq.
- - tenuis in febribus. 635 sq.
- - crassa & turbida seu subjugalis in febribus. 636 sq.
- - nubeculam habens rubram in febribus. 639. 641.
- - perfecte pellucida in febribus acutis quid notet. 640. 642 sq. 645 sq.
- - pondere levis & consistentia tenuis quibus in morbis. 643.
- - copiosior solvit borborygmos. 649 sq.
- - copiosa noctu reddita quid significet. 685.
- - qualis, & quo tempore, prævenit abscessum in febribus. 651 sq. 657.
- - sanguinolenta, & purulenta, quid significet. 658 sq. 681.
- - furfuracea, unde talis. 660. 670.
- - cum sedimento capilliformi, 665 sq. 670. farinoso. b. 374. bilioso (flavo) 378.
- - dispersa sive varia. 380.
- - bullas excitans seu spumosa. 381.
- - oleosa. 387.

*Urina inspectio* quid doceat Medicum. 440 sq. quid non doceat. 457. Ejus præcipuus usus. 458.

- - triplex materia. 442.
- - corona seu circulus. *ibid.*
- - contenta Medico examinanda. 445 sq.

*Urtio* in ischiadico malo. 327.

- - - in morbis extremum remedium esse debet. 488.

*Uteri* Erysipelas. b. 91 sq. strangulatus. Vid. *Pogon hysterica*.

- - - structura & situs Veteribus ignorata. b. 99. 108.

- - - suppuratio. 107.

*Ulnæ* numerus debent. b. 181.

*Ulnarum* letalitas. 228 & seq.



INDICULUS

# INDICULUS

*Vocum Græcarum.*

- Ἀλφοί. *a.* 394.
- Ἀμκαθαίρω. *b.* 17.
- Ἀποσιτία. 204.
- Ἀπίστας. 471.
- Ἀγροβαλισμός. *a.* 282.
- Ἀφασία. 283.
- Βλατῶν. *ibid.*
- Βῆξ γροστική. 445.
- Γονή. *b.* 203.
- Ἐκπληξ. *a.* 282.
- Ἐμρότης. *ibid.*
- Ἐμμοτον. *b.* 106.
- Ἐξωθήματα. *a.* 395.
- Ευδασεία. 437.
- Θάραξ. 213.
- Ἰδρω. 398.
- Καρδιαγμός. 521.
- Κατάπτωσις. 283.
- Κιπίου 90.
- Κόπος 168.
- Λιποψυχία. *b.* 342.
- Διχῶσις. *a.* 393.
- Λύκη. 394.
- Λυμός. 213.
- Μίλας. 394.
- Μιτίωρα. *b.* 210.
- Ὀργῶν, ὀργασμός. *a.* 125.
- Πλευρά, πλευράν. *b.* 347.
- Πίνος. *a.* 145.
- Σκετίδνος. 522.
- Σπασμός, σπᾶσμα. *b.* 59.
- Σφακέλος, σφακελισμός. *a.* 283.
- ὑποστροφή, ὑποτροπή. 182.
- Φαρμακίον. 133.
- Φάρυξ. 202.
- Φλυκταίσι ἐλκώδης. 395.
- Φρύς. *b.* 419.
- Θέρματα. *a.* 203. 395.

M m 4

SYLLABUS

# SYLLABUS AUCTORUM

*per compendia citatorum.*

## A.

**A** a. *Hafn.* Thomæ Bartholini *Acta medica & philosophica Hafniensia.* Hafniz 1673 & *seq.* 4°.

*Act. Med. Berol.* *Acta Medicorum Berolinensium, collecta & digesta* a Jo. Dan. Gohl &c. Berolini 1717 & *seq.* 8°.

*Actuar. meth. med.* *Actuarii methodi medendi libri VI.*

*Actuar. de spir.* Ejusd. de actionibus & affectibus spirituum animalis, ejusque nutritione libri II.

*Actuar. de urin.* Ejusd. de urinibus libri VII.

Hæc tria junctim prodierunt h. t. *Actuarii Joannis filii Zachariæ opera.* Parisiis 1556. 8°.

*Adolph. de Equis.* C. M. Adolphi Diss. phys. medica de Equitationis eximio usu medico. Lips. 1713. 4°.

*A. E. L.* *Acta Eruditorum Lipsiæ* publicata an. 1682 ad usque 1762. in 4°.

*Aëtius.* Aëtii Amideni Medici clariss. libri XVI. in tres distributi Tomos, quorum primus & tertius a J. B. Montano Latinitate donati, secundus vero a Jano Cornario. Basil. 1533 & 1535. fol.

*A. Gell.* Auli Gellii Noctium Atticarum libri XX. Curiz Regnitianæ 1741. 8°.

*Alberti de præserv. Liter. morb.* Mich. Alberti Diss. de præservandis Literatorum morbis. Hal. 1733. 4°.

*Albrecht effect. mus.* Jo. Wilh. Albrecht Tractatus physicus de effectibus Musices in corpus animatum. Lips. 1734. 8°.

*Alex. Trall.* Alexandri Tralliani Medici libri duodecim, Gr. & Lat. Joanne Guinterio Andernaco interprete & emendatore. Basil. 1556. 8°.

*Apul. L.* Apuleji Opera omnia quæ extant, emendata & aucta: cura Petri Colvi. Lugd. Bat. 1587. 8°.

*Aret.* Aretæi Cappadocis Medici de causis & signis, nec non

non de curatione acutorum, & diuturnorum morborum libri, Junio Paulo Crasso interprete. forma minore, sine loco & anno impressionis. monente tamen Fabricio in Bibl. Græc. T. 3. p. 101. excusa est hæc editio Parisiis.

*Aristot.* Opera Aristotelis Gr. & Lat. Lugd. 1597. 8°. maj. 2 vol.

*Arnald.* Arnaldi de Villa Nova Explicatio super Canonem *Vita brevis*. Exstat in Ejus Operibus Omnibus, cum Nic. Taurelli annotat. Basil. 1585. fol.

*Astruc morb. Vener.* Jo. Astruc de morbis Venereis libri IX. Paris. 1740. 4°.

*Asben.* Athenæus Græco-Latinus Casauboni. Lugd. 1657. fol. Latine tantum, interprete Natale de Comitibus. Lugd. 1556. 8°.

*Aurelian.* Cæli Aureliani de morbis acutis & chronicis libri VIII. Jo. Conr. Amman recensuit, &c. Amstel. 1709. 4°.

B.

**B**acmeister. *diat. aul.* Jac. Bacmeisteri Diss. de eo, quod sanitati obest circa diætam, & maxime in aulis. Turing 1736. 4°.

*Baco de augm. sc.* Franc. Baconis de Verulamio de augmentis scientiarum libri IX. Amstel. 1662. 12°.

*Baco H. N.* Ejusd. Sylva Sylvarum, sive Historia naturalis. ibid. 1661. 12°.

*Baco Hist. V. & M.* Ej. Historia Vitæ & Mortis. ibid. 1663. 12°.

*Bagliv.* Ge. Baglivi Opera omnia medico-practica, & anatomica. Antverp. 1719. 4°.

*Baier Adag. Med.* Jo. Jac. Baieri Adagiorum medicinalium Centuria. Fft. & Lips. 1718. 4°.

*Baribol. Epist.* Thomæ Bartholini Epistolarum medicinalium Centuriæ IV. Hagæ Com. 1740. 8°.

*Baribol. H. A.* Ejusd. Historiarum anatomicarum rariorum Centuriæ VI. Hafniæ 1654 & seq. 8°.

*Baribol. de nive.* Ej. de Nivis usu medico observationes variz. &c. ibid. 1661. 8°.

*Baribol. Peregr. med.* Idem de Peregrinatione medica. Hafn. 1674. 4°.

*Battie Princ. anim.* Gulielmi Battie de principiis animalibus Exercitationes XXIV. Lond. 1757. 4°.



- Bellin. de urin. &c.* De urinis & pulsibus, de missione sanguinis, de febribus, de morbis capitis, & pectoris, opus Laur. Bellini, cum præf. Jo. Bohaii. Francof. & Lipsi. 1685. 4°.
- Berger. Chin. vind.* Jo. Gothofr. Bergeri Diss. de China ab iniquis judiciis vindicata. Wittemb. 1712. 4°.
- Berger Therm. Carol.* Ejusd. de Thermis Carolinis Commentatio. ibid. 1709. 4°.
- Beverov. ad Hippocr. de calc.* Jo. Beverovicii Exercitatio in Hippocratis aphorismum de calculo. Lugd. Bat. 1641. 12°.
- Bibl. Germ.* Bibliothek Germanique & des Pays du Nord. Amstel. 1720 sq. 8°.
- Blank. Coll. Collectanea medico-physica*, of Hollands Jaar-Register &c. by een versamelt door Steph. Blankart. Amst. 1680 & 1683. 8°. Continentur in duobus Tomis Observationum centuriz septem.
- Blegny Zod.* Nicolai de Blegny Zodiacus Medico-Gallicus, sive miscellaneorum medico-physicorum Gallicorum anni quinque, scil. 1679--1683. Genev. 1680 sq. 4°.
- Boerb. aph.* H. Boerhaave Aphorismi de cognoscendis & curandis morbis. L. B. 1737. 8°.
- Boerb. J. M.* Ejusd. Institutiones medicæ. ib. 1734. 8°.
- Boerb. Præl. in J. M.* Ejusd. Prælectiones rei medicæ. Edidit Alb. Haller. Gotting. 1739 sq. 8°.
- Boerb. morb. nerv.* Ej. Prælectiones Academicæ de morbis nervorum. Edi curavit Jac. van Eems. L. B. 1761. 8°.
- Borel. Petri Borelli Historiarum & Observationum Medico-physicarum Centuriz IV.* Paris. 1656. 8°, iterum Fft. & Lipsi. 1676. 8°.
- Boussuet Art. med.* Franc. Boussueti de arte medendi libri XII. Lugd. 1557. 8°.
- Boyle de color.* Rob. Boyle Experimenta & Considerationes de coloribus. Lond. 1665. 12°.
- Boyle Util. Phil. Nat.* Ejusd. Exercitationes de utilitate Philosophiæ naturalis experimentalis. Lindav. 1692. 4°.
- Bresl. Samml.* Sammlung von Natur-und Medicin-wie auch hieron gehörigen Kunst-und Literatur-Geschichten. Vrsatshv. 1728 & seq. 4°.

Brin,

*Brin. de spir. an.* Jo. Tho. Brinii de spiritibus animalibus, &c. Inquisitio Physico-Medica. Patav. 1729. 4°.

## C.

**C***ampan. Medic.* Tho. Campanellæ Medicinalium libri VII. Lugd. 1635. 4°.

*Cardan. Hier.* Cardani in septem Aphorismorum Hippocratis particulas Commentaria. Basl. 1564. fol.

*Card. San. tuend.* Ejusd. Opus novum, cunctis de sanitate tuenda, ac vita producenda studiosis apprime necessarium. ibid. 1582. fol.

*Castrens. Med. Consult.* Steph. Roder. Castrensis Medicæ Consultationes. Florent. 1644. 4°.

*Cels. A. Corn.* Celsi de Medicina libri VIII. cura & studio Th. J. ab Almeloveen. Amstel. 1687. 12°.

*Cheyn. de fibra.* Ge. Cheynæi de natura fibræ ejusque laxæ sive resolutæ morbis tractatus. Lond. 1725. 8°.

*Cheyn. sanit.* Ejusd. tractatus de infirmorum sanitate tuenda, vitæque producenda. ib. 1726. 8°.

*Chicot. Diff.* Jo. Chicotii Dissertationes Medicæ. Paris. 1666. 4°.

*Cleghorn diseas. in Minorca.* Observations on the Diseases in Minorca &c. by Ge. Cleghorn. Lond. 1751. 8°.

*Clerc. H. M.* Histoire de la Medecine par Daniel le Clerc. Hagæ Com. 1729. 4°.

*Clos. de Juven. dispos.* Steph. Closii Diss. de Juvenum dispositione ad morbos pulmonum. Halæ 1740. 4°.

*Com. Bon.* De Bononiensi scientiarum & artium Instituto atque Academia Commentarii. Bonon. 1731. 4°.

*Comm. Lips.* Commentarii de rebus in scientia naturali & Medicina gestis. Lips. 1752 seq. 8°.

*Com. Lit.* Commercium Litterarum. Norimb. 1731 & seq. 4°.

*Combalus. Pneumat.* Pneumato-Pathologia seu Tractatus de flatulentis humani corporis affectibus. Auctore Franc. de Paula Combalusier. Paris. 1747. 12° maj.

*Coulej. Abrah.* Couleji Poëmata latina. Lond. 1668. 8°.

Dis

## D.

- D**<sup>io Cass.</sup> Dionis Cassii Historiæ Romanæ libri XLVI. cum not. Leunclavii. Francof. 1592. 8°.
- Diog. Laërt.** Diogenes Laërtius de vitis &c. Philosophorum, Gr. & Lat. ex editione secunda If. Casauboni. 1592. 8°.
- Dures. de hum. purg.** } Lud. Duretus in Hippocratis li-  
**Dures. vid. acut.** } brum de humoribus purgandis,  
 & in libros tres de diætâ acutorum. Paris. 1639. 8°.
- Dures. in Coac.** Ejusd. Interpretationes & Enarrationes in Magni Hippocratis Coacas Prænotiones. Lugd. Bat. 1737. fol.
- Dures. ad Holler.** Ej. Commentarius in Jac. Hollerii librum de morbis internis, auctoris scholiis illustratum. Paris. 1611. 4°.
- Du Verney an Mechan.** Em. Maur. du Verney Quæstio medica: An multis in morbis elucescat corporis mechanismus? Paris. 1719. 4°.

## E.

- E**<sup>ph. N. C. D.</sup> Miscellanea curiosa medico-physica Academiæ Naturæ Curiosorum, sive Ephemerides medico-physicæ Germanicæ curiosæ; in annorum Decades tres distributæ, ab an. 1670 ad 1706. 4°.
- Eph. N. C. Cent.** Sunt præcedentes Ephemerides continuatæ per Observationum Centurias decem, ab an. 1712 ad 1722. 4°.
- Eph. N. C. Vol.** Sunt Ephemerides Naturæ Curiosorum, quæ Voluminibus decem prodierunt Norimbergæ 1727-1754. 4°.
- Eras. Tho.** Erasmi in Hippocratis aphorismos 1-22, libri primi prælectiones. quæ extant in Erasmi Variis Opusculis medicis. Francof. 1590. fol.
- Eras. occult. med.** Tho. Erasmus de occultis pharmacorum potestatibus; & de medicamentorum purgantium facultate. Basil. 1574. 4°.
- Ettm. Oper.** Mich. Ettmulleri Opera Medica theoretico-practica, cum notis edita a Jo. Jac. Mangeto. Genev. 1736. fol. 4 tomis.

Fellep.

## F.

- Fallop.** Gabr. Falloppii Opera omnia. Venet. 1584. fol.
- Fernel. Medic.** Jo. Fernelii Univerſa Medicina. Genev. 1637. 4°.
- Fick.** Hippocratis Aphoriſmi notis illuſtrati a Jo. Jac. Fickio. Jenæ 1729. 8°.
- Foreſt. Obſ. Chir.** Petri Foreſti Obſervationum & Curationum Chirurgicarum libri IX. Lugd. Bat. 1610. 8°.
- Foreſt. Obſ. Med.** Ejusd. Obſervat. & Curat. medicinalium libri XXXII. ibid. 1593 & ſeq. 8°.
- Freber.** Pauli Freheri Theatrum Virorum eruditione clarorum &c. Norimb. 1688. fol.
- Freind.** Joannis Freind Opera omnia medica. Pariſ. 1735. 4°.
- Frey Opuſc.** Jani Cæcilii Frey Opuſcula varia nuſquam edita; &c. Pariſ. 1646. 8°.
- Fric. Parad. med.** Melch. Friccii Paradoxa medica. Ulmæ 1699. 12°.
- Friſch Geſch.** Jo. Chr. Fritſchii Theologiſche, Juſtiſche, Mediciniſche und Physicaliſche Geſchichte. Lipſ. 1730--1740. 4°. in VI Partibus, quarum ultima elaborata eſt a Jo. Chr. Wolffio.
- Fuchſ.** Hippocratis Aphoriſmorum Seſſiones VII. Leonh. Fuchſii commentariis illuſtratæ & expoſitæ. Pariſ. 1545. 8°.
- Fuchſ in Hipp.** l. 6. *Epid.* Hippocratis Epidemiorum liber ſextus jam recens latinitate donatus Leon. Fuchſio interprete. Addita eſt luculenta univerſa ejus libri expoſitio. Haganoæ 1532. 4°.

## G.

- Galen.** Galeni in Hippocratis aphoriſmos Commentarii VII.
- Gall. de Min.** La Galleria di Minerva, o vero notizie univerſali, di quanto è ſtato ſcritto di Europa &c. Venet. 1696--1717. ſeptem Tomis in fol.
- Glaſſ. de febr.** Tho. Glaſſi Commentarii XII. de febris ad Hippocratis diſciplinam accommodati. Amſtel. 1743. 8°.

Goelike

*Goelike Hip. Med.* A. O. Goelike Historia Medicinæ universalis. Francof. cis Viadr. 1721. 8°.

*Gontier Hygiæ.* Petri Gontier Exercitationes Hygiasticæ, sive de sanitate tuenda & vita producenda libris XVIII. Lugd. 1668. 4°.

*Gorr. de sm.* Jo. Gorrei Definitionum medicarum libris XXIV. Francof. 1601. fol.

*Gortier. Medicina Hippocratica* exponens Aphorismos Hippocratis, auctore Jo. de Gortier. Amstel. 1739--1742. 4°.

*Guides ad Theoph. de urin.* Vid. infra *Theoph.* &c.

## H.

*Haen Rat. med.* Ant. de Haen Rationis medendi in nosocomio practico &c. Pars 1. 2. &c. Vindobon. 1757 & seq. 8°.

*Hamel Hip.* Regiæ Scientiarum Academiæ Historia, auctore J. B. du Hamel. Paris. 1701. 4°.

*Hamel Oper.* J. B. du Hamel Operum Philosophicorum Tomi II. Norimb. 1681. 4°.

*Hanow Seltenh.* M. C. Hanows Seltenheiten der Natur und Oekonomie. Lips. 1753 ad 1755. tribus volum. 8°.

*Hebenstr. Anstrop. for.* J. E. Hebenstreit Anthropologia forensis &c. Lips. 1753. 8°.

*Hebenstr. de Hom.* Ejusd. de Homine sano & aegroto Carmen. ibid eod. 80.

*Hecquet. Hippocratis Aphorismi*, ad mentem ipsius, articulis usum, & corporis mechanismi rationem expositi. Paris. 1724. 12°. maj.

*Hecquet. Med. nat.* La Medecine naturelle, &c. par M. Hecquet. Paris. 1738. 12°. 2 vol.

*Hecquet de purg. Med.* Ejusd. de purganda Medicina a curarum sordibus. Paris. 1714. 12°. maj. sine auctoris nomine.

*Hecquet Qu. An morbi a serena colluvie?* prodit Paris. 1696. 4°. & recens. extat in calce Ildi Tomi tractatus, qui inscribitur *la Medecine Theologique* &c. Paris. 1733. 12°.

*Hecquet Qu. An potius aegris interdiciendus?* prodit Paris. 1704. 4°. & extat cum anteced. l. c.

*Heers Obs.* Henr. ab Heers Observationes medicæ. Quæ subjunctæ sunt ejus tractatui h. t. Spadacrene, si. e. Fons

- Font Spadanus accuratissime descriptus. Lugd. Bat. 1685. 12°. maj.
- Heerkens de Valet. Eitrr.* G. N. Heerkens de Valetadine Literatorum Poëma. Lugd. Bat. 1749. 8°.
- Heister Chir.* Laur. Heisteri Institutiones Chirurgicæ. Amstel. 1739. 4°.
- Helm. de Hom.* Franc. Merc. ab Helmont Observationes circa Hominem ejusque morbos. Amstel. 1692. 12°.
- Helmont.* Jo. Bapt. van Helmont Ortus Medicinæ, id est, Initia Physicæ inaudita, Progressus Medicinæ novus, in morborum ultionem, ad vitam longam. Amstel. 1652. 4°.
- Helw. Ods.* Jo. Helwigii Observationes Physico-Medicæ posthumæ. Aug. Vindel. 1680. 4°.
- Hellus.* Eobanus Hellus de tuenda bona valetudine. Francof. 1571. 8°.
- Heuch. Chir. inf.* J. H. Heucheri Diss. de Chirurgo in fonte. Wittemb. 1710. 4°.
- Heutber.* Ejusd. Opera partim edita, partim nondum edita. Lipsi. 1745. 4°.
- Heurn.* Hippocratis Aphorismi cum explicatione Jo. Heurnii. Jenæ. 1690. 12°.
- Heurn. Oper.* Ejusd. Opera omnia in duos Tomos divisa. Lugd. 1658. fol.
- Heyden synops. discurs.* Magistri Hermannii van der Heyden synopsis discursuum. Lond. 1653. 12°.
- Hildan. Obs.* G. F. Hildani Observationum & Epistolarum Chirurgico-Medicarum centuriæ in certum ordinem digestæ a J. S. Henningero. Argentor. 1713. 4°.
- Hippocr.* Magni Hippocratis Cei Opera omnia Græce & Latine, &c. Joan. Antonidæ van der Linden. Lugd. 1665. 8°. maj. 2 vol.
- Hist. ac. sc. Berol.* Histolre de l'Academie Royale des Sciences & des Belles Lettres de Berlin. année 1745. & suiv. Berol. 1746-1757. 4°.
- Hist. ac. r. sc.* Histoire de l'Academie royale des Sciences, avec les Memoires de Mathematique & de Physique. Paris. 4°. per seriem annorum ab an. 1699. usque ad nostra tempora.
- Hoffm. Idea fund. Med.* Fr. Hoffmanni Idea fundamentalis universæ Medicinæ, &c. Halæ 1707. 4°.
- Hoffm. Med. rat.* Ejusd. Medicina rationalis systematica. Hal. 1718-1734. 4°. IV. Tomis, quorum postremus quinque

quinque constat Partibus , seu justis voluminibus, quibus accedit Supplementum.

- Hoffm. aër. epid.* Ejusd. Diff. de aëris potentia in epidemiarum morborum generatione. ib. 1727. 4°.
- - - *aër. intemp.* -- de aëris intemperie multorum morborum causa. ibid. 1715. 4°.
- - *de et. mus.* -- de ætatis mutatione morborum causa & remedio. ib. 1728. 4°.
- - *de med. em. & purg. post. ir.* -- de medicina emetica & purgante post iram veneno. -- 1721. 4°.
- - *morb. ex hep. vis.* -- de morbis ex hepatis vitio. -- 1726. 4°.
- - *de morb. incongr.* -- de morbis incongruis. -- 1702. 4°.
- - *morb. peregr.* -- de morbis peregrinantium. -- 1734. 4°.
- - *Opusc.* -- Opuscula physico-medica. Uimæ 1725. 8°.
- - *peregr. sanit.* -- Diff. de peregrinationibus sanitatis causa instituendis. Halæ 1701. 4°.
- - *præst. med. leg.* -- Præstantissima medendi leges. -- 1719. 4°.
- - *rem. benign.* -- de remediorum benignorum abusu & noxa. -- 1714. 4°.
- - *de sal. febr.* -- de salubritate febrium. -- 1702. 4°.
- - *de temp. an. insal.* -- de temporibus anni insalubribus. -- 1705. 4°.
- - *de transmut. morb.* -- de transmutatione morborum. -- 1716. 4°.
- - *de vales. sen.* -- de valetudine senum tuenda. -- 1725. 4°.
- - *de vomit. us.* -- Observationes de cauto & præstantissimo vomitoriorum usu. -- 1725. 4°.
- Holler. Jac. Hollerii in Aphorismos Hippocratis Commentarii VII.* Genev. 1632. 8°.
- Hotting. de vino.* Sal. Hottingeri *Οινολογία*, seu dissertationum de vino prima. Tiguri 1707. 4°. secunda 1710. Tertia 1712.
- Huxham de aëre.* Jo. Huxham Observationes de aëre & morbis epidemicis ab an. 1728, ad finem anni 1737, Plymuthi factæ. Lond. 1752. 8°. Volumen alterum, ab an. 1738. ad exitum usque 1748. ibid. eod.

*Foll.*

## J.

- J**oël. Franc. Joëlis Opera medica. Amst. 1663. 4°.  
*Journ. Oec.* Journal Oeconomique, ou Memoires,  
Notes & Avis sur l'Agriculture, les Arts, &c. Paris.  
1725 *sq.* 12°.  
*Journ. Sav.* Le Journal des Savans. Paris. 1665 *seq.* 4°.  
*Juliani Cas.* Juliani Imperatoris Cæsares. Paris. 1583.  
8°.  
*Juncker Med. pract.* Jo. Junckeri Conspectus Medicinæ  
theoretico-practicæ. Halæ 1734. 4°.  
*Juncker Patbol.* Ejusd. Conspectus Pathologiæ. ib. 1736.  
4°.  
*Juncker Physiol.* Ej. Conspectus Physiologiæ medicæ.  
Hal. 1735. 4°.

## K.

- K**aan *Perspir.* Abr. Kaan Perspiratio dicta Hippocra-  
tica per universum corpus anatomicè considerata.  
Lugd. Bat. 1738. 8°.  
*Kämpf. Amoen.* E. Kämpferi Amoenitates exoticæ. Lem-  
gov. 1712. 4°.  
*Kloekhof Opusc.* C. A. Kloekhof Opuscula medica. Ul-  
traj. 1747. 8°.

## L.

- L**ang *Epist.* Jo. Langii Epistolarum medicinalium volu-  
men tripartitum. Hanoviz 1605. 8°.  
*Laur. Exerc.* G. F. Laurentii Exercitationum in non-  
nullos minus absolute veros Hippocratis aphorismos,  
eorumque rationes, conscriptarum, Pars prima. Hamb.  
1647. 4°.  
*Laurent. de strum.* A. Laurentii de mirabili strumæ fa-  
nandi vi &c. Vid. Ejus Opera omnia, Paris. 1628.  
4°.  
*Licet. de sec. Quæst.* De secundo-Quæstis per Epistolas  
a claris viris, responsa Fortunii Liceti. Ultini 1646.  
4°.  
*Linden Sel. med.* J. A. van der Linden Selecta Medica.  
Lugd. Bat. 1656. 4.  
*Vol. II.*

N n

Linn.



- Linn. de febr. interm.* C. Linnæi Diss. inaug. de causa februm intermittentium. Harderv. 1735. 4.  
*Lister. Hippocratis Aphorismi cum comment.* M. Lister. 1703. 12. Tubing. 1730. 12.  
*Lister Exerc. med.* M. Lister Exercitationes medicinales de quibusdam morbis chronicis. Amstel. 1698. 8.  
*Lobb meth. of fev.* Rational methods of fevers, by Theoph. Lobb. Lond. 1734. 8.  
*Lodov. de re med.* Ant. Lodovici de re medica Opera. Olyss. 1540. fol.  
*Lomm. Obs.* Jod. Lommii Observationum medicinalium libri III. Amstel. 1726. 8.  
*Lomm. san. tuend.* Ejusd. Commentarii de sanitate tuenda. Lugd. Bat. 1734. 8.  
*Loff. Obs.* Fr. Loffii Observationum medicinalium libri IV. Lond. 1672. 8.

## M.

- M***artian.* Magnus Hippocrates Causæ Prosperi Martiani notationibus explicatus. Romæ 1626. fol.  
*Massar. Prae.* Alex. Massariæ Practica medica. Venet. 1642. fol.  
*Matthiæ Phil. Med.* Tractatus de Philosophia Medici, sive Hippocratis liber de Honestate, quem recensuit & commentario illustravit Ge. Matthiæ. Gotting. 1740. 4.  
*Mead Monit.* R. Mead Monita & Præcepta medica. Lond. 1751. 8.  
 - - - *Oper. Ej.* Opera. Paris. 1751. 8.  
 - - - *Sacr. Med.* Ej. Medica Sacra : sive de morbis insignioribus, qui in Bibliis memorantur, Commentarius. Lond. 1749. 8.  
*Mem. Trev.* Memoires pour l'Histoire des Sciences & des Beaux Arts. à Trevoux & Paris 1701. & sequ. 12.  
*Mercur. Med. Prae.* Hier. Mercurialis Prælectiones Patavinæ, de cognoscendis, & curandis humani corporis affectibus. Venet. 1647. fol.  
*Mercur. Prae. in l. 2. Epid. Hipp.* Ejusd. in secundum lib. Epid. Hipp. Prælectiones Bononienses. Forolivii 1626. fol.  
*Mercur. Var. Lect.* Ej. Variarum Lectionum libri VI. Extant inter Opuscula aurea, & selectiora. Venet. 1644. fol.

*Mercurialis.*

*Mercurial. Ej. in omnes Hippocratis aphorismos prælectiones Patavinæ. Lugd. 1621. 4.*

*Mich. Villan. de Syrup. Syruporum universa ratio, ad Galeni censuram diligenter expolita Michaële Villanovano auctore. Venet. 1545. 8.*

*Moreau in schol. Sal. De conservanda valetudine opusculum Scholæ Saternitanæ, ex recensione & cum animadvers. R. Moreau. Paris. 1525. 8.*

*Morgagni in Cels. & Sam. Epist. J. B. Morgagni in Aur. Corn. Celsum & Q. Ser. Samonicum Epistolæ. Lugd. Bat. 1735. 4.*

## N.

*Nard. nos. gen. Noctes geniales auctore Jo. Nardio. Annus primus. Bonon. 1656. 4.*

*Naud. matut. Aud. Gabr. Naudæi Quæstio tertia Jatrophilologica, An matutina studia vespertinis salubriora? Extat in Ejusd. Pentade Quæstionum Jatrophilologicarum. Genev. 1647. 8.*

*Nonn. Lud. Nonnii Diæteticon, sive de re cibaria libri IV. Antverp. 1646. 4.*

*Nov. Liter. Germ. Nova Literaria Germaniæ, collecta Hamburgi 1703 seq. 4.*

## O.

*Obs. Hal. Observationum selectarum ad rem literariam spectantium Tomi X. Halæ 1700-1705. 8.*

*Oribas. Collect. Oribasii Sardiani Collectorum medicinarum libri XVII. J. B. Rasario interprete. Paris. 1555. 8º.*

*Oribas. Synops. Ejusd. Synopses ad Eustathium filium libri IX. ib. eod. 8.*

## P.

*Paling. Zod. M. Palingenii Zodiacus vitæ. Rotterod. 1722. 8.*

*Panarol. Iatrol. Dominici Panaroli Iatrologismorum, seu medicinalium Observationum Pentecostæ quinque. Hanoviæ 1654. 4.*

*Papadop. Nic. Comneni Papadopoli Historia Gymnasii Patavini. Venet. 1726. fol. 2 tomis,*

N n 2

Paul.

- Paul.* Pauli Æginetæ Medici Opera, Joanne Guinterio Andernaco interprete. Lugd. 1567. 8.
- Paulli Quadr.* Sim. Paulli Quadripartitum Botanicum. Francof. 1708. 4.
- Pechlin. de aër. & alim. def.* J. N. Pechlini de aëris & alimenti defectu, & vita sub aquis, meditatio. Kilonii 1676. 8.
- Phil. Transf.* Philosophical Transactions. Vol. 47 & seq. an. 1751 seq. Lond. 4.
- Pictor. san. tuend.* Ge. Pictorii Sanitatis tuendæ methodus. Subjuncta est opusculo Scholæ Salernitanæ de conservanda bona valetudine. Antverp. 1562. 12.
- Piso meth. med.* Homob. Pisonis methodus medendi. Patav. 1726. 4.
- Piso magn. aux.* Ejusd. de regimine magnorum auxiliorum in curationibus morborum, Dissertationes IV. Patav. 1735. 4.
- Platner. de Thorac.* J. Z. Platneri Diss. de Thoracibus, von Schnürbrüsten. Lips. 1735. 4.
- Plemp. Val. tuend.* V. F. Plempii de Togatorum valetudine tuenda Commentarius. Brux. 1670. 4.
- Plin.* C. Plinii Secundi Historiæ naturalis libri XXXVII. Lugd. Bat. 1635. 12°. 3 tomis.

## Q.

**Q**uill. Callip. Cl. Quilleri Callipædia, seu de pulchræ prolis habendæ ratione Poëma didacticum. Paris. 1709. 8.

## R.

**R**amaz. Oper. Bern. Ramazzini Opera omnia, medica & physiologica. Genev. 1717. 4.

*Rantзов. conf. valet.* Henr. Rantзовil de conservanda valetudine liber. Antverp. 1580. 8.

*Rega meth. med.* H. J. Rega accurata medendi methodus. Lovan. 1737. 4.

*Rega de sympath.* Ejusd. de sympathia, seu consensu partium corporis humani, &c. Harlemi 1739. 8.

*Reines. Schol. ICror. med.* Tho. Reinesii Schola Jureconsultorum medica. Lips. 1679. 8.

Rbod.

- Rhod. Obs.* Jo. Rhodii Observationum medicinalium  
centuriæ tres. Subjunctæ habentur P. Borelli Histo-  
riis & Observationibus medico-physicis. Francof. &  
Lips. 1676. 8.
- Riedlin. Lin.* Viti Riedlini Linæ medicæ. Aug. Vin-  
del. 1695--1700. 8. sex volum.
- River.* Lazari Riverii Opera medica universa. Lugd.  
1679. fol.
- Rivin. de frig. damn.* A. Q. Rivini Diff. de frigoris  
damno. Lips. 1696. 4.
- Ronsssei Epist.* Bald. Ronsssei Miscellanea seu Epistolæ  
medicinales. Lugd. Bat. 1590. 8°.

## S.

- Sammarib. Pæd.* Scævolæ Sammarthani Pædotrophia.  
Extat in Auctoris Operibus. Lutetiæ 1616. 8.
- Sanaor.* Sanaorii Sanaorii Commentaria in primam se-  
ctionem Aphorismorum Hippocratis. Venet. 1629. 4.
- Sana. Stat. Med.* Ejusd. de Statica Medicina aphorismo-  
rum sectionibus septem distinctorum Explanatio  
physico-medica: &c. auctore P. Noguez. Paris. 1725.  
12°. maj. 2 vol.
- Satyr. Med. Siles.* Medicorum Silesiacorum Satyræ,  
quæ varias observationes, casus, experimenta, ten-  
tamina ex omni Medicinæ ambitu exhibent. Wratis-  
lav. & Lips. 1736 seq. 8°.
- Prodierunt per Specimina.
- Schach. de aër. effic.* P. F. Schacheri Diff. de aëris effica-  
cia in corpore humano. Lips. 1738. 4.
- Schulz. de abscess.* J. H. Schulze Diff. de Abscessibus.  
Halæ 1742. 4.
- Schulz. de Athlet.* Ejusd. Diff. de Athletis Veterum,  
eorum diæta & habitu. ibid. 1717. & 1743. 4.
- - - *Comp. H. M.* -- Compendium Historiæ Medici-  
næ a rerum initio ad Hadriani Augusti excessum. ib.  
1741. 8.
- - - *H. M.* -- Historia Medicinæ a rerum initio ad  
annum Urbis Romæ 535 deducta. Lips. 1728. 4.
- - - *de morb. vern.* -- Diff. de morbis verni temporis  
ad ductum Hippocratis sect. 3. aph. 20. Halæ 1738.  
4.

- Schulz. Rer. N. Nat.* -- Diff. de reram non naturalium ad valetudinem tuendam recto usu. *ibid.* 1733. 4.  
 - - - *de ventr. & intest. rat.* -- Diff. de ventriculi & intestinorum ratione in omni morborum genere habenda. *ib.* 1738. 4.  
*Scribon comp.* Scribonii Largi Compositiones medicæ. Jo. Rhodius recensuit, &c. Patav. 1654. 4.  
*Scultet. Armam.* Jo. Sculteti Armamentarium Chirurgicum, &c. in meliorem ordinem redactum studio J. C. de Sprügel. Amstel. 1741. 8.  
*Sebiz. Exerc. path. T. I.* J. A. Sebizii Exercitationum pathologicarum Tomus prior. Argentor. 1674. 4.  
*Seled. Med. Francof.* Selecta medica Francofurtensia. Francof. ad Viadr. 1736 &c. 8°. IV vol.  
*Senec.* L. Annæi Senecæ Philosophi Opera omnia, & M. Annæi Senecæ Rhetoris quæ extant. Lugd. Bat. 1649. 12°. in IV vol.  
*Sennert. Pract. l. 3.* Dan. Sennerti Medicinæ practicæ liber tertius. Wittemb. 1662. 4.  
*Seren. Samon.* Q. Sereni Samonici de Medicinæ præcepta saluberrima. Amstel. 1662. 8.  
*Simson de R. M. Tho.* Simsoni de Re medica Dissertationes IV. Edimb. 1726. 8.  
*Sinap. Parad. med.* M. A. Sinapii Absurda vera sive Paradoxa medica. Genev. 1697. 8.  
*Soc. Edinb.* Medical Essays and Observations by a Society in Edinburg. Edinb. 1733-1744. 8°. V vol.  
*Sorbais.* Pauli de Sorbais Commentaria & controversiæ in omnes libros aphorismorum Hippocratis. Viennæ Austr. 1701. 4.  
*Stenizel de Ven.* C. G. Stenizelii Toxicologia sive de Venenis libri III. Wittemb. & Lips. 1732. 4.  
*Ström. theor. mot. recipr.* Chr. Ström nova theoria motuum reciprocorum machinæ animalis &c. Amst. 1707. 8.  
*Sydenh.* Tho. Sydenham Praxis medica experimentalis, sive Opuscula universa. Lips. 1695. 8.

## T.

**T**aranta. Philonium pharmaceuticum & Chirurgicum, de medendis omnibus, cum internis, tum externis humani corporis affectibus: a Valesco de Taranta, &c. Francof. & Lips. 1680. 4. *Theoph.*

*Theoph. de urin.* Theophili de urinis libellus. cum not.  
Tho. Guidotii. Lugd. Bat. 1703. 8.

*Tiffot febr. bil.* S. A. D. Tiffot Diss. de febris biliosis;  
&c. Lausannæ 1758. 8.

*Tozzi.* Luca Tozzi in Hippocratis aphorismos Commen-  
taria. Prodiere cum Tozzi Operibus. Venet. 1728.

*Trall. de Cpio.* B. L. Tralles Usus opii salutaris & no-  
xius, &c. Vratilav. 1757--1762 4. in IV Sectionibus.

*Triller de nov. Hippocr.* edit. D. W. Trilleri de nova  
Hippocratis editione adornanda Commentatio. Lugd.  
Bat. 1728 4.

*Trincav.* Victoris Trincavelli Omnia Opera in tres To-  
mos digesta. Venet. 1599. fol.

*Tulp. Nic.* Tulpii Observationes medicæ. Amstel. 1672.  
8.

## V.

*Valent. Polychr.* avat. M. B. Valentini Polychresta  
exotica. Francof. 1700. 4.

*Valleriol. Obs.* Franc. Valleriolæ Observationum medici-  
narium libri VI. Genev. 1605. 8.

*Valles.* Franc. Vallesii in Aphorismos Hippocratis Com-  
mentarii VII. Colon. 1589. fol.

*Valles. in Epid.* Ejusd. in libros Hippocratis de morbis  
popularibus Commentaria. Colon. 1588. fol.

- - - *in Progn.* -- in Hippocratis Prognostica Commen-  
tarii. Extant cum Ejus in aphorismos Commentariis.

- - - *Com in Hipp. de viâ acut.* Extat cum dict. Com-  
ment. in Hipp. Aphorismos.

- - - *Sacr. Phil.* -- de illis, quæ scripta sunt physice in  
libris sacris, sive de sacra Philosophia liber singularis.  
Lugd. 1592. 8.

*Vallisneri.* Opere Fisico-Mediche del Kavalier Antonio  
Vallisneri. Venet. 1733. fol. 3 tom.

*Valverd. san. tuend.* Jo. Valverdi de animi & corporis  
sanitate tuenda libellus. Lutet. 1552. 8.

*Vanini Nat. Arc.* Jul. Cas. Vanini de admirandis Na-  
turæ Reginz Deque Arcanis libri IV. Lutetiz 1616.  
8.

*Vesalius.* A. Vesalii Opera omnia in duos Tomos distri-  
buita. Lugd. Bat. 1725. fol.

*Vesling.*

## 568 SYLLABUS AUCTORUM.

*Vesling. Epist.* Jo. Veslingii Observationes anatomicae & Epistolæ medicæ. Recusæ sunt una cum Tho. Bartholino de insolitis partus humani viis. Hagæ Com. 1740. 8.

*Vogel N. med. Bibl.* R. A. Vogel neue medicinische Bibliothek. Gotting. 1754 seq. 8.

### W.

*Waldschmidt. J. J.* Waldschmidt Opera medico-practica. Francof. 1695. 4.

*Wedel. G. W.* Wedelii Aphorismi aphorismorum, i. e. aphorismi Hippocratis in porismata resoluti, &c. Jenæ 1695. 12.

- - - *Aman.* -- Amœnitates materiæ medicæ. ibid. 1684. 4.

- - - *Exerc.* -- Centuria Exercitationum medico-philologicarum. ib. 1702. 4.

*Wolf. Obs.* Ido Wolfii Observationum Chirurgico-medicearum libri II. Quedlimburgi 1704. 4.

### Z.

*Zecch. Consult.* Jo. Zecchii Consultationes medicinales. Francof. 1650. 8.

## F I N I S.















